

Calylophus

čeleď: Onagraceae

Calylophus berlandieri

oblasti: Kansas, Kolorado, Louisiana, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Roste v USA v podobě polokeře. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. berlandieri - listy menší
- subsp. pinifolius - na východě areálu rozšíření; listy větší

Vyhovují ji suché prairie a písčitou nebo skalnatou půdou.

Calylophus drummondianus

Calylophus hartwegii

oblasti: Arizona, Kansas, Kolorado, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas

Roste v USA v podobě polokeře.

Calylophus lavandulifolia

oblasti: Arizona, Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Utah, Wyoming

Roste v USA v podobě polokeře. Kvete žlutými květy, když usychají, přecházejí do oranžové nebo modrofialové.

Calylophus serrulata

oblasti: Alberta, Arizona, Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kansas, Kentucky, Kolorado, Manitoba, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Ontario, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Vermont, Wisconsin, Wyoming

Roste v Severní Americe v podobě polokeře. Dorůstá výšky do 46cm. Listy jsou zubaté a dlouhé do 8,9cm. Kvete žlutými květy, které se otevírají ráno a večer se zavírají a při usychání se mění na oranžové nebo růžové. Plodem je válcovitá tobolka.

Calylophus toumeyi

oblasti: Arizona, Nové Mexiko

Roste v USA v podobě polokeře.

Calylophus tubicula

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Roste v USA v podobě polokeře.

<https://www.rostliny.net/>