

Stenotus

čeleď: Asteraceae

Roste v Severní Americe v podobě nízkého trsnatého bohatě větveného polokeře. Dorůstá výšky do 30 (i 60)cm. Pod zemí vytváří větvený tlustý kořen. Listy jsou prakticky kožovité a zpravidla spodní. Květenstvím je vrcholový úbor se zvonkovitým nebo 1/2kulatým zákrovem, vlastní květy jsou žluté a terčové hluboce 5tízubé. Plodem je nažka s chmýrem.

Stenotus acaulis

oblasti: Arizona, Idaho, Kalifornie, Kolorado, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Wyoming

Roste v USA v podobě polokeře v kobercových porostech. Dorůstá výšky 3 - 20cm. Listy jsou čárkovité až obkopinaté, špičaté, tuhé, drsně ochlupené a dlouhé (1 -) 8 - 10cm. Květenstvím je žlutý úbor s 5 - 13ti okvětními lístky délky 0,6 - 1,2cm.

Vyhovují mu dobře propustné půdy s větším obsahem živin a plné slunce.

Množí se semeny nebo řízky.

Stenotus armerioides

oblasti: Arizona, Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Montana, Nebraska, Nové Mexiko, Saskatchewan, Severní Dakota, Utah, Wyoming

Roste v Severní Americe v podobě polokeře v trsech. Dorůstá výšky 5 - 30cm. Pod zemí vytváří kulový kořen. Listy jsou obkopinaté a dlouhé 3 - 8cm. Květenstvím je žlutý úbor s 8 - 13ti okvětními lístky s délkou 1 - 1,4cm.

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se řízky nebo semeny.

Stenotus lanuginosus

oblasti: Idaho, Kalifornie, Montana, Nevada, Oregon, Washington

Roste v USA v podobě polokeře v trsech. Dorůstá výšky 5 - 20cm. Listy jsou seskupené na koncích lodyh, čárkovité až obkopinaté, ochlupené a dlouhé do 10cm. Květenstvím je žlutý úbor se 7 - 20ti okvětními lístky délky 0,8 - 1,2cm.

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Stenotus pulvinatus

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3782>

<https://www.rostliny.net/>