

Cicer arietinum (Cizrna beraní)

čeleď: Fabaceae

oblasti: Alabama, Connecticut, Etiopie, Idaho, Indie, Írán, Izrael, JV Evropa, Kansas, Katalánsko, Malá Asie (Anatolie), Manitoba, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New York, Ontario, Oregon, Pákistán, Portoriko, Saskatchewan, Sýrie, Vermont, Washington, Wisconsin

Roste v jihovýchodní Evropě, Indii, Izraeli a Malé Asii jako jednoletka. Povrch je žláznatě ochlupený. Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1)m. Lodyha je hranatá, vzpřímená nebo poléhavá, klikatá a větvená od báze. Palisty jsou nestejně, střelovité až vejčité a se 2 - 4mi zuby. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, dlouhé 5 - 10cm, tvoří je mají 4 - 7 párů lístků, vlastní lístky jsou vejčité nebo eliptické, špičaté, v horní 1/2 zubaté, krátce řapíčkáté, dlouhé 0,7 - 1,9cm a široké 0,4 - 1cm. Květy jsou bílé, růžové nebo modré, pyskaté, velikosti 1cm, mají 0,5 - 2cm stopku, vyrůstají v paždí listů obvykle osamoceně, listeny jsou dlouhé 2 - 3mm, kalich má délku 7 - 9mm, cípy jsou kopinaté, špičaté a pavéza je dlouhá 1 - 2,2cm. Plodem je vakovitě nesouměrně tvarovaný ochlupený hrotitý lusk délky 2 - 3 (i 3,5)cm, šířky 1 - 1,5cm a obsahující 1 - 2 (i 4) nesouměrná hranatá semena se zobánkem v barvě bílé, béžové, narůžovělé nebo hnědé (i černé), průměru 0,5 - 1cm a melou se na mouku. Listy se zase využívají jako pícnina. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Bumper'
- 'Kaniva'
- 'Tyson'

Vyhovuje ji plné slunce nebo polostín. Způsob pěstování je podobný jako u fazolu.

<https://www.rostliny.net/>