

Ichnocarpus

čeleď: Apocynaceae

Roste v Číně, Indii a jihovýchodní Asii v podobě šplhavé rostliny anebo liány. Listy jsou vstřícné. Květenství je vrcholičnaté, vrcholové nebo úžlabní, vlastní květy jsou malé, bílé, nažloutlé nebo červené. Plodem je měchýřek s mnoha semeny. Nejznámějším druhem je *I. frutescens*.

Ichnocarpus frutescens

oblasti: Bangladéš, Bhútán, Filipíny, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Indie, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Malajský poloostrov, Myanmar (Barma), Nepál, Nová Guinea, Pákistán, S Austrálie, Srí Lanka, Thajsko, Vietnam, Yunnan

Roste od Indie a Číny po Austrálii v podobě stálezelené liány. Dorůstá výšky až 10m při průměru 6cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou eliptické až kopinaté, špičaté nebo zašpičatělé, tmavězelené, jemně ochlupené, dlouhé (4 -) 5 - 10 (i 11)cm, široké (1,5 -) 2,5 - 4,5 (i 5)cm, báze kulatá nebo špičatá, spodní strana je světlejší, žilnatinu tvoří 5 - 7 párů žilek a řapíky jsou dlouhé (0,25 -) 0,5 - 1,5cm. Květenství je několikačetné, velikosti 3 - 8cm, vlastní květy mají ochlupený kalich délky 1mm, koruna má trubku délky 2,5 (i 3,5)mm, laloky jsou podlouhlé a dlouhé (1,5 -) 2 - 6mm. Plody jsou válcovité měchýřky délky (8 -) 10 - 15cm, šířky 4 - 5mm, mohou být zahnuté a obsahují čárkovitá až podlouhlá semena délky (0,7 -) 1 - 2cm.

Ichnocarpus fulvus

oblasti: Thajsko, Vietnam

Roste v Thajsku a Vietnamu.

Ichnocarpus latifolius

Ichnocarpus uliginosus

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2254>

<https://www.rostliny.net/>