Acanthospermum (Bodlosemenka)

čeleď: Asteraceae

Roste v Americe a jižní Africe jako bylina, zpravidla jednoletka. Stonek je ochlupený. Listy jsou vstřícné a jednoduché. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka.

Acanthospermum australe (Bodlosemenka jižní)

oblasti: Alabama, Arkansas, Bolívie, Brazílie, Demokratická Republika Kongo (Zair), Florida, Francouzská Guyana, Georgia, Guyana, Havajské ostrovy, Jižní Karolína, Karibik, Kolumbie, KwaZulu-Natal, Louisiana, Massachusetts, Mexiko, Mississippi, New York, Oregon, Paraguay, Pennsylvania, Severní Karolína, Surinam, SV Argentina, Tanzánie, Tennessee, Texas, Uruguay, V Austrálie, Venezuela, Virginie

Roste v Jižní Americe a místy v Karibiku jako jednoletka nebo krátkověká trvalka, zavlečená byla do USA, Mexika, Afriky a Austrálie. Stonek je poléhavý, ochlupený, větvený a dlouhý 0,1 - 0,6 (i 1,2)m. Listy jsou vstřícné, široce vejčité, tupé nebo špičaté, asymetricky vroubkované až zubaté, mohou být ochlupené, dlouhé 1,3 - 3,7cm, široké 0,7 - 3,2cm, báze klínovitá a řapíky krátké. Květenstvím je vrcholový nebo úžlabní úbor o průměru 6 - 7mm (v době plodu až 2cm) na 0,4 - 1,6cm stopce, vnějších zákrovních listenů má 5, jsou eliptické až vejčité, tupé, dlouhé 3 - 4mm, vnitřní zákrovní listeny jsou osténkaté, okvětních lístků je 5 - 9, jsou samičí, nažloutlé, terčové květy jsou samčí, v počtu 12ks, jsou nažloutlé a dlouhé 2,5mm. Plodenství je 6 - 9tičetné, eliptické, 5 - 7mižeberné, dlouhé 7 - 9mm, hákovitě ostnité a vlastním plodem je nažka.

Vyskytuje se zpravidla na písečných půdách.

Acanthospermum consobrinum

oblasti: Paraguay

Roste v Paraguayi.

Acanthospermum glabratum

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), JV Brazílie

Roste v Brazílii, zavlečená byla do JAR a USA. Květenství je světležluté. Plodem je nažka.

Acanthospermum hispidum

oblasti: Afrika, Alabama, Asie, Austrálie, Brazílie, Evropa, Florida, Georgia, Havajské ostrovy, Jižní Karolína, New Jersey, New York, Ontario, Oregon, Portoriko, Virginie

Roste v Jižní Americe jako jednoletka, ale zavlečená byla na ostatní kontinenty kromě Antarktidy.

Acanthospermum humile

oblasti: Alabama, Florida, Jižní Amerika, Jižní Karolína, Karibik, New York

Roste v Karibiku, zavlečená byla do střední a Jižní Ameriky.

Acanthospermum lecocarpoides

oblasti: Galapágy

Roste na Galapágách.

Acanthospermum microcarpum

oblasti: Ekvádor, Galapágy

Roste v Ekvádoru a Galapágách.

Další informace:
https://botany.cz/cs/acanthospermum-australe/

https://www.rostliny.net/