

Ixeridium

čeleď: Asteraceae

Roste v Číně, Tibetu, Japonsku, Nepálu, Thajsku, Vietnamu, Kurilských ostrovech, Indii, Koreji, Indonésii a Nové Guineji. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka.

Ixeridium aculeolatum

oblasti: Xizang (Tibet)

Roste v Tibetu.

Ixeridium alpicola

oblasti: Japonsko

Roste v Japonsku v kobercových porostech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Spodní listy jsou obkopynaté, špičaté, mohou být zubaté, řapíkaté, bledězelené, dlouhé 2 - 8cm a lodyžní jsou čárkovité. Květenstvím je žlutý úbor o průměru 2cm s 9 - 10ti okvětními lístky.

Vyhovují jí skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízkou.

Ixeridium beauverdianum

oblasti: Bhútán, Čína, Japonsko, Nepál, Thajsko, Vietnam

Roste v Bhútánu, Japonsku, Nepálu, Thajsku, Vietnamu a Číně.

Ixeridium dentatum

oblasti: Čína, Filipíny, Japonsko, Korea

Roste na Kurilských ostrovech, v Číně, Japonsku, Koreji a Filipínách.

Ixeridium gracile

oblasti: Ásám, Bhútán, Nepál, Sikkim, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Nepálu, Bhútánu, Indii, Tibetu a Číně.

Ixeridium kurilense

oblasti: V Asie

Roste na Kurilských ostrovech v trsech. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Spodní listy jsou úzce kopinaté, špičaté, řapíkaté, na bázi klínovité, lodyžní jsou pouze 1 - 2ks, menší a prakticky přisedlé. Květenstvím tvoří 3 - 8 žlutých úborů s válcovitým zákrovem.

Vyhovují jí vlhké dobře propustné půdy bohaté na živiny na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

Ixeridium laevigatum

oblasti: Ásám, Čína, Filipíny, Indočína, Indonésie, Japonsko, Korea, Malajsie, Nová Guinea

Roste v Číně, Japonsku, Koreji, Indii, Filipínách, Indočíně, Malajsii, Indonésii a Nové Guineji.

Ixeridium nipponicum

oblasti: Japonsko

Roste v Japonsku.

Ixeridium parvum

oblasti: Kjúšú

Roste v Japonsku v kobercových porostech. Dorůstá výšky 10 - 25cm. Spodní listy jsou obkopinaté, dlouhé 2 - 5cm a lodyžní jsou čárkovité. Květenstvím je několikačetný chocholík ze žlutých úborů o průměru 1cm s 5ti okvětními lístky.

Vyhovují jí dobře propustné mírně vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

Ixeridium pusillum

Ixeridium pygmaeum

Ixeridium sagittarioides

oblasti: Bhútán, Indie, Myanmar (Barma), Nepál, Pákistán, Thajsko, Yunnan

Roste v Číně, Bhútánu, Indii, Pákistánu, Myanmaru, Nepálu a Thajsku v podobě vzpřímené dvouletky nebo trvalky. Dorůstá výšky 25 - 60cm. Stonek bývá větvený. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou 3úhle vejčité, dlouhé 3,5 - 9cm, široké 0,7 - 3cm, úkrojky jsou 3úhlé, na bázi střelovité, občas jsou listy kopinaté, řapíky jsou úzce křídlaté, dlouhé 10 - 25cm, pokud se vyskytnou lodyžní listy, je jich pouze několik a jsou menší. Květenství je 8 - 16tikvěté na slabé stopce, zákrov je zelený, dlouhý 6 - 7 (i 8)mm, široký 2mm, zákrovní lístky jsou vejčité kopinaté, špičaté, vnější krátké,

vnitřních 6 - 10ks je čárkovitých a okvětní lístky jsou žluté. Plodem je eliptická nažka délky 2 - 2,5mm se zobákem délky 1mm a chmýrem délky 3 - 4mm.

Ixeridium sandsii

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 2cm. Spodní listy jsou husté, eliptické, špičaté až tupé s hrotem a prakticky celokrajné. Květenstvím je přisedlý bleděžlutý úbor o průměru 8mm s válcovitým zákrovem.

Vyhovují ji dobře propustné středně úrodné mírně vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Ixeridium subacaule

oblasti: Nová Guinea

Roste na Nové Guineji v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 3cm. Spodní listy jsou husté, čárkovité, prakticky tupé, ztlustlé, řídce žláznaté a prakticky přisedlé. Květenstvím je žlutý prakticky přisedlý úbor s válcovitým zákrovem.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá dobře propustná půda a polostín.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Ixeridium transnokoense

oblasti: JV Čína, Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v trsech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Spodní listy jsou husté, úzce eliptické, špičaté s hrotem, max. řídce mělce zubaté, lodyžních je 1 - 3ks, jsou čárkovité a menší. Květenstvím je chocholík složený ze žlutých úborů.

Vyhovují ji dobře propustné vlhké půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Ixeridium yakuinsulare

oblasti: Kjúšú

Roste v Japonsku.

Ixeridium yunnanense

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v trsech. Dorůstá výšky 8 - 15cm. Spodní listy jsou eliptické nebo obkopynaté, špičaté až zakulacené s hrotem, mohou být mělce zvlněně zubaté, dlouhé 2 - 4cm, lodyžní jsou podobné, ale menší. Květenstvím je chocholík složený ze žlutých úborů.

Vyhovují ji dobře propustné mírně vlhké půdy bohaté na živiny a plné slunce.

Množí se semeny, dělením nebo řízký.

<https://www.rostliny.net/>