

# Ixeris

čeleď: Asteraceae

Květenstvím je úbor v barvě žluté, modré nebo bílé. Plodem je mírně zploštělá dlouze zobánkatá nažka s chmýrem. Neznámějším druhem je *I. stolonifera*.

## Ixeris chinensis

## Ixeris integra

## Ixeris japonica

oblasti: J Japonsko, JV Čína, Korea, Tchaj-wan, Tichý oceán, Vietnam

Roste v Číně, Japonsku, Koreji, Boninských ostrovech, Tchaj-wanu a Vietnamu v růžicích a trsech. Dorůstá výšky 15 - 35cm. Přízemní listy jsou eliptické až prakticky čárkovité, mohou být i zpeřené, sbíhavé, lodyžní jsou podobné a menší. Květenství tvoří žluté úbory v 1 - 6tičetném chocholíku a zákrov je válcovitý.

Vyhovují jí středně úrodné dobře propustné a vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

## Ixeris longirostra

## Ixeris longirostrata

oblasti: Tichý oceán

Roste na Boninských ostrovech v růžicích a trsech. Dorůstá výšky 10 - 20cm. Přízemní listy jsou úzce vejčité, tupé, dlouhé 3 - 8cm a lodyžních je pouze několik srdčitého tvaru. Květenstvím je žlutý úbor v 5 - 20tičetném chocholíku.

Vyhovují jí středně úrodné vlhké dobře propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

## Ixeris microcephala

## Ixeris musashensis

## Ixeris nikoensis

## Ixeris papuana

## Ixeris podlechii

oblasti: Afganistán, Pákistán

Roste v Afganistánu a Pákistánu jako dvouletka nebo trvalka. Dorůstá výšky 25 - 35cm. Pod zemí vytváří tenké kořínky. Listy jsou přisedlé, spodní mohou být mírně zubaté až řídce mírně laločnaté, dlouhé 12cm, široké 1cm, horní jsou menší, kopinaté a dlouze špičaté. Květenstvím je lata na tenké stopce délky 1 - 2,5cm, zákrov je tmavězelený, dlouhý 5 - 7mm, vnější zákrovní lístky jsou malé a vnitřní kopinaté. Plodem je mírně zploštělá tmavěhnědá až hnědočervená nažka délky 2 - 2,5mm, s 10ti hlubokými žebry, se zobákem délky 1,5mm a bílým chmýrem délky 4mm.

## Ixeris polycephala

oblasti: Afganistán, Bhútán, Indie, J Čína, J Korea, Japonsko, JV Čína, Myanmar (Barma), Pákistán, S Korea, Tchaj-wan, Vietnam

Roste od Afganistánu a Pákistánu po Japonsko, Koreu a Vietnam jako jednoletka. Dorůstá výšky 12 - 80cm. Stonek může být větvený. Přízemní listy jsou řapíkaté, čárkovité až kopinaté, zubaté až peřenosečné s 2 - 5ti páry laloků, dlouhé 5 - 25cm, široké 0,5 - 2cm, horní lodyžní listy jsou přisedlé, širší a zpravidla celokrajné. Květenstvím je lata nebo okolík, tvořený z úborů délky 4 - 8mm, šířky 3 - 5mm na 0,5 - 1,5cm stopce, zákrov má délku 3 - 5mm, šířku 1,5 - 2,5mm, vnější zákrovní lístky jsou drobné, vnitřní úzce kopinaté, v počtu 6 - 10ks, okvětních lístků je 10 - 20 a jsou žluté. Plodem je hnědočervená nažka délky 3mm, s 10ti žebry, se zobákem délky 1,5mm a chmýrem délky 3 - 4mm.

## Ixeris prolixa

## Ixeris repens

oblasti: J Japonsko, JV Čína, Kamčatka, Korea, S Čína, Sachalin, Střední Čína, Tchaj-wan, Vietnam

Roste na Dálném východě, v Číně, Japonsku, Koreji a Vietnamu v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou široce vejčité, ztlustlé, dlanitě dělené na 3 eliptické tupé úkrojky. Kvete žlutými úbory v 1 - 3četném chocholíku na lodyze vyrůstající z paždí listů.

Vyhovují jí chudé písčité vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

## Ixeris retrorsidens

## Ixeris riparia

## Ixeris siamensis

### Ixeris stolonifera

oblasti: Delaware, Japonsko, JV Čína, Korea, New Jersey, New York, Pennsylvania, Tchaj-wan

Roste v Číně, Japonsku a Koreji jako trvalka v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10 (i 15)cm. Listy jsou vejčité kulovité, tupé a dlouze řapíkaté. Květenstvím tvoří několik žlutých úborů v chocholíku, zákrov je zvonkovitý a dlouhý 3 - 4mm. Plodem je nažka.

Vyskytuje se na horských svazích a skalách se středně úrodnou vlhkou dobře propustnou půdou na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

### Ixeris tamagawaensis

oblasti: Japonsko, JV Čína, Tchaj-wan

Roste v Japonsku a Tchaj-wanu v růžicích a trsech. Dorůstá výšky 15 - 30cm. Pod zemí vytváří kulovitý kořen. Listy jsou úzce kopinaté, špičaté, lodyžních bývá pouze 1 - 3ks a jsou z části objímavé. Květenstvím je žlutý úbor v chudém chocholíku.

Vyhovují mu štěrkovitá vlhká místa bohatá na živiny na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

### Ixeris tapetodes

oblasti: Afganistán, Pákistán

Roste v Afganistánu a Pákistánu jako trvalka. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Vytváří mnoho vzpřímených až vystoupavých stonků. Přízemní listy jsou obkopinaté, dlouhé 4 - 7mm, široké 0,7 - 1,2cm, na bázi sbíhavé, lodyžní jsou podobné, čárkovité a špičaté. Květenstvím je úbor délky 1cm, zákrov je válcovitý, 2řadý, dlouhý 6 - 7mm, vnějších zákrovních lístků je 5, jsou velmi krátké, vnitřních je 7 - 8ks, jsou úzce kopinaté až čárkovité, na okraji bílé a okvětní lístky jsou žluté. Plodem je nažka délky 2mm s 0,5mm zobákem a bílým chmýrem délky 2,5mm.

### Ixeris trifida

### Ixeris umbellata

### Ixeris ×chinodebilis

### Ixeris ×nakazonei

Ixeris ×sekimotoi

<https://www.rostliny.net/>