

Raoulia (Raulie)

synonyma: Gnaphalium, Psychrophyton

čeleď: Asteraceae

Roste na Novém Zélandě anebo vyšších polohách Nové Guineje. Stonky mohou u některých druhů znovu zakořenit. Listy jsou drobné a střečovité. Květenstvím je úbor. Plodem je nažka. Nejznámějším druhem je *R. australis*.

Raoulia albosericea

synonyma: *R. australis* var. *albosericea*, *R. hookeri* var. *albosericea*

Raoulia apice-nigra

synonyma: *R. australis* var. *apicinigra*, *R. hookeri* var. *apicinigra*

Raoulia australis (Raulie jižní)

synonyma: *R. australis* var. *lutescens*, *R. lutescens*, *Ruellia australis* var. *australis*

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou střečovité, kopistvité, zašpičatělé, plstnaté a dlouhé do 2mm. Květenstvím je bledě žlutý úbor velikosti 4 - 5mm a zákrovní listy mají špičky žluté.

Vyskytuje se v horských polohách, v puklinách, v chudé dobře propustné půdě, na plném slunci a suchém zimním režimem.

Množí se semeny, dělením nebo řízkem.

Raoulia beauverdii

Raoulia buchananii

synonyma: *Psychrophyton buchanani*

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v polštářových porostech. Dorůstá výšky 3 - 5cm. Listy jsou střečovité, uťaté až zašpičatělé, dlouze ochlupené a dlouhé 2 - 4mm. Květenstvím je tmavě červený úbor o průměru do 6mm a zákrov je na bázi ochlupený.

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, dostatek vody a polostín.

Množí se semeny nebo řízkem.

Raoulia cinerea

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v kobercových porostech. Dorůstá výšky 2 - 5cm. Listy jsou střechovité, čárkovité, zašpičatělé, na vrcholu vystoupavé a dlouhé 5 - 7mm. Květenstvím je nažloutlý úbor o průměru do 5mm, zákrovní listeny mají špičky světle hnědé.

Vyhovují ji dobře propustné úrodnější mírně vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízkami.

Raoulia gibbsii

Raoulia glabra

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v kobercových porostech jako polokeř. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou až střechovité, úzce vejčité, tupé, světle zelené, prakticky holé a dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je bílý úbor velikosti do 9mm, listeny mají vrcholy bílé nebo nažloutlé.

Vyhovuje mu dobře propustná půda bohatší na živiny, vlhko a plné slunce.

Množí se semeny, dělením nebo řízkami.

Raoulia haastii

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě jako polokeř v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy vytvářejí růžici, jsou jehlicovité, 3řížné, vztyčené a dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je drobný bílý úbor v klubku.

Vyhovují ji kamenité vlhké půdy s dostatkem živin v polostínu.

Množí se semeny, dělením nebo řízkami.

Raoulia hookeri

synonyma: *R. hookeri* var. *hookeri*

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu jako trvalka v polštářových porostech o průměru do 50cm a výšce 1 - 5cm. Listy jsou střídavé, střechovité, obvejčité až kopist'ovité, zakulacené až uťaté, stočené vzhůru, přisedlé, dlouhé 2mm, široké 1mm a kromě báze ochlupené. Květenstvím je prakticky přisedlý úbor o průměru 5 - 7mm, vnější zákrovní listeny jsou listnaté, vnitřní čárkovité, tupé, okrové, dlouhé do 5mm, terčových květů je cca 15ks, vnější jsou samičí, vnitřní oboupohlavné nebo sterilní a koruna je úzce nálevkovitá. Plodem je nažka délky do 1mm s chmýrem délky 4mm.

Vyhovují jí holá vlhká místa na skalních terasách ve vyšších nadmořských výškách na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

Raoulia loganii

Raoulia monroi

synonyma: R. cheesemanii

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě v podobě polokeře v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 3cm. Listy jsou husté, čárkovité až úzce kopist'ovité, tupé, na konci plstnaté a dlouhé 2 - 3mm. Květenstvím je bílý úbor o šířce do 5mm a konce listenů jsou tmavěhnědé.

Vyhovují mu skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, nízká zálivka a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

Raoulia parkii

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě jako polokeř v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou střečovité, obvejčité kopist'ovité, zakulacené, na konci plstnaté a dlouhé 3 - 5mm. Květenstvím je žlutý úbor o průměru 4 - 7mm a konce listenů jsou bílé.

Vyhovují jí skalní pukliny, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

Raoulia petriensis

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě jako polokeř v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou střečovité, obvejčité kopist'ovité, zašpičatělé, na vrcholu plstnaté, dlouhé 4 - 6mm a spodní strana je ochlupená. Květenstvím je bílý úbor velikosti 6 - 7mm, listeny mají konce bílé a ochlupené.

Vyhovují jí dobře propustné mírně úrodné vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

Raoulia planchonii

Raoulia subsericea

oblasti: J Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu jako polokeř v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou střechovité, podlouhlé, světle zelené, na bázi plstnaté a dlouhé 3 - 6mm. Květenstvím je bílý úbor velikosti do 1cm a konce listenů jsou bílé.

Vyhovují jí středně úrodné vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

Raoulia tasmanica

Raoulia tenuicaulis

synonyma: R. tenuicaulis var. dimorpha, R. tenuicaulis var. tenuicaulis

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Roste na Novém Zélandě jako polokeř v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou střechovité, kopinaté, špičaté nebo zašpičatělé, při vrcholu řádce plstnaté a dlouhé do 5mm. Květenstvím je bílý úbor velikosti do 6mm a zákrovní listy mají vrcholy tmavé.

Vyhovují mu kamenitá vlhká místa s dostatkem živin na plném slunci.

Množí se semeny, dělením nebo řízků.

Raoulia ×petrimia

Další informace:

<https://botany.cz/cs/raoulia-hookeri/>

<https://www.rostliny.net/>