

Duguetia

synonyma: Alcmene, Geanthemum, Pachypodanthium

čeleď: Annonaceae

Roste v Karibiku a Panamy po Paraguay a několik druhů v západní Africe v podobě stromu nebo keře. Na povrchu jsou hvězdovité chlupy nebo šupiny. Listy vyrůstají ve 2 řadách. Kvete po 1 až mnoha květy, zpravidla proti listům anebo občas přímo na kmeni, vlastní květy mohou být bílé až žluté (i červené), oboupohlavné, mají 3 kališní lístky a 6 zpravidla kožovitých korunních lístků. Plody obsahují zpravidla tmavěhnědá obvejčitá semena.

Duguetia aberrans

Duguetia amplexifolia

Duguetia antioquensis

Duguetia arenicola

oblasti: Amazonas

Roste v Brazílii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 4m. Větve jsou v mládí ochlupené a šupinaté. Listy jsou úzce eliptické až úzce obvejčité, zašpičatělé (v délce 1 - 1,5cm), dlouhé 8 - 11cm, široké 2 - 4cm, báze je špičatá, spodní strana ochlupená a šupinatá, žilnatinu tvoří 7 - 10 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3mm. Kvete po 1 - 5ks na 0,2 - 1,1cm stopce, kališní lístky jsou vně ochlupené, vejčité 3úhlé, dlouhé 0,5 - 2cm, korunní lístky jsou béžové až žluté, vně ochlupené a šupinaté, obvejčité až úzce eliptické, dlouhé 1,4 - 2,7cm a široké 0,7 - 1,4cm. Plody jsou žlutozelené, prakticky kulaté, dlouhé 2 - 2,7cm, široké 1,5 - 3,2cm a semena mají délku 0,8 - 1,2cm.

Duguetia argentea

synonyma: Aberemoa argentea, D. amazonica

Duguetia aripuanae

Duguetia asterotricha

synonyma: Aberemoa asterotricha

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Brazílii a Peru v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 2 - 12m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou úzce obvejčité až úzce eliptické, zašpičatělé až špičaté (v délce 1 - 2,5cm), dlouhé 16 - 33cm, široké 5 - 10cm, báze je špičatá až tupá, spodní strana ochlupená, žilnatinu tvoří 12 - 18 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 8mm. Kvete po 1 - 3ks na 0,5 - 1,5cm stopce, kališní lístky jsou vně ochlupené, z 1/2 srostlé, dlouhé 2,5 - 5,5cm, laloky 3úhlé, žebernaté, korunní lístky

jsou bílé až žluté, úzce obvejčitě lopatkovité, dlouhé 3 - 4cm a široké 0,8 - 1,2cm. Plody jsou nahnědlé, prakticky kulaté, široké 1,5 - 3cm a semena mají délku 0,7 - 1cm.

Duguetia bahiensis

Duguetia barteri

synonyma: *Annona barteri*, *Pachypodanthium barteri*

Duguetia cadaverica

synonyma: *D. adiscandra*, *D. friesii*, *Geanthemum cadavericum*

Květy vydávají aroma lákající brouky.

Duguetia calycina

synonyma: *D. calycina* subsp. *jenmanii*, *D. calycina* subsp. *versteegii*, *D. cuspidata*, *D. elegans*

oblasti: Brazílie, Francouzská Guyana, Guyana, Venezuela

Roste ve Venezuele, Brazílii, Guyaně a Francouzské Guyaně v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 1 - 10m. Větve jsou v mládí ochlupené, později šupinaté a nakonec holé. Listy jsou úzce eliptické, zašpičatělé (v délce 0,5 - 2cm), dlouhé 15 - 25cm, široké 4 - 7cm, báze je tupá (i špičatá), spodní strana šupinatá, žilnatinu tvoří 8 - 14 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1cm. Kvete samostatnými nebo párovými květy na 0,5 - 1,5cm stopce, kališní lístky jsou vně šupinaté, vejčitě 3úhlé, dlouhé 1 - 1,7cm, korunní lístky jsou béžově bílé, aromatické, obvejčité, dlouhé 1,5 - 3cm a široké 1 - 2cm. Plody jsou nahnědlé až žluté, eliptické až prakticky kulaté, dlouhé 3 - 8cm, široké 2 - 4,5cm a obsahuje semena délky 0,7 - 1,1cm.

Duguetia caniflora

Duguetia cauliflora

Duguetia chrysea

Duguetia chrysocarpa

Duguetia colombiana

Duguetia confinis

synonyma: *Pachypodanthium confine*, *Pachypodanthium confine* var. *sargosii*, *Pachypodanthium sargosii*, *Unona confinis*

Duguetia confusa

Duguetia decurrens

Duguetia dicholepidota

Duguetia dilabens

Duguetia dimorphopetala

Duguetia duckei

Duguetia echinophora

Duguetia elliptica

Duguetia eximia

Duguetia flagellaris

synonyma: *D. heteroclada*, *D. trichostemon*

oblasti: Bolívie, Brazílie, Ekvádor, Kolumbie, Peru, Venezuela

Roste v Kolumbii, Venezuele, Ekvádoru, Peru, Bolívii a Brazílii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 1,5 - 10m. Větve jsou v mládí šupinaté. Listy jsou úzce eliptické až úzce obvejčité, zašpičatělé nebo špičaté (v délce do 1,5cm), dlouhé 15 - 25cm, široké 4 - 7cm, báze je špičatá, spodní strana řídce šupinatá, žilnatinu tvoří 10 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 7mm. Květenství vyrůstá od báze kmene po výšku 1,5m, vlastní květy mají 0,7 - 1cm stopku, kališní lístky jsou vně šupinaté, vejčité, na bázi srostlé, dlouhé 0,6 - 1,1cm, korunní lístky jsou červené, sladce aromatické, eliptické až vejčité, zašpičatělé, dlouhé 0,6 - 2cm a široké 3 - 8mm. Plody jsou růžové až hnědé, prakticky kulaté, průměru 3 - 4,5cm a obsahuje semena délky 1,2 - 1,6cm.

Duguetia furfuracea

synonyma: *Aberemoa furfuracea* var. *jonasiana*, *Annona furfuracea*, *D. coriacea*, *D. hemmendorffii*, *D. jonasiana*

Duguetia gardneriana

Duguetia gentryi

Duguetia glabriuscula

synonyma: *Aberemoa lanceolata* var. *glabriuscula*

Duguetia granvilleana

Duguetia guianensis

Duguetia hadrantha

synonyma: *Aberemoa hadrantha*

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 12m. Větve jsou v mládí šupinaté. Listy jsou obvejčité, obkopynaté (i podlouhlé), špičaté, lesklé, dlouhé 8 - 20cm, široké 4 - 7cm, na bázi klínovitě špičaté, spodní strana je šupinatá a řapíky jsou dlouhé 3 - 5mm. Kvete na 5 - 6mm stopce, kališní lístky jsou vejčité, tupé, vně šupinaté, dlouhé 1,5 - 2cm, v délce 3 - 5mm srostlé, korunní lístky jsou úzce vejčité, tupé a vně šupinaté.

Duguetia inconspicua

Duguetia lanceolata

synonyma: *Aberemoa lanceolata* var. *parvifolia*, *D. lanceolata* var. *parvifolia*

Duguetia latifolia

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 10m. Větve jsou v mládí šupinaté nebo ochlupené. Listy jsou špičaté, dlouhé do 30 - 40cm, široké 8 - 12cm, báze zašpičatělá až tupá a spodní strana zprvu ochlupená nebo šupinatá. Kvete na starých větvích, květenství je bohaté, vlastní květy mají 1 - 1,5cm stopku, kališní lístky jsou vejčité, špičaté, dlouhé 1cm, korunní lístky jsou lopatkovité, široce zakulacené, vně ochlupené a dlouhé 1,5 - 1,8cm. Plody jsou kulovité a široké 2 - 3cm.

Duguetia lepidota

synonyma: *Aberemoa lepidota*, *Annona lepidota*

oblasti: Brazílie, Kolumbie, Venezuela

Roste v Brazílii, Venezuele a Kolumbii v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 20m při průměru kmene 15 - 70cm. Plody jsou růžově žluté.

Duguetia longicuspis

Duguetia lucida

Duguetia macrocalyx

Duguetia macrophylla

synonyma: *D. spruceana*

oblasti: Peru

Roste v Peru v podobě stromu. Dorůstá výšky 7 - 9m. Listy jsou obkopynaté, špičaté, tuhé, dlouhé 35 - 45cm, široké 10 - 13cm, báze zakulacená a spodní strana v mládí šupinaté. Kvete na 1cm stopce, kališní lístky jsou vejčité, zašpičatělé, vně šupinaté, dlouhé 1,5 - 1,8cm, korunní lístky bílé, tupé, vně šupinaté, vnější podlouhlé, široké 1,5cm, vnitřní čárkovité a široké 9mm.

Duguetia magnolioidea

Duguetia manausensis

Duguetia marcgraviana

synonyma: *Aberemoa brevipedunculata*, *Aberemoa marcgraviana*, *Aberemoa sancrat-crucis*, *Aberemoa sanctae-crucis*, *D. brevipedunculata*, *D. sanctae-crucis*, *D. sancticrucis*

Duguetia megalocarpa

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 30m při průměru kmene do 40cm. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou úzce eliptické, špičaté až zašpičatělé, lesklé, řídce ochlupené, dlouhé 9 - 27cm, široké 3 - 10cm, báze tupá, spodní strana hustě ochlupená, žilnatinu tvoří 9 - 12 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 5mm. Kvete samostatnými květy na 1 - 3cm stopce, kališní lístky jsou vejčité 3úhlé, vně ochlupené, dlouhé 1,5 - 2cm, korunní lístky jsou mírně obvejčité, nazelenalé, dlouhé 2 - 3cm a široké 1,3 - 1,5cm. Plody jsou žlutozelené, kulovité, široké 12 - 15cm a obsahují semena s hrotem délky 2,7cm.

Duguetia megalophylla

Duguetia microphylla

synonyma: *Aberemoa microphylla*

Duguetia montana

Duguetia moricandiana

Duguetia neglecta

Duguetia nitida

Duguetia oblanceolata

Duguetia oblongifolia

Duguetia odorata

synonyma: Aberemoa odorata

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 12m. Listy jsou úzce eliptické až obkopinaté, oboustranně protáhlé, dlouhé 15 - 30cm, široké 4 - 9cm a spodní strana je šupinatá. Kvete na starých větvích, kališní lístky jsou vně šupinaté, korunní lístky jsou mírně lopatkovité, zakulacené, vně šupinaté, uvnitř ochlupené a dlouhé 1,7 - 2cm.

Duguetia oligocarpa

Duguetia panamensis

oblasti: Panama

Duguetia paraensis

Duguetia pauciflora

synonyma: D. rostrata

Duguetia peruviana

synonyma: Aberemoa peruviana, Annona conifera

oblasti: Peru

Roste v Peru. Větve jsou v mládí šupinaté a žluté. Listy jsou podlouhlé až úzce kopinaté, zašpičatělé (v délce 1 - 1,5cm), lesklé, spodní strana je sivozelená, šupinatá a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Květenství je přisedlé, 1 - 3květé, vlastní květy mají 7mm stopku, kališní lístky jsou úzce vejčité, vně šupinaté, dlouhé 1,2 - 1,3cm, korunní lístky jsou zakulacené, dlouhé 1,5cm, vnější vejčité, široké 8mm, vnitřní obvejčité a široké 1cm.

Duguetia phaeocarpa

Duguetia phaeoclados

synonyma: *Aberemoa laevis*, *Annona phaeoclados*

Duguetia pohliana

synonyma: *Guatteria lutescens*

Duguetia pycnastera

oblasti: Brazílie, Francouzská Guyana, Guyana, Venezuela

Roste v Brazílii, Venezuele, Guyaně a Francouzské Guyaně v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 10m při průměru kmene do 25cm. Větve jsou v mládí rýhované a ochlupené. Listy jsou eliptické, zašpičatělé (v délce 1 - 6cm), puchýřnaté, dlouhé 9 - 29cm, široké 4 - 12cm, báze špičatá až tupá, spodní strana řídce ochlupená, žilnatinu tvoří 7 - 13 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4mm. Kvete po 1 - 2ks na 0,7 - 2cm stopce, kališní lístky vejčité, vně ochlupené, dlouhé 0,8 - 2cm, korunní lístky béžové, aromatické, vně vejčité, dlouhé 1,1 - 1,8cm, široké 4 - 9mm, vnitřní úzce vejčité, dlouhé 1 - 1,6cm a široké 3 - 7mm. Plody jsou prakticky kulaté, žlutočervené, průměru 1,5 - 2,3cm a obsahují semena délky 6mm.

Duguetia quitarensis

synonyma: *Aberemoa quitarensis*, *D. ibonensis*, *D. tessmannii*

oblasti: Bolívie, Brazílie, Guyana, Peru

Roste v Peru, Bolívii, Brazílii a Guyaně v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 13m. Větve jsou v mládí šupinaté. Listy jsou kopinaté až eliptické, oboustranně špičaté, v mládí oboustranně šupinaté, dlouhé (10 -) 15 - 20 (i 25)cm, široké (3 -) 5 - 6 (i 9)cm a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 0,7 (i 1,3)cm. Kvete po 1 - 2ks na 0,3 - 0,7 (i 1,5)cm stopce, kališní lístky jsou úzce eliptické, vně šupinaté, dlouhé (1,1 -) 1,2 - 1,3 (i 1,5)cm, široké 0,9 - 1,1cm, korunní lístky podlouhlé, zakulacené, vně šupinaté, dlouhé 1,5 - 2 (i 2,4)cm a široké (0,6 -) 0,7 - 0,8 (i 1,2)cm. Plody mají průměr 3 - 4cm.

Duguetia restingae

Duguetia reticulata

Duguetia riberensis

Duguetia riedeliana

Duguetia rigida

Duguetia rionegrensis

Duguetia riparia

synonyma: *D. insculpta*

oblasti: Bolívie, Brazílie, Francouzská Guyana, Kolumbie, Surinam

Roste v Kolumbii, Bolívii, Brazílii, Francouzské Guyaně a Surinamu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 3 - 10m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou úzce vejčité až úzce obvejčité, špičaté až zašpičatělé (v délce 0,5 - 3cm), puchýřnaté, dlouhé 9 - 33cm, široké 3,5 - 7,5cm, báze je tupá, spodní strana řídce šupinatá, žilnatinu tvoří 9 - 17 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 7mm. Kvete po 1 - 7ks na 0,2 - 1,7cm stopce, kališní lístky jsou vně ochlupené až šupinaté, široce vejčité 3úhlé, dlouhé 0,8 - 1,9cm, korunní lístky jsou béžové až žluté, korunní lístky eliptické až obvejčité, dlouhé 1,2 - 3cm a široké 1 - 1,9cm. Plody jsou široce vejčité až široce eliptické, hnědé, dlouhé 2,2 - 6cm, široké 2 - 4cm a obsahuje semena délky 0,7 - 1,3cm.

Duguetia rotundifolia

Duguetia ruboides

Duguetia salicifolia

Duguetia sancticaroli

Duguetia schlechtendaliana

Duguetia schulzii

Duguetia scottmorii

Duguetia sessilis

synonyma: *Aberemoa bracteosa*, *Aberemoa rhizantha*, *Annona rhizantha*, *D. bracteosa*, *D. rhizantha*, *Geanthemum rhizanthum*, *Uvaria sessilis*

Duguetia sooretamae

Duguetia spixiana

synonyma: *Aberemoa spixiana*

oblasti: Brazílie, Peru

Roste v Peru a Brazílii v podobě stromu nebo keře. Větve jsou v mládí šupinaté. Listy jsou úzce eliptické až úzce obvejčité, špičaté, dlouhé 15 - 25cm, široké 5 - 8cm, báze je zakulaceně špičatá (i klínovitá) a spodní strana v mládí šupinatá. Květenství je 1 - 4květé, kališní lístky vně hustě šupinaté, korunní lístky kulatě eliptické, zakulacené, šedě ochlupené a dlouhé 2 - 2,5cm. Plody jsou

eliptické, dlouhé 6 - 7cm a široké 4 - 5cm.

Duguetia staudtii

synonyma: Pachypodanthium staudlii, Pachypodanthium staudtii, Uvaria staudtii

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Gabon (Gabun), Sierra Leone, Středoafriická Republika

Roste ve Středoafriické Republice, Sieře Leone na jih po Gabun a Demokratickou Republiku Kongo v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky do 36m. Kmen je válcovitý a větve mohou začínat až ve výšce 20m. Borka je tuhá, měkká, žlutá nebo šedozelená. Listy jsou střídavé, úzce eliptické až obvejčité, tmavě zelené, dlouhé 10 - 24cm, široké 2 - 5cm, spodní strana je bělavá a řapíky jsou dlouhé 2 - 5mm.

Duguetia stelechantha

oblasti: Brazílie

Roste v Brazílii v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 20m při průměru kmene do 40cm. Větve jsou v mládí šupinaté. Listy jsou úzce eliptické, špičaté až zašpičatělé (v délce 0,5 - 2cm), dlouhé 16 - 35cm, široké 4 - 10cm, báze je tupá až špičatá, spodní strana šupinatá, sekundární žilnatinu tvoří 11 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm. Kvete na starém dřevě na 2,5 - 15cm stopce, květenství je dřevnaté, vlastní květy mají 1 - 3cm stopku, kališní lístky široce 3úhlé, vně šupinaté, dlouhé 0,8 - 1,2cm, korunní lístky béžové, uvnitř na bázi načervenalé, aromatické, úzce eliptické, dlouhé 1,8 - 4cm a široké 0,7 - 1,7cm. Plody jsou kulovité, nahnědlé, průměru 4,5 - 5,5cm a obsahují semena délky 1,2 - 1,6cm.

Duguetia stenantha

Duguetia subcordata

Duguetia surinamensis

synonyma: D. caudata

oblasti: Brazílie, Francouzská Guyana, Guyana, Kolumbie

Roste v Kolumbii, Brazílii, Guyaně a Francouzské Guyaně v podobě stromu. Dorůstá výšky 10 - 30m při průměru kmene do 75cm. Větve jsou v mládí šupinaté. Listy jsou úzce vejčité až úzce eliptické, zašpičatělé (v délce 0,5 - 1,5cm), dlouhé 8 - 19cm, široké 2 - 5cm, báze je protáhlá až špičatá, žilnatinu tvoří 10 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,3 - 1cm. Kvete po 1 - 10ti ks na 1 - 3cm stopce, kališní lístky jsou vně šupinaté, na bázi srostlé, 3úhlé, dlouhé 1 - 2cm, korunní lístky vně šupinaté, béžové, později červené, vejčité 3úhlé až obvejčité, dlouhé 1,5 - 3cm a široké 0,6 - 1,5cm. Plody jsou hnědé až žlutohnědé, prakticky kulovité, průměru 7 - 12cm a obsahují semena délky 1,1 - 1,7cm.

Duguetia tenuis

Duguetia tobagensis

synonyma: *Alcmene tobagensis*

oblasti: Karibik

Roste na Tobagu v podobě malého stromu. Listy jsou dlouhé 6 - 16cm a široké 2,5 - 6,5cm. Kvete na bázi listů ve 2 - 4květem květenství, vlastní květy mají korunní lístky béžové, dlouhé 1,2 - 1,3cm a široké 4 - 7mm.

Duguetia trunciflora

oblasti: Brazílie, Francouzská Guyana, Kolumbie, Peru, Venezuela

Roste v Kolumbii, Venezuele, Peru, Brazílii a Francouzské Guyaně v podobě stromu (i keře). Dorůstá výšky 2 - 20m při průměru kmene do 20cm. Větve jsou v mládí šupinaté. Listy jsou úzce obvejčité až eliptické, zašpičatělé (v délce 0,5 - 2,5cm), až prakticky kožovité, dlouhé 17 - 35cm, široké 5 - 11cm, báze špičatá až tupá, žilnatinu tvoří 10 - 20 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1cm. Kvete na starém dřevě po 1 - 3ks, vlastní květy mají 0,5 - 2cm stopku, kališní lístky jsou vně šupinaté, úzce vejčité až vejčité 3úhlé, dlouhé 1,5 - 3cm, korunní lístky jsou béžové, aromatické, obvejčité až eliptické, dlouhé 2 - 4cm a široké 1,1 - 2,2cm. Plody jsou hnědé až žlutohnědé, kulovité, široké 4 - 5cm a obsahuje semena délky 1 - 1,6cm.

Duguetia tuberculata

Duguetia ulei

synonyma: *Aberemoa ulei*

oblasti: Brazílie, Kolumbie

Roste v Brazílii a Kolumbii v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky 2 - 10m při průměru kmene do 25cm. Větve jsou v mládí šupinaté. Listy jsou úzce eliptické, zašpičatělé (v délce 0,5 - 2cm), dlouhé 18 - 36cm, široké 4 - 12cm, báze je tupá až prakticky srdčitá, spodní strana šupinatá, žilnatinu tvoří 10 - 16 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 4 - 6mm. Kvete po samostatnými nebo párovými květy na 0,5 - 1,5cm stopce, kališní lístky jsou vně šupinaté, až z 1/2 srostlé, dlouhé 2,5 - 4,5cm, laloky 3úhlé, korunní lístky jsou béžové, vně s žebrem, dlouhé 4 - 5cm a široké 2 - 3cm. Plody jsou bílé, později červené, kulovité, průměru 3 - 4cm a semena jsou dlouhá 0,9 - 1,5cm.

Duguetia uniflora

synonyma: *Annona uniflora*, *D. candollei*, *Unona uniflora*

Duguetia vallicola

Duguetia vaupesana

Duguetia venezuelana

Duguetia yeshidan

synonyma: *D. obovata*, *D. sandwichii*

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=3862>

<https://www.rostliny.net/>