

Klasea procumbens

synonyma: *Jurinea paulsenii*, *Serratula flexicaulis*, *Serratula procumbens*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Afganistán, Pákistán, Pamír, Tádžikistán, Ťan-šan, Xinjiang

Roste v Ťan-šanu, Afganistánu, Pákistánu, Tádžikistánu, Pamíru a Číně v podobě vystoupavé trvalky. Pod zemí vytváří vodorovný jednohlavý oddenek. Listy jsou na bázi v růžici, krátce řapíkaté, úzce vejčité až kopinaté či obkopinaté, zašpičatělé, asymetricky pilovité, oboustranně řídce ochlupené, dlouhé 4 - 6 (i 8)cm, široké 1 - 2cm, lodyžní jsou špičaté, celokrajné, dlouhé 2 - 4 (i 5)cm a široké 0,8 - 1,5cm. Květenstvím je úbor průměru 2 - 3cm, zákrov je 5tiřadý, úzce zvonkovitý, světle zelený až světle hnědý, na vrcholu ostnitý, dlouhý 1,8 - 2 (i 2,2)cm, vnější zákrovní lístky 3úhle vejčité, dlouhé 2 - 3mm, na okrajích ochlupené, střední vejčité, dlouhé 3 - 4mm, vnitřní úzce podlouhlé, dlouhé 4 - 5mm, koruna má délku 2,5 - 2,8cm, okvětní lístky růžové až růžově fialové a dlouhé 7 - 8mm. Plodem je nažka délky 5mm s několikařadým chmýrem délky 1,2 - 1,5cm.

<https://www.rostliny.net/>