

Lepidagathis incurva

synonyma: *Justicia cephalotes*, *Lepidagathis aristata*, *Lepidagathis cephalotes*, *Lepidagathis hyalina*, *L. var. incurva*, *Lepidagathis iridescens*, *Lepidagathis mucronata*, *Lepidagathis riparia*, *Ruellia dependens*

čeleď: Acanthaceae

oblasti: Bangladéš, Čína, Indie, Myanmar (Barma), Pákistán, Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Bangladéši, Indii, Pákistánu, Myanmaru, Thajsku a Vietnamu v podobě byliny až polokeře. Dorůstá výšky 0,3 - 0,6 (i 1)m. Kmínky jsou 4hranné, žlábkovité a zprvu ochlupené. Listy jsou vejčité až úzce eliptické či kopinaté, špičaté až zašpičatělé, oboustranně ochlupené, dlouhé (2,5 -) 7 - 8 (i 10)cm, široké (1 -) 2 - 3,5 (i 4,5)cm, báze je klínovitá, sbíhavá, žilnatinu tvoří 4 - 9 párů sekundárních žilek a řapíky jsou dlouhé (0,5 -) 1 - 2 (i 3,5)cm. Květenstvím je protáhlý 1stranný klas délky 0,5 - 3,8cm, listeny jsou úzce kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 0,6 - 1cm, široké 1,5 - 2mm, spodní strana je ochlupená, listeny jsou podobné, menší, vlastní květy mají kalich zprvu i žláznatě ochlupený, dlouhý 0,8 - 1cm, zadní lalok je úzce kopinatý, dlouhý 8 - 9mm, široký 1,5 - 1,7mm, postranní laloky jsou kopinaté, dlouhé 6 - 7,5mm, široké 0,7 - 0,8mm, pření lalok je na bázi až z 1/2 srostlý, koruna je bílá, růžově fialově pruhovaná, vně řídce ochlupená, dlouhá 0,8 - 1cm, trubka má délku 6mm, spodní pysk má velikost 2,5 - 3mm, laloky jsou dlouhé 1,5 - 3mm a široké 1,3 - 1,8mm. Plodem je ochlupená tobolka délky 5 - 6mm a obsahuje 4 ochlupená semena o průměru (1 -) 1,5 - 1,8mm.

<https://www.rostliny.net/>