

Limnophila chinensis

synonyma: *Ambulia ebracteata*, *Ambulia hirsuta*, *Columnea chinensis*, *Columnea cochinchinensis*, *Columnea stellata*, *Limnophila chevalieri*, *L. subsp. chevalieri*, *Limnophila hirsuta*, *Stemodia hirsuta*

čeleď: Plantaginaceae

oblasti: Florida, J Čína, Jáva, Malajský poloostrov, Sulawesi (Celebes), Sumatra, Thajsko, Vietnam

Roste v Thajsku, Indočíně, Číně, Malajském poloostrově, Sumatře, Jávě a Sulawesi jako rozkladitá jednoletka nebo trvalka. Dorůstá délky 5 - 50cm. Stonek dokáže v kolénkách znovu zakořenit a je na bázi větvený. Listy jsou vstřícné nebo v 3 - 4četných přeslenech, vejčitě kopinaté až úzce kopinaté (i lžičkovité), pilovité, dlouhé 0,5 - 5,3cm a široké 0,2 - 1,5cm. Kvete samostatnými květy nebo ve vrcholové latě na 3 - 5mm stopce, listeny jsou dlouhé 2mm, kalich je dlouhý 5 - 7mm, koruna je růžově fialově červená, modrá (i bílá) a velikosti 1 - 1,5cm. Plodem je zploštělá široce eliptická tobolka délky 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *aromatica*/L. *aromatica* (Bahnatka vonná)
- var. *clarkei*

<https://www.rostliny.net/>