

Bupleurum falcatum (Prorostlík srpovitý)

synonyma: *Bupleurum antiochium*, *Bupleurum chlorocarpum*, *Bupleurum corsicum*, *Bupleurum dilatatum*, *B. f. angustifolium*, *B. f. elatum*, *B. f. ellipticum*, *B. f. elongatum*, *B. f. giganteum*, *B. f. lato-oblongum*, *B. f. montenegrinum*, *B. f. multicaule*, *B. f. petiolare*, *B. f. polymorphum*, *B. f. suborbiculatum*, *B. f. subspathulatum*, *B. f. typicum*, *B. subsp. corsicum*, *B. var. angustifolium*, *B. var. corsicum*, *B. var. dilatatum*, *B. var. elongatum*, *B. var. latifolium*, *B. var. longiradiatum*, *B. var. nanum*, *B. var. parnassicum*, *B. var. petiolare*, *B. var. proliferum*, *B. var. sibthorpiatum*, *B. var. variifolium*, *Bupleurum falvatum* var. *stenophyllum*, *Bupleurum flexuosum*, *Bupleurum lipskyanum*, *Bupleurum occidentale*, *Bupleurum oppositifolium*, *Bupleurum parnassicum*, *Bupleurum petiolare*, *Bupleurum petrogenes*, *Bupleurum ranunculoides* f. *souliae*, *Bupleurum rigidum* var. *petiolare*, *Bupleurum rossicum*, *Bupleurum sibthorpiatum*, *Bupleurum souliae*, *Bupleurum woronowii*

čeleď: Apiaceae

oblasti: Afganistán, Česká republika, J Rusko, Katalánsko, Korsika, Pákistán, Polsko, Švýcarsko, Z Asie

Roste v Evropě a západní Asii. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 0,2 - 0,6 (i 1)m. Pod zemí vytváří vícehlavý kúlový kořen. Lodyha je vzpřímená a větvená. V horní části jsou listy přisedlé, ostatní řapíkaté, dlouze eliptické až kopistkovité, špičaté, srpovitě prohnuté, šedozelené, spodní se 7mi žilkami a horní se 7 - 9ti žilkami. Kvete žlutými květy s 5ti okvětními lístky ve složeném okolíku s 1 - 3mi listeny, 5 - 8mi paprsky a okolíčky mají 5 3žilných listenů. Plodem je nažka délky 3 - 4mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *cernuum*/B. *exaltatum* - jižní Evropa až střední Asie; polokeř; výška do 70cm; 1 i více stonků; přízemní listy čárkovité, dlouhé do 12cm, široké 2 - 3mm se 3 - 5ti žilkami, horní listy podobné, ale kratší; kvetenství má 3 - 5 krátkých čárkovitých listenů, 3 - 5 nestejných paprsků, okolíčky mají 5 čárkovitých listenů; plody jsou podlouhlé a dlouhé 3mm
- subsp. *corsicum* - endemit Korsiky
- subsp. *dilatatum*
- subsp. *falcatum* (Prorostlík srpovitý pravý)

Roste v lesích, křovinách, sušších trávnících nejlépe s vápenitou půdou na plném slunci.

<https://www.rostliny.net/>