

Mnesithea

synonyma: Diperium

čeleď: Poaceae

Roste v Asii, Austrálii a Tichém oceánu jako trvalka (i jednoletka). Stonek je mohutný a zpravidla větvený. Listy jsou čárkovité. Květenstvím je válcovitý hrozen.

Mnesithea annua

synonyma: Heteropholis annua

oblasti: Západní Austrálie

Roste v Austrálii.

Mnesithea formosa

synonyma: Manisuris formosa, Rottboellia formosa, Rottboellia formosa f. glabra, Rottboellia formosa f. subglabra, Rottboellia formosa var. pilosissima

oblasti: Malé Sundry, Nová Guinea, Queensland, Severní teritorium, Západní Austrálie

Roste na Malých Sundách, Nové Guineji a Austrálii.

Mnesithea laevis

synonyma: Diperium cylindricum, Hemarthria perforata, M. laevis var. hirta, Ophiuros laevis, Ophiuros perforatus, Ophiuros undulatus, Ophiurus laevis, Paspalum cochinchinense, Rottboellia corymbosa var. cochinchinensis, Rottboellia laevis, Rottboellia monostachya, Thyridostachyum laeve

oblasti: Afganistán, Chajbar Paštúnchwá, Filipíny, Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, Indie, Indonésie, Japonsko, Myanmar (Barma), Paňdžáb (pákistánský), Srí Lanka, Tchaj-wan, Thajsko, Tichý oceán, Vietnam

Roste v Číně, Tchaj-wanu, Japonsku, Indii, Indonésii, Pákistánu, Afganistánu, Myanmaru, Filipínách, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu a Tichomoří jako trvalka. Dorůstá výšky 0,2 - 1m. Pod zemí vytváří krátký oddenek. Listy jsou špičaté, dlouhé 3 - 25cm a široké 2 - 5mm. Květenstvím je vrcholový i úžlabní hrozen délky 5 - 15cm, klásky jsou přisedlé a dlouhé 3 - 4mm.

Mnesithea mollicoma

synonyma: Coelorachis mollicoma, Manisuris mollicoma, M. pubescens, M. triflora, Rottboellia mollicoma, Rottboellia triflora

oblasti: Filipíny, Guangdong, Guangxi, Jáva, Malajsie, Sulawesi (Celebes), Thajsko, Vietnam

Roste v Číně, Thajsku, Vietnamu, Filipínách, Jávě, Malajsii a Sulawesi.

Mnesithea pilosa

oblasti: Queensland

Roste v Austrálii.

Mnesithea thailandica

oblasti: Thajsko

Roste v Thajsku.

Mnesithea veldkampii

oblasti: Maháráštra

Roste v Indii.

<https://www.rostliny.net/>