

Neolitsea

čeleď: Lauraceae

Roste v Asii, Malesii a Austrálii v podobě stálezeleného i opadavého dvoudomého keře nebo stromu. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé až téměř vstřícné, ve svazečcích nebo přeslenité a žilnatinu bývá od báze 3žilná (i peřenožilná). Květenstvím je prakticky přisedlý úžlabní okolík, vlastní květy jsou 2 - 4četné, samčí mají 4 - 5 korunních lístků, samičí 4 - 6. Plodí na tlustém lůžku.

Vyhovuje ji chráněné místo, plné slunce nebo polostín a dobře propustná půda bohatá na živiny.

Množí se polodřevitými řízký.

Neolitsea aciculata

synonyma: *Litsea aciculata*, *Litsea foliosa*, *Malapoenna aciculata*, *N. acuto-trinervia*, *Tetradenia acutotrinervia*

oblasti: Japonsko, Korea, Tchaj-wan

Roste v Japonsku, Koreji a Tchaj-wanu v podobě stálezeleného nízkého stromu. Kmen dorůstá výšky až 4m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou zašpičatělé nebo ocasovité, kožovité, dlouhé 5 - 12cm, báze je špičatá nebo zašpičatělá, spodní strana bílá, může být ochlupená, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,5cm. Květenstvím je okolík, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku a 4 vejčité nebo eliptické cípy. Plody jsou eliptické až mírně obvejčité, černé, dlouhé 7mm, široké 5 - 6mm na 7 - 9mm stopce.

Neolitsea acuminatissima

synonyma: *Tetradenia acuminatissima*

oblasti: Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě malého stromu. Větve vyrůstají téměř přeslenitě. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, vejčité kopinaté až kopinaté, zašpičatělé až ocasovité, dlouhé 6 - 9cm, široké 1,8 - 2,5cm, báze je tupá nebo klínovitá, žilnatina peřenožilná až téměř 3žilná s 5ti páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenstvím je úžlabní nebo postranní, přisedlý až prakticky přisedlý okolík, samčí jsou 4květé, mají 4 - 5mm stopku a obal se 4mi kulatými cípy. Plody jsou vejčité a mají 1cm stopku.

Neolitsea acuta

synonyma: *Tetradenia acuta*

Neolitsea alongensis

oblasti: Guangxi, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 8m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou střídavé, prakticky přeslenité nebo téměř vstřícné, seskupené na koncích větví, vejčité až

obvejčité, dlouhé 8 - 16cm, široké 4 - 8cm, spodní strana nasivělá, zprvu ochlupená, od báze 3žilná se 4 - 5ti páry žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenství je úžlabní nebo postranní okolík po 3 - 5ti ks, samčí jsou 5tikvěté, přisedlé nebo s krátkou stopkou a obal má 4 vejčité cípy. Plody mají 1cm stopku, jsou eliptické, dlouhé 1,6 - 1,8cm a široké 1,3cm.

Neolitsea amabilis

Neolitsea amboinensis

Neolitsea andamanica

oblasti: JV Asie

Neolitsea angustifolia

Neolitsea apoensis

Neolitsea archboldiana

Neolitsea arfakensis

Neolitsea aurata

synonyma: *Litsea aurata*, *N. sericea* var. *aurata*, *Tetradenia aurata*

oblasti: Fujian, Japonsko, Sichuan, Zhejiang

Roste v Číně a Japonsku v podobě stromu. Dorůstá výšky do 14m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, podlouhlé, eliptické až kopinaté či obkopinaté, zašpičatělé nebo srpovité, dlouhé 8 - 14cm, široké 2,5 - 4cm, báze je klínovitá až zakulacená, spodní strana zprvu ochlupená, od báze 3žilná se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,2cm. Květenstvím je okolík po 3 - 5ti ks u konců větví, mají 2mm stopku a květní obal má 5 eliptických cípů. Plody mají 5 - 7mm stopku, jsou eliptické, dlouhé 8mm a široké 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *aurata*/*N. kwangtungensis*/*N. sericea* var. *aurata*/*Litsea aurata*/*Tetradenia aurata* - větve v mládí ochlupené; listy podlouhlé, eliptické, úzce kopinaté nebo úzce obvejčité, zašpičatělé nebo srpovité, dlouhé 8 - 14cm, široké 2,5 - 4cm, báze klínovitá až zakulacená, spodní strana ochlupená
- var. *chekiangensis*/*N. chekiangensis* - Čína; větve v mládí ochlupené; listy kopinaté nebo obkopinaté, dlouhé 8 - 13cm, široké 0,9 - 2,4cm, spodní strana zprvu řídce ochlupená
- var. *glauca* - Sichuan; větve v mládí ochlupené; listy zpravidla úzce obvejčité, v mládí ochlupené, později zpravidla holé, řapíky řídce ochlupené
- var. *paraciculata*/*N. paraciculata* - Čína; větve v mládí holé; listy oboustranně ochlupené, horní strana olýsává

- var. undulatula - Fujian, Zhejiang; větve v mládí hole; listy zvlněné a v mládí ochlupené

Neolitsea aureosericea

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 40m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou kopinaté, dlouhé 6,5 - 13,5cm, široké 2 - 5cm, spodní strana je zprvu ochlupená, nasivělá, později holá, zpravidla zelená a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 3,1cm. Květenstvím je 4 - 5tikvětý okolík, listeny jsou 1/2kulaté, vlastní květy béžové až světle hnědé, samčí mají 4 korunní lístky délky 2,4 - 3,9mm, šířky 1,3 - 2,6mm, samičí květy mají 4 korunní lístky délky 2,5 - 3mm a šířky 1,4 - 2,2mm. Plody jsou kulaté až eliptické, dlouhé 1,2 - 2cm, široké 1,1 - 1,4cm, lůžko je dlouhé 0,9 - 1,4cm a široké 6 - 8mm.

Neolitsea auricolor

synonyma: Actinodaphne auricolor

Neolitsea australiensis

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 15 (i 40)m při průměru kmene 25 (i 50)cm. Listy jsou eliptické až vejčité, téměř zakulacené, zelené, dlouhé 6 - 13cm a široké 2 - 6cm. Plody jsou dlouhé 2cm, široké 1,4cm a semeno má délku 1cm.

Neolitsea balakrishnanii

Neolitsea bawangensis

Neolitsea bidoupensis

Neolitsea boninensis

synonyma: N. stenophylla, Tetradenia boninensis, Tetradenia stenophylla

Neolitsea brassii

oblasti: Queensland, Severní teritorium

Roste v Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 25m. Listy jsou kopinaté až eliptické, dlouhé 6,5 - 15,5cm, široké 2,5 - 7,1cm, spodní strana je nasivělá nebo zelená, žilky jsou peřenožilné nebo od báze 3žilné a řapíky jsou dlouhé 1 - 3,2cm. Květenstvím je 3 - 5tikvětý okolík, listeny jsou prakticky 1/2kulaté, vlastní květy jsou béžově zelené, aromatické, samčí mají 4 korunní lístky délky 2,3 - 3,4mm, šířky 1,9 - 2,7mm, samičí květy mají 4 korunní lístky délky 2,4 - 2,8mm a šířky 1,3 -

2,1mm. Plody jsou kulaté až eliptické, dlouhé 0,9 - 1,2cm, široké 0,75 - 1,1cm, lůžko je dlouhé 7,5 - 9,5mm a široké 4,5 - 5,5mm.

Neolitsea brevipes

oblasti: Čína, Indie, Nepál

Roste v Číně, Indii a Nepálu v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 10m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé anebo po 3 - 5ti ks na koncích větví, eliptické až úzce kopinaté, ocasovitě zašpičatělé, dlouhé 6 - 12cm, široké 2 - 4cm, spodní strana je nasivělá, v mládí ochlupená, žilky jsou od báze 3žilna se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenství je přisedlý samostatný 5tikvětý okolík anebo ve svazečku, vlastní květy mají 1 - 1,5mm stopku a obal má 4 vejčité cípy. Plody jsou kulaté na 3 - 5mm stopce a o průměru 6mm.

Neolitsea buisanensis

oblasti: Guangxi, Hainan, Tchaj-wan

Roste v Číně a Tchaj-wanu v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 4 - 6m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, vlastní lístky jsou obvejčité, špičaté nebo tupé, dlouhé 3,5 - 6cm, široké 1,5 - 2,5cm, báze je klínovitá, žilnatina od báze 3žilná se 2 - 3mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1cm. Květenstvím je přisedlý úžlabní okolík po 1 - 3ks, samčí jsou 4květé, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku a obal se 4mi eliptickými cípy. Plody jsou kulaté, průměru 4 - 5mm a na 6 - 9mm stopce. Existuje vnitrodruhový taxon:

- f. *sutsuoensis* - Tchaj-wan; listy vejčité a zašpičatělé

Neolitsea cambodiana

oblasti: Fujian, Guangdong, Guangxi, Kambodža, Laos

Roste v Číně, Kambodži a Laosu v podobě stromu. Dorůstá výšky 8 - 12m při průměru kmene 10 - 15cm. Větve jsou v mládí plstnaté až ochlupené. Listy jsou prakticky přeslenité po 3 - 5tiks, úzce kopinaté, obvejčité nebo eliptické, zašpičatělé až prakticky ocasovité, v mládí oboustranně plstnaté, dlouhé 10 - 17cm, široké 3,5 - 6cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenstvím je přisedlý až téměř přisedlý 4 - 5tikvětý okolík a samčí květy mají cípy vejčité. Plody jsou kulaté, průměru 0,8 - 1cm a na 7mm stopce. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *cambodiana*/N. *ferruginea* - Čína, Kambodža a Laos; listy úzce kopinaté až úzce eliptické, prakticky ocasovité nebo náhle zašpičatělé a báze klínovitá

- var. *glabra*/N. *hongkongensis*/Actinodaphne *hongkongensis* - Fujian, Guangdong, Guangxi; větve v mládí žlutě hnědě ochlupené; listy úzce kopinaté, obvejčité nebo eliptické, zašpičatělé nebo špičaté, báze úzká nebo klínovitá

Neolitsea cassia

synonyma: Balanopsis cassia, Camphorina cassia, Cinnamomum cassia, Laurus cassia, Persea cassia

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance. Borka je šedá. Listy jsou kopinaté, dlouhé 6 - 18cm a široké 1,5 - 4cm. Plody jsou tmavě růžově fialové, vejčité a velikosti 1cm.

Neolitsea cassiifolia

synonyma: Litsea cassiifolia, Malapoenna cassiifolia

Neolitsea chrysotricha

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 6m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo po 3 - 5ti ks na koncích větví, elipticky kopinaté nebo obkopinaté, ocasovitě zašpičatělé, dlouhé 7,5 - 13,5cm, široké 2,5 - 4,5cm, báze je špičatá, spodní strana nasivělá, může být ochlupená, od báze 3žilná s 1 párem postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Plodenství je okoličnaté, úžlabní, s 3 - 8mi plody, vlastní plosty jsou vejčité, špičaté, mají 7mm stopku, délku 9mm a šířku 5mm.

Neolitsea chui

oblasti: J Čína

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 8 - 18m při průměru kmene 40cm. Listy jsou střídavé nebo ve svazečcích na koncích větví, úzce eliptické až vejčité eliptické, zašpičatělé, dlouhé 8 - 16cm, široké 2,7 - 9cm, báze špičatá, spodní strana nasivělá, žilnatina od báze 3žilná s 3 - 5ti páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 4cm. Květenstvím je úžlabní nebo postranních okolík v 5 - 6tikvětých svazečcích na max. velmi krátké stopce, vlastní květy mají 4 - 5mm stopku a 4 vejčité až podlouhlé cípy. Plody jsou eliptické až prakticky kulaté na 7mm stopce, dlouhé 1cm a široké 8mm.

Neolitsea cinnamomea

synonyma: Lindera cinnamomea, Litsea cinnamomea, Litsea latifolia

Neolitsea coccinea

Neolitsea confertifolia

synonyma: Actinodaphne confertifolia, Fiwa confertifolia, Litsea confertifolia

oblasti: Čína

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 7m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou prakticky přeslenité, husté, podlouhlé až kopinaté, zašpičatělé, lesklé, dlouhé 5 - 12cm, široké 1,2 -

3,5cm, báze je klínovitá, spodní strana nasivělá, v mládí ochlupená, žilnatina peřenožilná (i prakticky 3žilná), tvoří ji 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 6 - 7mm. Květenstvím je přisedlý 4květý okolík po 3 - 5ti ks, vlastní květy mají 2mm stopku a obal se 4mi široce vejčitými cípy. Plody jsou vejčité nebo eliptické na 4 - 8mm stopce, dlouhé 0,8 - 1,2cm a široké 5 - 6mm.

Neolitsea cuipala

synonyma: *Laurus cuipala*, *Litsea cuipala*, *Litsea lanuginosa*, *Malapoenna cuipala*, *N. lanuginosa*, *Tetradenia lanuginosa*, *Tetranthera cuipala*, *Tetranthera lanuginosa*

oblasti: Bhútán, Čína, Himálaj, Pákistán, Sikkim

Roste v Himálaji v Bhútánu, Indii a Číně v podobě stálezeleného nebo opadavého stromu. Dorůstá výšky 15 (i 20)m při průměru kmene 60cm. Borka je tmavě hnědá. Vrcholové pupeny jsou dlouhé 2 - 5cm. Listy vyrůstají ve svazečcích na koncích větví, jsou podlouhlé až obkopinaté, zašpičatělé, převislé, dlouhé (12 -) 16 - 19 (i 24)cm, široké (3 -) 3,5 - 5 (i 6)cm, báze je protáhlá, spodní strana světlá, na bázi 3žilná a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm. Květenstvím je okolík o průměru 1,5 - 2,5cm, samčí květy mají 3 - 4mm stopku, korunní lístky kopinaté, špičaté, dlouhé 2 - 3mm, samičí mají 4 - 5mm stopku. Plody jsou eliptické, na 4 - 8mm stopce, dlouhé 1,2 - 1,5cm a široké 7 - 8mm.

Neolitsea daibuensis

oblasti: Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě stromu. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, vejčité až vejčité kopinaté, zašpičatělé, dlouhé 4,5 - 6,5cm, široké 1,5 - 2,5cm, báze tupá nebo tupě klínovitá, spodní strana je nasivělá, žilnatina na bázi 3žilná se 2 - 3mi páry postranních žilek a řapíky jsou holé. Květenstvím je úžlabní přisedlý 3 - 5tikvětý okolík, samčí květy mají krátkou trubku a 4 úzce vejčité ochlupené cípy.

Neolitsea dealbata

synonyma: *Bryantea dealbata*, *Litsea baueri*, *Litsea dealbata*, *Litsea dealbata* var. *glabrata*, *Litsea dealbata* var. *incisa*, *Litsea dealbata* var. *rufa*, *Litsea dealbata* var. *typica*, *Litsea rufa*, *Malapoenna dealbata*, *Tetradenia baueri*, *Tetranthera dealbata*

oblasti: Nový Jižní Wales, Queensland

Roste v Austrálii v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky do 15m při průměru kmene 30cm. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou eliptické, obvejčité nebo kopinaté, zelené, dlouhé (7 -) 8 - 22cm, široké (3 -) 3,5 - 8 (i 8,5)cm, spodní strana je nasivělá, ochlupená a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 2,4cm. Květenstvím je 3 - 5tičetný okolík, vlastní květy jsou béžové, žluté až světle hnědé, velikosti 2 - 8cm, samčí květy mají 4 - 5 korunních lístků délky 2,4 - 6mm, šířky 0,9 - 2,5mm, samičí květy mají 4 - 6 korunních lístků délky 1,7 - 2,3mm a šířky 0,4 - 0,9mm. Plodem je kulovitá tmavě červená bobule o délky 0,9 - 1,1cm a šířky 0,85 - 1,1cm na lůžku délky 7 - 9,5mm, šířky 3,5 - 5mm a obsahuje 1 semeno.

Neolitsea elaeocarpa

Neolitsea ellipsoidea

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 30m při průměru kmene do 2m. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, eliptické, špičaté, dlouhé 7 - 10cm, široké 2,3 - 5cm, báze je široce klínovitá, spodní strana nasivělá, žilnatinu tvoří 2 - 3 páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3cm. Květenstvím je úžlabní 2 - 5tkvětý okolík vyrůstající po 1 - 2ks na 1 - 2mm stopce, vlastní květy mají 2 - 4mm stopku a obal se 4mi eliptickými vně ochlupenými cípy. Plody jsou eliptické, tmavě hnědé, dlouhé 1,3 - 1,8cm a široké 1 - 1,3cm.

Neolitsea fischeri

oblasti: J Indie

Roste v Indii.

Neolitsea foliosa

synonyma: *Litsea foliosa*, *Litsea foliosa* var. *puncticulata*, *Tetradenia foliosa*

oblasti: Bhútán, Sikkim

Roste v Bhútánu a Indii. Vrcholové pupeny jsou dlouhé 0,8 - 1,2cm. Listy vyrůstají ve svazečcích, jsou vejčitě eliptické, zpravidla náhle zašpičatělé, dlouhé 7 - 14cm, široké 2 - 6cm a báze je klínovitá. Plody jsou prakticky kulaté, na 0,8 - 1,3cm stopce a o průměru 8 - 9mm.

Neolitsea formosa

Neolitsea fuscata

synonyma: *Litsea fuscata*, *Malapoenna fuscata*

oblasti: Srí Lanka

Roste na Srí Lance.

Neolitsea gamblei

Neolitsea gilva

synonyma: *N. sericea* var. *gilva*, *Tetradenia gilva*

Neolitsea glabra

synonyma: *Tetradenia glabra*

Neolitsea hainanensis

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 10m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou prakticky přeslenité nebo střídavé, eliptické, špičaté, dlouhé 3,7 - 7cm, široké 2 - 3,5cm, báze je široce klínovitá až zakulacená, žilnatina na bázi 3žilná s 2 - 3mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1cm. Květenstvím je úžlabní nebo postranní samostatný 5tikvětý okolík nebo ve svazečcích a květní obal má 4 vejčité cípy. Plody jsou kulovité, průměru 6 - 8mm a na 4 - 5mm stopce.

Neolitsea hiiranensis

oblasti: Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě stromu. Listy jsou seskupené na koncích větví, podlouhlé, tupé, dlouhé 3,5 - 6cm, široké 1,3 - 2,3cm, báze je špičatá až tupá, spodní strana nasivělá, žilnatina od báze 3žilná s 2 - 3mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1cm. Květenstvím je okolík, vlastní květy mají 3mm stopku, trubka je ochlupená se 4mi tupými nebo špičatými cípy délky 2,5 - 3mm. Plody jsou vejčité.

Neolitsea homilantha

oblasti: Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Listy jsou seskupené na koncích větví, prakticky přeslenité anebo řídke, eliptické, prakticky ocasovité, dlouhé 4,5 - 8cm, široké 2 - 3,5cm, báze je klínovitá nebo zakulacená, žilnatina na bázi 3žilná se 4 - 6ti páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 0,7 - 1,6cm. Květenstvím je úžlabní 5tikvětý okolík po 3 - 7mi ks, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku a 4 vejčité cípy. Plody jsou vejčité na 7 - 9mm stopce, dlouhé 9mm a široké 8mm.

Neolitsea hongiaoensis

Neolitsea hongkongensis

synonyma: *Actinodaphne angustifolia*, *Actinodaphne hongkongensis*

oblasti: J Čína

Roste v Hong-Kongu.

Neolitsea howii

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu v podobě stromu nebo keře. Dorůstá výšky do 9m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, mírně přeslenité, obvejčité nebo eliptické, zašpičatělé, lesklé, dlouhé 9,5 - 18cm, široké 2,5 - 7cm, báze je špičatá, spodní strana zprvu ochlupená, žilnatina na bázi 3žilná se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Plodenství je okoličnaté, úžlabní, 7mičetné, vlastní plody mají 4 - 5mm stopku, jsou eliptické nebo prakticky kulaté, dlouhé 1,2cm a široké 9mm.

Neolitsea hsiangkweiensis

oblasti: Guangxi, Hunan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky do 22m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy vyrůstají v 6 - 8mičetných přeslenech na koncích větví, jsou podlouhlé až úzce obvejčité, zašpičatělé až špičaté, lesklé, dlouhé 10 - 12cm, široké 2,5 - 4cm, báze je široce klínovitá, spodní strana zprvu plstnatá, žilnatina od báze 3žilná se 4 - 6ti páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 5mm. Květenstvím je 5tikvětý okolík po 7 - 8mi ks a květní obal má 4 vejčité cípy. Plody jsou kulaté o průměru 1cm a mají 5mm stopku.

Neolitsea impressa

oblasti: Sichuan

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 5m. Listy jsou na koncích větví, střídavé nebo ve svazečkách, vejčité až mírně obvejčité, špičaté až prakticky ocasovité, dlouhé 5 - 9,5cm, široké 2,4 - 4cm, báze je klínovitá nebo zakulacená, spodní strana nasivělá, od báze 3žilná se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 5 - 8mm. Květenstvím je 5tikvětý přisedlý okolík vyrůstající po 2 - 4ks a vlastní květy jsou krátce stopkaté. Plody jsou eliptické až mírně vejčité, dlouhé 1cm, široké 6mm a mají 5 - 6mm stopku.

Neolitsea incana

Neolitsea intermedia

Neolitsea javanica

synonyma: Litsea javanica, Litsea zeylanica, Malapoenna javanica

Neolitsea kedahensis

synonyma: Tetradenia kedahensis

oblasti: Malajsie, Malajský poloostrov

Roste v Malajsi.

Neolitsea konishii

synonyma: Litsea konishii, Tetradenia konishii

oblasti: Japonsko, Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu a v Japonsku v podobě stromu. Kmen má šířku až 80cm. Borka je hnědá a hladká. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, kopinaté nebo podlouhlé, zašpičatělé, dlouhé 10 - 15cm, široké 3 - 4cm, báze je klínovitá, žilnatina od báze 3žilná, tvoří ji 3 páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1cm. Květenstvím je úžlabní nebo postranní 5 - 6tikvětý okolík, samčí květy mají 4mm stopku a 4 vejčité kopinaté cípy. Plody jsou vejčité, černé, dlouhé

1,5cm a široké 1,2cm.

Neolitsea kraduengensis

Neolitsea kwangsiensis

oblasti: Guangdong, Guangxi

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 5m. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, vejčité, zašpičatělé nebo tupé, dlouhé 11 - 19cm, široké 6,8 - 12,5cm, báze je zakulacená až protáhlá, žilnatina na bázi 3žilná, příčné žilky vyniklé a řapíky jsou dlouhé 2,5 - 4mm. Květenstvím je stopkatý okolík vyrůstající po 5 - 8ks, vlastní květy jsou stopkaté a se 4mi vejčitými cípy. Plody jsou kulaté na 6 - 7mm stopce a o průměru 1,5 - 1,6cm.

Neolitsea lanceolata

Neolitsea lancifolia

synonyma: *Daphnidium lancifolium*, *Lindera lancifolia*

Neolitsea latifolia

synonyma: *Litsea latifolia*, *Malapoenna latifolia*

Neolitsea levinei

synonyma: *Benzoin levinei*, *N. chinensis*, *N. lanuginosa* var. *chinensis*, *N. levinei* var. *levinei*

oblasti: Čína

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky do 22m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají ve 4 - 5tičetném přeslenu, jsou úzce kopinaté až úzce obkopinaté, oboustranně špičaté, lesklé, dlouhé 15 - 31cm, široké 4 - 9cm, spodní strana zprvu ochlupená, žilnatina od báze 3žilná se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2cm. Květenstvím je postranní 5tikvětý okolík na 2mm stopce, vlastní květy mají 3mm stopku a obal se 4mi vejčitými cípy. Plody jsou eliptické nebo kulaté, černé, na 0,7 - 1cm stopce, dlouhé 1,2 - 1,8cm a široké 0,8 - 1,5cm.

Neolitsea longifolia

synonyma: *Tetradenia longifolia*

Neolitsea longipedicellata

oblasti: Guangxi

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky až 11m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé až prakticky přeslenité, vejčité až podlouhlé, ocasovité až zašpičatělé, dlouhé 5 - 8,5cm, široké 2,2 - 3,5cm, báze je zakulacená, spodní strana nasivělá, může být drobně ochlupená, žilnatina od báze 3žilná se 2 - 3mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,2cm.

Květenstvím je úžlabní nebo postranní okolík, samčí má 5 květů a obal má 4 vejčité cípy. Plody jsou kulovité, černé, mají 1,5 - 2cm stopku a průměr 8mm.

Neolitsea lunglingensis

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 5m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou seskupené na koncích větví, eliptické, zašpičatělé, dlouhé 4,5 - 9cm, široké 1,7 - 3,5cm, báze je špičatá, spodní strana ochlupená, žilnatina od báze 3žilná se 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2,2cm. Květenství tvoří 1 - 3 úžlabní přisedlé okolíky, samčí 5tikvěté, vlastní květy mají 4mm stopku a obal má 4 široce vejčité cípy. Plody jsou vejčité na 0,8 - 1cm stopce, dlouhé 1cm a široké 8mm.

Neolitsea mannii

synonyma: Litsea mannii, Malapoenna mannii

Neolitsea megacarpa

Neolitsea melchioriana

Neolitsea menglaensis

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky do 10m při průměru kmene do 35cm. Listy jsou střídavé anebo na vrcholcích větví v 3 - 5tičetných přeslenech, eliptické až mírně obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 4,5 - 10,5cm, široké 1,2 - 4,3cm, báze je zakulacená až široce klínovitá, žilnatina od báze 3žilná se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je úžlabní okolík vyrůstající po 1 až několika ks, samičí jsou 5tikvěté, vlastní květy mají 3 - 4mm stopku a obal má 4 vejčité cípy.

Neolitsea microphylla

Neolitsea minor

synonyma: Tetradenia minor

Neolitsea mollissima

synonyma: Tetradenia mollissima

oblasti: Malajsie, Malajský poloostrov

Roste na Malajském poloostrově v podobě malého stromu.

Neolitsea nicobarica

Neolitsea novoguineensis

synonyma: *Litsea teschneri*, *Tetradenia novoguineensis*

oblasti: Nová Guinea

Neolitsea oblongifolia

oblasti: Guangxi, Hainan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 8 - 10 (i 22)m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, občas na koncích větví ve 4 - 6tičetných přeslenech, podlouhlé až úzce kopinaté, tupé, špičaté nebo zašpičatělé, dlouhé 4 - 10cm, široké 0,8 - 2,3cm, báze je špičatá, žilnatinu tvoří 4 - 6 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 3 - 7mm. Květenstvím je úžlabní nebo postranní okolík vyrůstající po 3 - 5ks, vlastní květy mají 5mm stopku a obal se 4mi vejčitými cípy. Plody jsou kulaté, černě hnědé, stopky zpravidla tlusté a průměru 0,8 - 1cm.

Neolitsea obtusifolia

oblasti: Hainan

Roste na Hainanu v podobě stromu. Dorůstá výšky 8 - 20m při průměru kmene do 50cm. Listy jsou střídavé nebo ve svazečcích, úzce kopinaté až úzce obvejčité, tupé, dlouhé 4 - 10cm, široké 2 - 3,5cm, báze je klínovitá, spodní strana nasivělá, žilnatina na bázi 3žilná se 4 - 5ti páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,2cm. Květenstvím je úžlabní nebo postranní 3 - 5tikvětý okolík vyrůstající po 1 - 3ks, vlastní květy mají 3mm stopku a obal má 4 úzce vejčité cípy. Plody jsou kulovité o průměru 0,8 - 1cm na 8 - 9mm stopce.

Neolitsea ovatifolia

synonyma: *N. ovatifolia* var. *ovatifolia*, *N. ovatifolia* var. *puberula*, *N. phanerophlebia* f. *glabra*

oblasti: Guangdong, Guangxi, Hainan, Yunnan

Roste v Číně v podobě keře. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, vejčité, zašpičatělé, dlouhé 4 - 8,5cm, široké 2 - 4cm, báze je zakulacená až klínovitá, žilnatina od báze 3žilná se 4 - 5ti páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm. Květenstvím je 5tikvětý okolík vyrůstající po 1 - 4ks a květ má obal se 4mi eliptickými cípy. Plody jsou kulovité na 5 - 8mm stopce a o průměru 1cm.

Neolitsea pallens

synonyma: *Litsea consimilis*, *Litsea umbrosa* var. *consimilis*, *Malapoenna pallens*, *Tetradenia consimilis*, *Tetradenia pallens*, *Tetranthera pallens*

oblasti: Čína, Nepál, Pákistán, Sikkim, V Himálaj, Z Himálaj

Roste v Číně, Indii, Pákistánu a Nepálu v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 15m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo vyrůstají po 3 - 5ti ks na koncích větví, podlouhlé, eliptické až

mírně kopinaté, zašpičatělé až mírně ocasovité, dlouhé (4 -) 5 - 8 (i 12)cm, široké (1 -) 2 - 3 (i 4)cm, báze klínovitá až zakulacená, od báze 3žilná se 4 - 5 (i 8)mi páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,5cm. Květenstvím je okolík, listeny jsou mírně vejčité, dlouhé 4 - 5mm, samčí květy mají 2 - 2,5mm stopku, korunní lístky podlouhlé, dlouhé 2mm, samičí květy mají korunní lístky podlouhlé a dlouhé 2mm. Plody jsou prakticky kulaté s hrotem, délky 6mm, průměru 8mm na (0,6 -) 0,7 - 1 (i 1,2)cm stopce.

Neolitsea papuana

synonyma: *Tetradenia latifolia*

oblasti: Papua-Nová Guinea

Neolitsea parvigemma

synonyma: *Tetradenia parvigemma*

oblasti: Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě nízkého stromu. Listy jsou střídavé nebo ve svazečcích, úzce vejčité až úzce obvejčité, zašpičatělé, dlouhé 8 - 9cm, široké 3,5 - 4cm, báze je zakulacená (i špičatá), žilnatina od báze 3žilná se 3mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2cm. Květenstvím je úžlabní 5 - 7mikvětý okolík, vlastní květy mají 2mm stopku a obal se 4mi 3úhle podlouhlými cípy.

Neolitsea paucinervia

Neolitsea phanerophlebia

oblasti: Čína

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky do 10m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou řídké až přeslenité, podlouhlé až úzce eliptické nebo úzce kopinaté či vejčité, zašpičatělé, dlouhé 6 - 13cm, široké 2 - 5cm, báze je špičatá nebo tupá, žilnatina na bázi 3žilná se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je úžlabní okolík vyrůstající po 2 - 4 ks, samčí je 5 - 6tikvětý, květy mají 2 - 3mm stopku a obal se 4mi vejčitými cípy. Plody jsou prakticky kulaté, průměru 5 - 9mm, tmavě růžově fialové a na 5 - 7mm stopce.

Neolitsea pingbienensis

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě keře. Dorůstá výšky 1 - 2m. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, eliptické až mírně vejčité, zašpičatělé nebo špičaté, dlouhé 5 - 9cm, široké 2,2 - 4cm, báze je zakulaceně tupá, žilnatina od báze 3žilná se 4 - 5ti páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,2cm. Květenstvím je samostatný nebo párový úžlabní nebo postranní okolík na max. krátké stopce, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku a 5 žlutých eliptických cípů.

Neolitsea pinninervis

oblasti: Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hunan

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky do 12m. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, podlouhlé nebo eliptické, špičaté nebo zahnuté, kožovité, lesklé, dlouhé 6,5 - 13cm, široké 1,6 - 4,2cm, báze je klínovitá, žilnatinu tvoří 7 - 9 párů žilek a řapíky jsou dlouhé do 2cm. Květenstvím je úžlabní okolík vyrůstající po 2 - 3ks, samčí jsou 5tikvěté, mají 1 - 2mm stopku, obal je 4dílný a cípy eliptické. Plody jsou prakticky kulaté, černé, průměru 6mm a mají 1 - 1,2cm stopku.

Neolitsea poilanei

Neolitsea polycarpa

synonyma: *N. chui* var. *brevipes*, *N. chunii* var. *brevipes*

oblasti: Vietnam, Yunnan

Roste v Číně a Vietnamu v podobě stromu. Dorůstá výšky do 20m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé, seskupené na koncích větví, eliptické, zašpičatělé, dlouhé 6 - 11cm, široké 1,7 - 4cm, báze je klínovitá, spodní strana nasivělá, žilnatina od báze 3žilná se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm. Květenstvím je 5tikvětý úžlabní okolík vyrůstající po 5 - 6ti ks, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku a obal má 4 eliptické nebo kulaté cípy. Plody jsou vejčité na 7 - 8mm stopce, dlouhé 0,7 - 1cm a široké 3 - 4mm.

Neolitsea pubescens

synonyma: *Tetradenia pubescens*

Neolitsea pulchella

synonyma: *Litsea pulchella*, *Litsea zeylanica* var. *chinensis*, *Malapoenna pulchella*

oblasti: Fujian, Guangdong, Guangxi

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 6 - 8m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, eliptické, lesklé, dlouhé 4 - 6cm, široké 2 - 3cm, spodní strana nasivělá, žilnatina na bázi 3žilná se 2 - 3mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 6 - 8mm. Květenstvím je úžlabní okolík vyrůstající po 1 - 3ks, samčí jsou 4 - 5tikvěté a obal má 4 eliptické cípy. Plody jsou kulaté, průměru 4 - 6mm a mají 5 - 6mm stopku.

Neolitsea purpurascens

oblasti: Sichuan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 7m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, vejčité nebo eliptické, ocasovité, dlouhé 4,5 - 7,5cm, široké 1,7 - 3cm, báze je zakulacená nebo široce klínovitá, žilnatina od báze 3žilná se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,4cm. Květenstvím je samostatný přisedlý okolík nebo ve svazečku, samčí jsou 5tikvěté a vlastní květy stopkaté. Plody jsou obvejčité, černé, na 6 - 8mm stopce, dlouhé 6 - 7mm a široké 5mm.

Neolitsea purpurescens

synonyma: *N. zeylanica* var. *fangii*

Neolitsea reticulata

Neolitsea sanjappae

Neolitsea sericea

synonyma: *Camphora glauca*, *Cinnamomum glaucum*, *Laurus sericea*, *Litsea glauca* var. *xanthocarpa*, *Litsea sieboldii*, *Malapoenna sieboldii*, *N. cuneifolia*, *N. ohbana*, *N. sericea* f. *angustifolia*, *N. sericea* f. *xanthocarpa*, *N. sericea* var. *angustifolia*, *N. sericea* var. *argentea*, *N. sericea* var. *prematura*, *N. sieboldii*, *N. sieboldii* var. *angustifolia*, *N. sieboldii* var. *prematura*, *N. sieboldii* var. *xanthocarpa*, *Tetradenia cuneifolia*, *Tetradenia glauca* var. *prematura*, *Tetradenia glauca* var. *xanthocarpa*, *Tetradenia ohbana*

oblasti: J Korea, Japonsko, Tchaj-wan

Roste v Číně, Tchaj-wanu, Koreji a Japonsku v podobě stálezeleného stromu. Dorůstá výšky do 10 (i 15)m. Listy jsou podlouhlé až úzce vejčité či eliptické, zašpičatělé, v mládí oboustranně ochlupené, lesklé, kožovité, dlouhé 6 - 20cm, široké 2 - 5cm, žilnatinu tvoří 4 - 5 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 2 - 3cm. Květenstvím je úžlabní nebo postranní přisedlý 5tikvětý okolík, vlastní květy mají 3 - 6mm stopku a obal se 4mi eliptickými cípy. Plody jsou kulaté a průměru 1,3cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *aurata*
- 'Kanoko' - listy béžově skvrnité
- var. *sericea*

Neolitsea shingningensis

oblasti: Guizhou, Hunan

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 5m. Listy jsou střídavé až prakticky přeslenité, vejčité, ocasovité nebo zašpičatělé, dlouhé 5 - 9cm, široké 1,7 - 3cm, báze je zakulacená až široce klínovitá, žilnatina na bázi 3žilná se 2 - 3mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1cm. Květenstvím je postranní párovitý 4květý okolík na 1mm stopce a vlastní květy mají 4 vejčité cípy. Plody jsou eliptické, dlouhé 6 - 7mm a široké 5mm.

Neolitsea siamensis

Neolitsea sutchuanensis

synonyma: *N. sutchuanensis* f. *longipedicellata*, *N. sutchuanensis* var. *gongshanensis*, *N.*

sutchuanensis var. sutchuanensis

oblasti: Guizhou, Sichuan, Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky do 10m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo ve 2 - 4četných svazečcích, eliptické až mírně vejčité, špičaté nebo zašpičatělé, dlouhé 7,5 - 13cm, široké 2,5 - 4,5cm, báze široce klínovitá až mírně zakulacená, spodní strana nasivělá, žilnatina od báze 3žilná se 3 - 5ti páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Plodenství je okoličnaté, 5 - 6tičetné, samostatné nebo párovité, na krátké silné stopce, vlastní plody eliptické, na 0,5 - 1,5cm stopce, dlouhé 0,5 - 1,1cm a široké 4 - 9mm.

Neolitsea teschneriana

Neolitsea tomentosa

oblasti: Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 3 - 5m. Větve jsou v mládí plstnaté. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, podlouhlé až kulatě obkopinaté, ocasovité, lesklé, dlouhé 16,5 - 28cm, široké 5 - 7,5cm, báze je široce klínovitá až zakulacená, žilnatina od báze 3žilná se 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 2cm. Květenstvím je 5tikvětý úžlabní okolík vyrůstající po 4 - 6ti ks, vlastní květy mají 1mm stopku a obal se 4mi vejčitými cípy. Plody jsou vejčité s hrotem, dlouhé 1cm, široké 8mm a stopky dlouhé 5 - 6mm.

Neolitsea triplinervia

synonyma: Litsea triplinervia, Malapoenna triplinervia

Neolitsea umbrosa

synonyma: Laurus canella, Laurus recurvata, Litsea foliosa var. caesia, Litsea foliosa var. impunctata, Litsea furfuracea, Litsea litoralis, Litsea umbrosa, Litsea umbrosa var. impunctata, Litsea umbrosa var. khasiana, Litsea zeylanica var. rubrinervia, Litsea zeylanica var. venosa, N. pallens var. umbrosa, N. umbrosa var. impunctata, Tetradenia furfuracea, Tetradenia umbrosa, Tetranthera furfuracea, Tetranthera pentandra, Tetranthera umbrosa, Tomex laurina

Neolitsea undulatifolia

synonyma: Litsea undulatifolia

oblasti: Guangxi, Guizhou, Yunnan

Roste v Číně v podobě keře nebo stromu. Dorůstá výšky 2 - 7m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou seskupené na koních větví, kopinaté až úzce eliptické, oboustranně zašpičatělé, dlouhé 6 - 10cm, široké 1,4 - 2,5cm, žilnatinu tvoří 13 - 15 párů žilek a řapíky jsou dlouhé 0,6 - 1,2cm. Květenstvím je přisedlý 4 - 5tikvětý okolík vyrůstající po 2 - 3ks, vlastní květy mají 2mm stopku a samčí květy mají 4 - 6 vejčitých cípů. Plody jsou eliptické, dlouhé 1,2cm, široké 8mm a mají 0,8 - 1cm stopku.

Neolitsea variabilissima

synonyma: *N. aciculata* var. *variabilissima*, *Tetradenia variabilissima*, *Tetradenia variabilissima*

oblasti: Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě stromu. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, vejčitě kopinaté, obvejčitě kopinaté nebo úzce obvejčité, zašpičatělé, lesklé, dlouhé 8 - 15cm, široké 3 - 5cm, báze je klínovitá nebo tupá, žilnatina od báze 3žilná se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1cm. Květenstvím je úžlabní nebo postranní 4 - 5tikvětý okolík, vlastní květy mají 2mm stopku a obal má 4 kopinaté cípy. Plody jsou mírně obvejčité, průměru 5mm a mají 1cm stopku.

Neolitsea velutina

oblasti: Guangdong, Guangxi, Yunnan

Roste v Číně v podobě stromu. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy vyrůstají v 2 - 3četných přeslenech na koncích větví, eliptické až široce obvejčité, dlouhé 4,8 - 15cm, široké 1,8 - 5,5cm, žilnatina je od báze 3žilná se 3mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 6mm. Květenstvím je bohatý okolík ve svazečku na krátké stopce, vlastní květy mají 2 - 3mm stopku a obal se 4mi vejčitými cípy.

Neolitsea villosa

synonyma: *Laurus lanosa*, *Litsea kotoensis*, *Litsea villosa*, *Malapoenna villosa*, *N. kotoensis*, *Tetradenia hayatae*, *Tetradenia kotoensis*, *Tetranthera villosa*

oblasti: Tchaj-wan

Roste na Tchaj-wanu v podobě stromu. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, úzce vejčité až podlouhlé, lesklé, dlouhé 8 - 20cm, široké 3 - 5cm, spodní strana je ochlupená, žilnatinu tvoří 3 - 4 páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,2cm. Plody jsou eliptické, dlouhé 1,2cm a mají 7mm stopku.

Neolitsea vuquangensis

Neolitsea wushanica

synonyma: *Litsea wushanica*

oblasti: Čína

Roste v Číně v podobě stromu. Dorůstá výšky 4 - 10m. Větve mohou být v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo ve svazečcích na koncích větví, eliptické až úzce kopinaté, špičaté až zašpičatělé, dlouhé 5 - 9cm, široké 1,7 - 3,5cm, báze je zašpičatělá, spodní strana nasivělá, žilnatina na bázi občas 3žilná s 8 - 12ti páry žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,5cm. Květenstvím je úžlabní nebo postranní přisedlý 5tikvětý okolík, vlastní květy jsou stopkaté a obal 4dílný. Plody jsou kulaté nebo eliptické, temně růžově fialové a o průměru 5 - 7mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *pubens* - větve v mládí ochlupené; listy mají řapíky délky 0,8 - 1cm; plody eliptické, dlouhé 8 -

9mm a široké 5 - 6mm

- var. wushanica/N. gracilipes/Litsea gracilipes/Litsea wushanica - větve holé; listy s řapíky délky 1 - 1,5cm; plody kulaté o průměru 6 - 7mm

Neolitsea zeylanica

synonyma: Laurus camphora, Laurus involucrata, Laurus nitida, Laurus verticillata, Litsea ceylanica, Litsea pseudoculitlawan, Litsea zeylanica, Malapoenna involucrata, Malapoenna pseudoculitlawan, N. foliolosa, N. involucrata, Tetradenia pseudoculitlawan, Tetradenia zeylanica, Tetranthera foliosa

oblasti: Austrálie, Guangxi, JV Asie

Roste v Číně, jihovýchodní Asii a Austrálii v podobě stromu. Dorůstá výšky do 20m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, úzce vejčité až podlouhlé, zašpičatělé, dlouhé 7 - 11cm, široké 2,5 - 4cm, spodní strana je nasivělá, báze klínovitá, žilnatina na bázi 3žilná se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 1 - 1,5cm. Květenstvím je úžlabní prakticky přisedlý 4 - 5tikvětý okolík, vlastní květy mají 2mm stopku a samčí obal se 4mi cípy.

Další informace:

<http://databaze.dendrologie.cz/domains/databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=2157>

<https://www.rostliny.net/>