

Neolitsea aurata

synonyma: *Litsea aurata*, *Neolitsea sericea* var. *aurata*, *Tetradenia aurata*

čeleď: Lauraceae

oblasti: Fujian, Japonsko, Sichuan, Zhejiang

Roste v Číně a Japonsku v podobě stromu. Dorůstá výšky do 14m. Větve jsou v mládí ochlupené. Listy jsou střídavé nebo seskupené na koncích větví, podlouhlé, eliptické až kopinaté či obkopinaté, zašpičatělé nebo srpovité, dlouhé 8 - 14cm, široké 2,5 - 4cm, báze je klínovitá až zakulacená, spodní strana zprvu ochlupená, od báze 3žilná se 3 - 4mi páry postranních žilek a řapíky jsou dlouhé 0,8 - 1,2cm. Květenstvím je okolík po 3 - 5ti ks u konců větví, mají 2mm stopku a květní obal má 5 eliptických cípů. Plody mají 5 - 7mm stopku, jsou eliptické, dlouhé 8mm a široké 6mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *aurata*/N. *kwangtungensis*/N. *sericea* var. *aurata*/*Litsea aurata*/*Tradenia aurata* - větve v mládí ochlupené; listy podlouhlé, eliptické, úzce kopinaté nebo úzce obvejčité, zašpičatělé nebo srpovité, dlouhé 8 - 14cm, široké 2,5 - 4cm, báze klínovitá až zakulacená, spodní strana ochlupená
- var. *chekiangensis*/N. *chekiangensis* - Čína; větve v mládí ochlupené; listy kopinaté nebo obkopinaté, dlouhé 8 - 13cm, široké 0,9 - 2,4cm, spodní strana zprvu řídce ochlupená
- var. *glauca* - Sichuan; větve v mládí ochlupené; listy zpravidla úzce obvejčité, v mládí ochlupené, později zpravidla holé, řapíky řídce ochlupené
- var. *paraciculata*/N. *paraciculata* - Čína; větve v mládí holé; listy oboustranně ochlupené, horní strana olysává
- var. *undulata* - Fujian, Zhejiang; větve v mládí hole; listy zvlněné a v mládí ochlupené

<https://www.rostliny.net/>