

## Neolitsea cuipala

synonyma: *Laurus cuipala*, *Litsea cuipala*, *Litsea lanuginosa*, *Malapoenna cuipala*, *Neolitsea lanuginosa*, *Tetradenia lanuginosa*, *Tetranthera cuipala*, *Tetranthera lanuginosa*

čeleď: Lauraceae

oblasti: Bhútán, Čína, Himálaj, Pákistán, Sikkim

Roste v Himálaji v Bhútánu, Indii a Číně v podobě stálezeleného nebo opadavého stromu. Dorůstá výšky 15 (i 20)m při průměru kmene 60cm. Borka je tmavě hnědá. Vrcholové pupeny jsou dlouhé 2 - 5cm. Listy vyrůstají ve svazečcích na koncích větví, jsou podlouhlé až obkopinaté, zašpičatělé, převislé, dlouhé (12 -) 16 - 19 (i 24)cm, široké (3 -) 3,5 - 5 (i 6)cm, báze je protáhlá, spodní strana světlá, na bázi 3žilné a řapíky jsou dlouhé 1,5 - 2,5cm. Květenstvím je okolík o průměru 1,5 - 2,5cm, samčí květy mají 3 - 4mm stopku, korunní lístky kopinaté, špičaté, dlouhé 2 - 3mm, samičí mají 4 - 5mm stopku. Plody jsou eliptické, na 4 - 8mm stopce, dlouhé 1,2 - 1,5cm a široké 7 - 8mm.

<https://www.rostliny.net/>