Abutilon bidentatum

synonyma: A. var. major, Abutilon indicum var. major, Abutilon microcarpum

čeleď: Malvaceae
oblasti: Arabský poloostrov, Burundi, Demokratická Republika Kongo (Zair), Džíbútí, Eritrea, Etiopie , Írán, Keňa, Pákistán, Rwanda, Somálsko, Súdán, Tanzánie, Uganda

Roste ve východní Africe v podobě rozkladité keřovité byliny. Dorůstá výšky až 1m nebo i více. Povrch je ochlupený. Listy jsou vejčité, zašpičatělé, jemně pilovité, dlouhé 2 - 15,5 (i 17)cm, široké 1,5 - 12 (i 13)cm, báze je srdčitá, žilnatinu tvoří 7 - 9 žilek a řapík je dlouhý jako čepel. Kvete v paždí listů, květy jsou samostatné, mají (1,5 -) 2 - 4cm stopky (za plodu až 8cm), kalich je 5tilaločný, dlouhý 0,5 - 0,7 (i 1)cm, koruna má v průměru 1,5cm, korunní lístky jsou bledě žluté až žluté, dlouhé 0,7 - 0,9 (i 1,3)cm a široké 4 - 5mm. Plodenství je (12 -) 13 - 16 (i 17)tičetné, vlastní plody jsou dlouhé 0,8 - 1cm, v průměru mají 3 - 5mm a obsahují 2 - 3 hnědá semena délky 1,5 - 2,5mm.

https://www.rostliny.net/