

Anguloa

čeleď: Orchidaceae

Rodové jméno bylo vybráno na počest španělského botanika 18.s tl. dona Francisca de Angulo. Roste ve Venezuele, Kolumbii, Ekvádoru a Peru v mlžných horských lesích. Jedná se především o terestrické druhy, epifytní jsou v menšině. Pacibulky jsou delší než 20cm. Opadavé listy mají kopinatý tvar a ve volné přírodě mohou dosáhnout délky i 1m. Květy má pouze polootevřené, tulipánovité, krátce stopkaté, žluté nebo béžové, korunní lístky jsou tlusté, všechny ohnuté stejným směrem, vrchní je přilbovitý.

Množí se dělením trsů.

Anguloa brevilabris

Anguloa cliftonii

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. alba
- var. concolor

Anguloa clowesii

synonyma: A. clowesii var. aurea

oblasti: Kolumbie, Venezuela

Roste ve Venezuele a Kolumbii. Pahlízy jsou delší. Listy jsou světlezelené, dlouhé 60cm a široké 15cm nebo i více. Kvete světležlutými vzpřímenými květy o šířce 8cm na 20cm stopce se zelenými překrývajícími se listy. Vydává kořeněné aroma. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. flava

Anguloa dubia

Anguloa eburnea

Anguloa hohenlohii

Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. hohenlohii

Anguloa tognettiae

Anguloa uniflora

synonyma: *A. uniflora* var. *treyeranii*

oblasti: Andy, Kolumbie, Peru

Patří mezi epifyty. Z pahlíz vyrůstají 2 - 4 měkké listy. Kvete bílými nazelenalými nebo nafialovělými květy s nepatrným fialovým tečkováním a žlutou skvrnou uprostřed. Květ je pouze polootevřený.

Na zimu potřebuje chladnější místo a zastavit hnojení.

Anguloa virginalis

oblasti: Ekvádor

Roste v Ekvádoru. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *turneri*

Anguloa x acostae

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Anguloa x rolfei

oblasti: Kolumbie

Pochází z Kolumbie.

Anguloa x ruckeri

oblasti: Kolumbie, Venezuela

Pochází z Kolumbie a Venezuely. *A. clowesii* x *A. hohenlohii*.

Anguloa x speciosa

oblasti: Venezuela

Roste ve Venezuele a pravděpodobně i v Kolumbii.

<https://www.rostliny.net/>