

Orthrosanthus chimboracensis

synonyma: *Moraea chimboracensis*, *Moraea gladioloides*, *O. var. chimboracensis*, *O. var. gladioloides*, *O. var. typicus*, *Orthrosanthus moritzianus*, *Sisyrinchium moritzianum*, *Solenomelus chimboracensis*, *Solenomelus gladioloides*

čeleď: Iridaceae

oblasti: Bolívie, Chiapas, Ekvádor, Kolumbie, Kostarika, Panama, Peru, SZ Brazílie, Venezuela

Roste v Mexiku, Kostarice, Panamě, Kolumbii, Venezuele, Ekvádoru, Peru, Bolívii a Brazílii jako trvalka v trsech. Dorůstá výšky 0,2 - 0,6 (i 1,1)m. Stonek je přímý a na bázi olistěný. Listy jsou 2řadé, mečovité, dlouhé 15 - 70cm a široké 0,3 - 1cm. Květenství je latovité, tvořené ze 2 - 3květých vějířků vyrůstajících z paždí listenů s délkou 1,3 - 2cm, vlastní květy jsou 6tičetné, modré a korunní lístky jsou dlouhé 1 - 1,3cm. Plodem je 3pouzdrá úzce eliptická tobolka na stopce a s délkou 1,5 - 2,5cm.

Vyhovují mu keře v oblasti párama.

<https://www.rostliny.net/>