

Rohdea (Rodea)

synonyma: Campylandra, Gonioscypha, Tilcusta, Titragyne

čeleď: Asparagaceae

Roste v Číně, Japonsku, Himálaji a Indočíně.

Rohdea annulata

synonyma: Campylandra annulata, Tupistra annulata

Rohdea chlorantha

synonyma: Tupistra chlorantha

oblasti: Sichuan

Roste v Číně.

Rohdea delavayi

synonyma: Campylandra delavayi, Campylandra fimbriata, R. fimbriata, R. lihengiana, Tupistra delavayi, Tupistra fimbriata, Tupistra fimbriata var. breviloba

oblasti: Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Číně.

Rohdea dracaenoides

Rohdea emeiensis

synonyma: Campylandra emeiensis, Tupistra emeiensis

oblasti: Sichuan

Roste v Číně.

Rohdea ensifolia

synonyma: Campylandra ensifolia, Tupistra ensifolia

oblasti: Yunnan

Roste v Číně.

Rohdea eucomoides

synonyma: Gonioscypha eucomoides

oblasti: Ásám, Bhútán, Myanmar (Barma)

Roste v Indii, Bhútánu a Myanmaru.

Rohdea fargesii

synonyma: Campylandra chinensis, Campylandra fargesiana, Campylandra fargesii, Campylandra kwangtungensis, Campylandra viridiflora, Campylandra watanabei, Campylandra yunnanensis, R. chinensis, R. chinensis var. chinensis, R. japonica var. watanabei, R. watanabei, R. yunnanensis, Tupistra chinensis, Tupistra fargesii, Tupistra heensis, Tupistra kwangtungiensis, Tupistra lorifolia, Tupistra sparsiflora, Tupistra viridiflora, Tupistra watanabei, Tupistra yunnanensis

oblasti: Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Tchaj-wan, Yunnan

Roste v Číně a Tchaj-wanu.

Rohdea japonica (Debříčka japonská)

synonyma: Orontium japonicum, Orontium liliifolium, R. esquirolii, R. sinensis

oblasti: Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Japonsko, Jiangsu, Jiangxi, Korea, Shandong, Sichuan, Zhejiang

Roste v Japonsku, Koreji a Číně v podobě stálezelené byliny. Pod zemí vytváří krátký silný oddenek. Listy vyrůstají v 3 - 12tičetné růžici, jsou široce kopinaté, špičaté, dlouhé 15 - 50cm a široké 2,5 - 7cm. Květenstvím je hustý klas délky 3 - 4cm, vlastní květy jsou světle žluté, dlouhé 4 - 5mm, korunní lístky srostlé a vytváří 6 laloků. Plodem je červená bobule o průměru 8mm obsahující 1 semeno. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Aureo-striata' - listy žlutě pruhované
 - 'Chirimen Boshi'
 - 'Marginata' - okraje listů žluté
- <div>Vyhovují ji vlhké lesy. Zimuje za teploty kolem 5°C.</div>

Rohdea jinshanensis

synonyma: Campylandra jinshanensis, Tupistra jinshanensis

oblasti: Sichuan

Roste v Číně.

Rohdea lichuanensis

synonyma: Campylandra lichuanensis, Tupistra lichuanensis

oblasti: Hubei

Roste v Číně.

Rohdea longipedunculata

synonyma: *Campylandra longipedunculata*, *Tupistra longipedunculata*

oblasti: Yunnan

Roste v Číně.

Rohdea nepalensis

synonyma: *Campylandra aurantiaca*, *Campylandra liangshanensis*, *R. aurantiaca*, *R. liangshanensis*, *Tilcusta nepalensis*, *Tupistra aurantiaca*, *Tupistra liangshanensis*

oblasti: Ásám, Bhútán, Myanmar (Barma), Nepál, Sichuan, Xizang (Tibet), Yunnan

Roste v Tibetu, Nepálu, Bhútánu, Indii, Myanmaru a Číně.

Rohdea pachynema

synonyma: *Campylandra pachynema*

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně.

Rohdea siamensis

synonyma: *Campylandra siamensis*

oblasti: Laos, Thajsko

Roste v Laosu a Thajsku.

Rohdea tonkinensis

synonyma: *Campylandra longibracteata*, *Campylandra tonkinensis*, *Tupistra tonkinensis*

oblasti: Guangdong, Vietnam, Yunnan

Roste ve Vietnamu a Číně.

Rohdea urotepala

synonyma: *Campylandra tui*, *Campylandra urotepala*, *R. tui*, *Tupistra tui*, *Tupistra urotepala*

oblasti: Sichuan, Yunnan

Roste v Číně.

Rohdea verruculosa

synonyma: *Campylandra verruculosa*, *Tupistra verruculosa*

oblasti: Guizhou, Yunnan

Roste v Číně.

Rohdea wattii

synonyma: Campylandra cauliflora, Campylandra wattii, Tupistra wattii

oblasti: Ásám, Bhútán, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Sichuan, Vietnam, Yunnan

Roste v Číně.

<https://www.rostliny.net/>