

# Drimiopsis

čeleď: Hyacinthaceae

Rodové jméno bylo odvozené z názvu blízkého rodu *Drimia*, znamená tedy drimii podobný. Pochází z jižní a tropické Afriky. Patří mezi trvalky. Pod vytváří cibule o průměru 5cm, z části vyčnívají nad povrch anebo jsou v půdě pouze mělce uloženy. Vyrůstá z nich 1 - 5 kopinatých až široce kopinatých listů, okraj může být drobně zubatý, barva bývá tmavězelená, zpravidla se světlou nebo růžovofialovou kresbou. Květenství je hroznovité, vlastní květy jsou drobné krátce trubkovité, bílé, zelené (i růžové nebo růžovofialové). Plodem je kulovitá tobolka.

Potřebuje teplo, plné slunce nebo slabý polostín a dobře propustný substrát bohatý na živiny. Může být pěstována celoročně bez zatahování do cibule. Dobře snáší sucho, ale zálivka by měla být pravidelná.

Množí se dceřinými cibulkami.

## Drimiopsis barteri

### Drimiopsis botryoides

oblasti: Etiopie, Tanzánie, Zanzibar

Roste v Etiopii, Tanzánii a Zanzibaru. Dorůstá výšky 20 - 50cm. Cibule mají průměru až 5cm. Vytváří 2 kopinaté šedozelené listy s tmavězelenou kresbou. Květenstvím je hrozen a vlastní květy jsou bílé.

### Drimiopsis kirkii

oblasti: Zanzibar

Pochází ze Zanzibaru.

### Drimiopsis maculata

synonyma: *Drimia maculata*, *Ledebouria petiolata*

oblasti: KwaZulu-Natal, Tanzánie, Východní Kapsko

Roste od JAR po Tanzánii. Patří mezi cibuloviny. Dorůstá výšky 20 - 40cm. Listy vyrůstají v počtu 2 - 4ks, jsou široce kopinaté, špičaté, 1/2vzprámené, zelené s růžovofialovou kresbou a dlouze řapíkaté. Stonek je růžovofialový, zakončený krátkým hroznem nazelenalých drobných kvítků.

Vyhovují mu zejména vlhké lesy.

Další informace:

[http://www.zelenelisty.cz/clanky/werbar---cibuloviny/drimiopsis-sp\\_\\_-strydfontein\\_-rsa.html](http://www.zelenelisty.cz/clanky/werbar---cibuloviny/drimiopsis-sp__-strydfontein_-rsa.html)

<https://www.rostliny.net/>