

Cuscuta europaea (Kokotice evropská)

synonyma: *Cuscuta brachystyla*, *Cuscuta capillaris*, *Cuscuta epicnidea*, *Cuscuta epitriphyllum*, *C. subsp. halophyta*, *C. var. indica*, *Cuscuta filiformis*, *Cuscuta halophyta*, *Cuscuta ligustri*, *Cuscuta major*, *Cuscuta schkuhriana*, *Cuscuta tetrandra*, *Cuscuta tubulosa*, *Cuscuta urceolata*, *Cuscuta viciae*, *Cuscuta vulgaris*

čeleď: Convolvulaceae

oblasti: Andalusie, Česká republika, Írán, Itálie, Katalánsko, Maine, Německo, Pákistán, Polsko, Švýcarsko

Pochází z Evropy a Asie, ale lze je v dnešní době nalézt i v Japonsku, Kašmíru, severní a západní Africe i Americe. Patří mezi jednoletky a parazitické rostliny (vyhovuje ji zejména kopřiva, byliny a keře). Tenké ovíjivé lodyhy mají nažloutlou nebo načervenalou barvu, vyrůstají z hostitelské rostliny a vytvářejí propletenou zmeť. Délka dosahuje 1 - 1,5m. Listy jsou střídavé, podlouhlé až 3úhlé, dlouhé 1 - 2mm a široké 0,3 - 2mm. Květenství je 8 - 22květé, listeny 3úhlé, vlastní květy jsou drobné, růžové nebo bílé, délky (0,7 -) 1 - 1,5cm na 0,5 - 2mm stopce, kalich má (4 -) 5 (i 6) laloků, zpravidla nestejných, vejčitých, úzce eliptických nebo lžičkovitých, tuhých, dlouhých 1,5 - 3mm, širokých 0,5 - 2mm, koruna je zvonkovitá, (4 -) 5 (i 6)tičetná, korunní lístky jsou hnědé a podlouhlé. Plodem je vejčitá tobolka se (3 -) 4mi hnědými semeny délky 1,1 - 1,3mm.

Vyhovují ji pobřežní křoviny, vlhké okraje lesů, atp. Nemá ráda vápno.

Množí se semeny (vytváří 2 druhy, první klíčí snadno, druhé obtížně).

<https://www.rostliny.net/>