

Cuscuta gronovii (Kokotice Gronovova)

synonyma: *Cuscuta bonariensis*, *Cuscuta domingensis*, *Cuscuta vulgivaga*, *Cuscuta vulgivaga* var. *glomerata*, *Cuscuta vulgivaga* var. *laxiflora*, *Cuscuta vulgivaga* var. *tetramera*, *Epithymum gronovii*, *Grammica gronovii*

čeleď: Convolvulaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Německo, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází ze Severní Ameriky. Lodyha bývá naoranžovělá. Kvete žlutými květy ve zdánlivém hroznu, vlastní květy mají delší korunu než-li kalich. Plodem je kulovitá až dlouze vejčitá tobolka.

<https://www.rostliny.net/>