

Carduus acanthoides (Bodlák obecný)

synonyma: *Carduus axillaris*, *Carduus camporum*, *Carduus fortior*, *Carduus microcephalus*, *Carduus murfatlari*, *Carduus polyacanthos*, *Carduus polyanthemos*, *Carduus ruderalis*, *Carduus velebiticus*

čeleď: Asteraceae

oblasti: Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Idaho, Illinois, Iowa, Itálie, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kazachstán, Kentucky, Kolorado, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Německo, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Nové Skotsko, Nový Brunšvik, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Polsko, Quebec, Rhode Island, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Texas, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Pochází z Evropy a Asie, zavlečený byl do Severní Ameriky. Patří mezi dvouletky. V prvním roce vytváří pouze přízemní růžici. Dorůstá výšky 0,3 - 1,5 (i 2)m. Stonek je tuhý, ostnitý (4 - 7mm dlouhé osténky), mírně točitý, může být i ochlupený a v horní polovině je větvený. Střídavé přisedlé listy jsou také ostnité (ostny dlouhé i přes 5mm), tvarově velmi podobné stonku, peřenolaločnatého až peřenosečného tvaru a max. jen řídce ochlupené. Vytvářejí i přízemní růžici, kde dosahují délky až 40cm a šířky 10cm. Na stonku jsou pak menší, dlouhé 6 - 12cm a široké 2 - 4,5cm. Kvete červenými až růžovočervenofialovými květy v kulovitém úboru s vejčitým (2 -) 2,5 - 3,5cm dlouhým zelenavým zákrovem, na každé větvi 1ks, zákrovní listeny hrodité a krátce osténkaté. Plodem je nažka s 1cm chmýrem.

Vyhovují mu pole, rumiště, okraje cest, atp. Půda by měla být lehčí, mírně vlhká a bohatá na dusík.

Množí se semeny.

<https://www.rostliny.net/>