

Ophrys fusca (Tořič hnědý)

synonyma: *Arachnites fusca*, *Arachnites fuscus*, *Ophrys africana*, *Ophrys akhdarensis*, *Ophrys arnoldii*, *Ophrys attaviria*, *Ophrys attaviria* f. *eptapigiensis*, *Ophrys attaviria* f. *thracica*, *Ophrys attaviria* subsp. *cesmeensis*, *Ophrys attaviria* var. *cesmeensis*, *Ophrys bilunulata*, *Ophrys caesiella*, *Ophrys calocaerina*, *Ophrys cesmeensis*, *Ophrys clara*, *Ophrys creberrima*, *Ophrys cressa*, *Ophrys cretica*, *Ophrys decembris*, *Ophrys delforgei*, *Ophrys dianica*, *Ophrys eptapigiensis*, *Ophrys fabrella*, *Ophrys ficuzzana*, *Ophrys flammeola*, *Ophrys forestieri*, *Ophrys funerea*, *O. f. forestieri*, *O. f. minor*, *O. subsp. akhdarensis*, *O. subsp. arnoldii*, *O. subsp. attaviria*, *O. subsp. bilunulata*, *O. subsp. caesiella*, *O. subsp. calocaerina*, *O. subsp. cesmeensis*, *O. subsp. clara*, *O. subsp. creberrima*, *O. subsp. cressa*, *O. subsp. cretica*, *O. subsp. delforgei*, *O. subsp. eptapigiensis*, *O. subsp. fabrella*, *O. subsp. flammeola*, *O. subsp. forestieri*, *O. subsp. funerea*, *O. subsp. gazella*, *O. subsp. hespera*, *O. subsp. laureotica*, *O. subsp. leucadica*, *O. subsp. limensis*, *O. subsp. lindia*, *O. subsp. lucana*, *O. subsp. lucentina*, *O. subsp. lucifera*, *O. subsp. lupercalis*, *O. subsp. marmorata*, *O. subsp. minima*, *O. subsp. obaesa*, *O. subsp. ortuabis*, *O. subsp. parosica*, *O. subsp. parvula*, *O. subsp. peraiolae*, *O. subsp. perpusilla*, *O. subsp. persephoniae*, *O. subsp. phaseliana*, *O. subsp. sabulosa*, *O. subsp. sancti-isidorii*, *O. subsp. thracica*, *O. subsp. thriptiensis*, *O. subsp. zonata*, *O. var. distincta*, *O. var. forestieri*, *O. var. lutea*, *O. var. lutescens*, *O. var. maculata*, *O. var. rubescens*, *O. var. subfusca*, *Ophrys gackiae*, *Ophrys gazella*, *Ophrys hespera*, *Ophrys intermedia*, *Ophrys iricolor* subsp. *lojaconoi*, *Ophrys iricolor* subsp. *mesaritica*, *Ophrys laetea*, *Ophrys laurensis*, *Ophrys leucadica*, *Ophrys lindia*, *Ophrys lindleyana*, *Ophrys lojaconoi*, *Ophrys lucana*, *Ophrys lucentina*, *Ophrys lucifera*, *Ophrys lupercalis*, *Ophrys lutea*, *Ophrys lutea* subsp. *laurensis*, *Ophrys lutea* subsp. *subfusca*, *Ophrys lutea* var. *subfusca*, *Ophrys malacitana*, *Ophrys marmorata*, *Ophrys meropes*, *Ophrys mesaritica*, *Ophrys myodes*, *Ophrys obaesa*, *Ophrys ortuabis*, *Ophrys parosica*, *Ophrys parosica* var. *phaseliana*, *Ophrys parvula*, *Ophrys pelinaea*, *Ophrys peraiolae*, *Ophrys peraiolae* var. *rubra*, *Ophrys perpusilla*, *Ophrys persephoniae*, *Ophrys phaseliana*, *Ophrys polycratis*, *Ophrys punctulata*, *Ophrys rueckbrodtiana*, *Ophrys sabulosa*, *Ophrys sphegodes* subsp. *moesziana*, *Ophrys subfusca*, *Ophrys subfusca* subsp. *flammeola*, *Ophrys subfusca* subsp. *laurensis*, *Ophrys subfusca* subsp. *lucentina*, *Ophrys subfusca* subsp. *persephoniae*, *Ophrys sulcata*, *Ophrys theophrasti*, *Ophrys thracica*, *Ophrys thriptiensis*, *Ophrys tricolor*, *Ophrys zonata*, *Orchis lutea* var. *subfusca*, *Orchis subfusca*

čeleď: Orchidaceae

oblasti: Andalusie, Egejské ostrovy, Francie, Itálie, Katalánsko, Malá Asie (Anatolie), Řecko, Sýrie

Pochází ze středozeší a západní Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 49)cm. Kvete po 2 - 9ti květy, vnější okvěti je nazelenalé, vnitřní hnědozelené, pysk je široce vejčitý, 3laločný, střední lalok vykrojený, tmavěhnědý, červenohnědý až hnědofialový, na okraji občas s úzce žlutý, na bázi zpravidla se 2mi namodralými skvrnami. Plodem je tobolka. Je zapsán na seznamu CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *bilunulata*
- subsp. *blitopertha* - Egejské ostrovy, jihozápadní Turecko
- subsp. *cinereophila* - jižní Řecko až severní Sýrie
- subsp. *funerea*
- subsp. *fusca* - středozeší
- subsp. *iricolor*
- subsp. *minima* - Francie
- subsp. *megaifera*
- subsp. *vasconica* - jihozápadní Evropa

Vyhovují mu pastviny a okraje lesů.

<https://www.rostliny.net/>