

Ophrys insectifera (Tořič hmyzonosný)

synonyma: Arachnites musciflora, Arachnites musciflorus, Epipactis myodes, Malaxis myodes, Ophrys ambusta, O. f. apiculata, O. f. bombifera, O. f. dubia, O. f. longibracteata, O. f. luteomarginata, O. f. parviflora, O. f. rotundata, O. f. subbombifera, O. subsp. subinsectifera, O. var. luteomarginata, O. var. myodes, Ophrys muscaria, Ophrys muscifera, Ophrys muscifera f. apiculata, Ophrys muscifera f. bombifera, Ophrys muscifera f. dubia, Ophrys muscifera f. longibracteata, Ophrys muscifera f. ochroleuca, Ophrys muscifera f. parviflora, Ophrys muscifera f. rotundata, Ophrys muscifera f. subbombifera, Ophrys muscifera f. virescens, Ophrys muscifera f. viridiflora, Ophrys myodes, Ophrys subinsectifera, Orchis insectifera, Orchis muscaria, Orchis muscifera, Orchis musciflora, Orchis myodes

čeleď: Orchidaceae

oblasti: Česká republika, Itálie, Katalánsko, Německo, Polsko

Pochází z Evropy. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (10 -) 12 - 30 (i 45)cm. Kopinaté listy vytvářejí přízemní růžici. Mají délku až 10cm. Kvete žlutozelenými květy s tmavým hnědým pyskem bez ostruhy v chudokvětém hroznu, vnější korunní lístky jsou zelené nebo žlutozelené, vnitřní tmavě hnědorůžovofialové, široké 0,3 - 0,5mm, pysk je plochý, krátce sametově ochlupený, tmavě růžovofialový, na bázi s holou bleděmodrou čtvercovou skvrnou a 2mi do stran odstávajícími bočními laloky, prostřední lalok je větší, na konci 2klaný, dlouhý 5 - 7mm a široký 3 - 8mm. Celý jeho vzhled napodobuje mouchu. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. aymoninii
- subsp. insectifera
- f. luteomarginata - Anglie

Vyhovuje mu zásaditá půda, sušší louky, světlé lesy, kamenité stráně a teplo.

Fotografie převzata z http://www.vkolacek.cz/ .

<https://www.rostliny.net/>