

Ophrys lutea (Tořič žlutý)

synonyma: *Arachnites lutea*, *Arachnites luteus*, *Ophrys aranifera* subsp. *pseudospeculum*, *Ophrys aranifera* var. *pseudospeculum*, *Ophrys corsica*, *Ophrys glabra*, *Ophrys insectifera* var. *glaberrima*, *Ophrys insectifera* var. *lutea*, *O.* subsp. *corsica*, *O.* subsp. *phryganae*, *O.* subsp. *pseudospeculum*, *O.* var. *grandiflora*, *O.* var. *speculissima*, *Ophrys phryganae*, *Ophrys pseudospeculum*, *Ophrys speculum*, *Ophrys sphegodes* subsp. *pseudospeculum*, *Ophrys vespifera*

čeleď: Orchidaceae

oblasti: Albánie, Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Kypr, Libye, Makedonie, Maroko, Portugalsko, Řecko, Sardínie, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Tunisko, Turecko

Pochází ze středozeší jako trvalka. Dorůstá výšky 10 - 30 (i 40)cm. Eliptické listy vytvářejí přízemní růžici. Kvete žlutými květy po 3 - 6ti ks, vnější korunní lístky jsou zelené, vnitřní kratší, nažloutlé, pysk je víceméně kulatý, 3laločný, centrální lalok je vykrojený, střed hnědočervený se 2ma eliptickými modrými skvrnami a na okraji je žlutý. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *archimedeae* - Itálie
- subsp. *battandieri*
- subsp. *galilaea*
- subsp. *laurensis*
- subsp. *lutea* (Tořič žlutý pravý) - západní a střední středozeší
- subsp. *numida*
- subsp. *pseudospeculum*

Vyhovuje mu plné slunce nebo i stín a suchá i vlhká půda.

<https://www.rostliny.net/>