

Bromus japonicus (Sveřep japonský)

synonyma: Bromus abolinii, Bromus anatolicus, Bromus arvensis var. japonicus, Bromus barobalianus, Bromus cyrii, Bromus erectus var. aequifolius, Bromus gedrosianus, Bromus hirtus, B. f. bosnensis, B. f. luxurians, B. f. tenuis, B. f. variegatus, B. f. zomboriensis, B. subsp. phrygius, B. subsp. sooi, B. subsp. subsquarrosus, B. var. aegyptiacus, B. var. breviramosus, B. var. chiapporianus, B. var. glabriglumis, B. var. grandis, B. var. grossus, B. var. incanus, B. var. laxus, B. var. multiflorus, B. var. pendulus, B. var. phrygius, B. var. porrectus, B. var. rapaicsii, B. var. sooi, B. var. tenuis, B. var. transsylvanicus, B. var. umbrosus, B. var. variegatus, B. var. velutinus, B. var. zomboriensis, Bromus patulus, Bromus patulus var. grandis, Bromus patulus var. grossus, Bromus patulus var. luxurians, Bromus patulus var. micostachya, Bromus patulus var. microstachyus, Bromus patulus var. polymorphus, Bromus patulus var. subsquarrosus, Bromus patulus var. transsylvanica, Bromus patulus var. variegatus, Bromus patulus var. velutinus, Bromus patulus var. villosus, Bromus pectinatus var. vestitus, Bromus phrygius, Bromus pseudojaponicus, Bromus regnii, Bromus squarrosus var. patulus, Bromus subsquarrosus, Bromus ugamicus, Bromus vestitus var. minor, Bromus vestitus var. purpurascens, Bromus villiferus, Bromus x karlobagensis, Forasaccus patulus, Serrafalcus japonicus, Serrafalcus patulus

čeled': Poaceae

oblasti: Alabama, Alberta, Arizona, Arkansas, Balúčistán, Britská Kolumbie, Connecticut, Česká republika, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Jižní Dakota, Jižní Karolína, Kalifornie, Kansas, Kentucky, Kolorado, Louisiana, Maine, Manitoba, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nové Mexiko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Saskatchewan, Severní Dakota, Severní Karolína, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Wyoming, Západní Virginie

Roste od střední Evropy po Japonsko, zavlečen byl do zbytku Evropy a Severní Ameriky. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 15 - 60 (i 90)cm. Listy jsou dlouhé do 20cm a široké 1,5 - 5,5mm. Květenstvím je lata délky 6 - 20cm s (1 -) 3 (i 4)mi klásky, větve laty bývají delší než klásky, klásky jsou dlouze kyjovité, zpravidla 7 - 10 (i 15)tikvěté, dlouhé 3 - 4cm, pluchy jsou široké 3 - 4mm a mají blanitý lem uprostřed jen málo se rozšiřující. Patří mezi vzácnější druhy C4. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. anatolicus
- var. chiapporianus
- subsp. japonicus (Sveřep japonský pravý)
- subsp. subsquarrosus

Vyhovují mu poly, úhory a osluněné stráně.

<https://www.rostliny.net/>