

Sherardia arvensis (Bračka rolní)

čeleď: Rubiaceae

oblasti: Alabama, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arizona, Arkansas, Arménie, Baleáry, Belgie, Bělorusko, Britská Kolumbie, Bulharsko, Chorvatsko, Connecticut, Česká republika, Dánsko, Delaware, Finsko, Florida, Francie, Georgia, Gruzie, Havajské ostrovy, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, J Švédsko, Jižní Karolína, Jordánsko, Kalifornie, Kansas, Katalánsko, Kentucky, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libye, Lotyšsko, Louisiana, Maďarsko, Maine, Makaronésie, Maroko, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Německo, Nevada, New Jersey, New York, Nové Skotsko, Ohio, Oklahoma, Ontario, Oregon, Pennsylvania, Polsko, Portugalsko, Quebec, Rakousko, Řecko, Rhode Island, Rumunsko, Sardínie, Severní Karolína, Sicílie, Slovinsko, Srbsko, Švýcarsko, Tennessee, Texas, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Vermont, Virginie, Washington, Wisconsin, Z Rusko, Západní Virginie

Pochází z Evropy, severní Afriky a jihozápadní Asie. Poléhavý až vystoupavý stonek dorůstá délky 5 - 30 (i 50)cm a má čtvercový průřez, je drsně ochlupený a větvený při zemi. Listy vyrůstají v (4 -)5 - 6tičtných přeslenech, jsou dlouhé 0,4 - 1,7 (i 2,2)cm, povrch je osténkatě drsný a jednožilný, přízemní mají obvejčitý tvar, horní jsou kopinaté. Kvete drobnými světlefialovými květy o průměru (3,3 -) 4 - 5 (i 5,5)mm se 4mi korunními lístky v chudokvětém koncovém strboulu z 4 - 6ti květů podepřených 8 - 10ti listy. Plodem je suchá 2 - 4mm 2nažka obsahující 2 semena.

Vyhovují ji lehké vápnité půdy, okraje cest, obilí, atp. Má ráda teplo.

<https://www.rostliny.net/>