

Anacamptis (Rudohlávek)

čeleď: Orchidaceae

Patří mezi terestrické orchideje a trvalky. Roste na loukách, skalách nebo dunách Euroasie od středozeří po střední Asii. Kvete v létě ve vzpřímeném klasu obvykle růžovými nebo fialovými květy.

Anacamptis boryi

synonyma: *Herorchis boryi*, *Orchis boryi*, *Orchis boryi* var. *alba*, *Orchis morio* subsp. *boryi*, *Orchis quadripunctata* var. *boryi*

oblasti: Balkánský poloostrov, Evropa, J Evropa, J Řecko, Kréta, Peloponézský poloostrov, Řecko, Střední střeozemí, Střeozemí

Pochází z jižního Řecka a Kréty.

Anacamptis caspia

Anacamptis champagneuxii

oblasti: Střeozemí, Z Střeozemí

Pochází ze západního střeozemí.

Anacamptis collina (Vstavač chlumní)

synonyma: *A. collina* f. *flavescens*, *A. collina* f. *laxispicata*, *Barlia collina*, *Herorchis collina*, *Orchis chlorotica*, *Orchis collina*, *Orchis collina* f. *flavescens*, *Orchis collina* f. *purpurea*, *Orchis collina* subsp. *chlorotica*, *Orchis collina* subsp. *fedtschenkoi*, *Orchis collina* var. *flavescens*, *Orchis dulukae*, *Orchis fedtschenkoi*, *Orchis leucoglossa*, *Orchis papilionacea* subsp. *chlorotica*, *Orchis saccata*, *Orchis saccata* f. *flavescens*, *Orchis saccata* f. *orbicularis*, *Orchis saccata* subsp. *fedtschenkoi*, *Orchis saccata* var. *fedtschenkoi*, *Orchis sparsiflora*, *Vermeulenian chlorotica*, *Vermeulenian collina*, *Vermeulenian fedtschenkoi*, *Vermeulenian saccata*

oblasti: Andalusie, Asie, Evropa, Iberský poloostrov, Írán, Itálie, J Evropa, J Španělsko, JZ Asie, JZ Evropa, Malta, Střední střeozemí, Střeozemí, Španělsko, Turkmenistán

Roste od střeozemí po jižní Turkmenistán. Dorůstá výšky 12 - 34cm. Kvete růžovými květy.

Anacamptis coriophora (Vstavač štěničný)

synonyma: *A. coriophora* f. *alba*, *A. coriophora* f. *virescens*, *A. coriophora* ssp. *carpetana*, *A. coriophora* ssp. *fragrans*, *A. coriophora* ssp. *martrinii*, *A. coriophora* ssp. *nervulosa*, *A. coriophora* subsp. *carpetana*, *A. coriophora* subsp. *fragrans*, *A. coriophora* subsp. *martrinii*, *A. coriophora* subsp. *nervulosa*, *A. coriophora* var. *carpetana*, *A. coriophora* var. *martrinii*, *A. fragrans*, *Anteriorchis coriophora*, *Anteriorchis coriophora* ssp. *fragrans*, *Anteriorchis coriophora* ssp. *martrinii*, *Anteriorchis coriophora* subsp. *fragrans*, *Anteriorchis coriophora* subsp. *martrinii*, *Anteriorchis coriophora* var. *carpetana*, *Anteriorchis coriophora* var. *martrinii*, *Anteriorchis fragrans*, *Anteriorchis fragrans* f.

apricorum, Herorchis coriophora, Herorchis coriophora ssp. fragrans, Herorchis coriophora ssp. martrinii, Herorchis coriophora subsp. fragrans, Herorchis coriophora subsp. martrinii, Orchidactyla carpetana, Orchis carpetana, Orchis cassidea, Orchis cimicina, Orchis coreosmus, Orchis coriophora, Orchis coriophora f. alba, Orchis coriophora f. borosiana, Orchis coriophora f. latifolia, Orchis coriophora f. nana, Orchis coriophora f. virescens, Orchis coriophora ssp. carpetana, Orchis coriophora ssp. cimicina, Orchis coriophora ssp. fragrans, Orchis coriophora ssp. martrinii, Orchis coriophora ssp. nervulosa, Orchis coriophora subsp. carpetana, Orchis coriophora subsp. cimicina, Orchis coriophora subsp. fragrans, Orchis coriophora subsp. martrinii, Orchis coriophora subsp. nervulosa, Orchis coriophora var. carpetana, Orchis coriophora var. cassidea, Orchis coriophora var. cibiniensis, Orchis coriophora var. cimicina, Orchis coriophora var. czeremossica, Orchis coriophora var. dolichoceras, Orchis coriophora var. elongata, Orchis coriophora var. fragrans, Orchis coriophora var. latifolia, Orchis coriophora var. lusciniarum, Orchis coriophora var. major, Orchis coriophora var. martrinii, Orchis coriophora var. nervulosa, Orchis coriophora var. odorata, Orchis coriophora var. polliniana, Orchis coriophora var. sennenii, Orchis coriophora var. subsancta, Orchis coriophora var. symphypetala, Orchis fragrans, Orchis fragrans var. apricum, Orchis fragrans var. elongata, Orchis fragrans var. polliniana, Orchis martrinii, Orchis nervulosa, Orchis polliniana, Orchis x carpetana, x Orchidactyla carpetana

oblasti: Afrika, Andalusie, Arménie, Asie, Evropa, Iberský poloostrov, Írán, Itálie, J Evropa, J Španělsko, JZ Asie, JZ Evropa, Katalánsko, Malá Asie (Anatolie), Malta, Německo, S Afrika, S Evropa, Střední Evropa, Střední střeozemí, Střeozemí, SV Španělsko, Španělsko, Turecko, Z Asie, Z Evropa

Roste ve střeozemí a západní Asii. Dorůstá výšky 15 - 30 (i 50)cm. Listy jsou přizemní, v počtu 3 - 10ks a kopinaté. Květenstvím je hustý hrozen, vlastní květy jsou hnědorůžovofialové až nazelenalé, vydávají nepříjemný zápach, přilba je zobánkatá, hnědorůžovofialová se zelenými proužky, pysk je stejně dlouhý jako ostatní korunní listy, 3laločný, červený až hnědočervený, na bázi s bělavý nebo žlutozelený, tmavě tečkovaný, centrální lalok pysku není dále dělený, ostruha je bělavá, stočená k zemi a dlouhá 4 - 9mm. Patří mezi chráněné druhy CITES, u nás je vyhynulý A1. Existují vnitrodruhové taxony:

-
subsp. coriophora/Orchis coriophora
(Vstavač štěničný pravý) - Evropa, západní Asie

-
subsp. fragrans/Orchis fragrans
(Vstavač štěničný vonný) - střeozemí, Írán, západní, jižní a střední Evropa, severní Afrika, jihozápadní Asie; výška 15 - 40 (i 60)cm; květy menší, bílé s růžovými skvrnami a vanilkovým aroma; suché trávníky s vápencovým základem

Vyhovují mu slatiny, louky a pastviny.

Anacamptis cyrenaica

synonyma: Dactylorhiza cyrenaica, Herorchis cyrenaica, Orchis cyrenaica, Orchis melchifafii, Orchis papilionacea var. cyrenaica, Vermeuleniana cyrenaica, Vermeuleniana papilionacea var. cyrenaica

Anacamptis fragrans

oblasti: Afrika, Albánie, Alžírsko, Arménie, Asie, Ázerbájdžán, Baleáry, Balkánský poloostrov, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko, Evropa, Francie, Gruzie, Iberský poloostrov, Itálie, Izrael, J Evropa, Jordánsko, Jugoslávie, JV

Evropa, JZ Asie, JZ Evropa, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Libye, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, S Afrika, S Evropa, Sardínie, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Střední Evropa, Střední středozemí, Středozemí, Sýrie, SZ Afrika, Španělsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, V Evropa, V Středozemí, Z Asie, Z Evropa, Z Středozemí

Roste v Evropě, severní Africe a jihozápadní Asii.

Anacamptis israelitica

synonyma: *Herorchis israelitica*, *Orchis israelitica*

oblasti: Asie, Izrael, Palestina, Z Asie

Pochází ze severního Izraele a Palestiny.

Anacamptis laxiflora (Vstavač řídkokvětý)

synonyma: *A. laxiflora* f. *albiflora*, *A. laxiflora* subsp. *dielsiana*, *A. laxiflora* subsp. *dinsmorei*, *A. papilionacea* subsp. *heroica*, *Herorchis dinsmorei*, *Herorchis laxiflora*, *Herorchis pseudolaxiflora*, *Orchis ambigua*, *Orchis biloba*, *Orchis dinsmorei*, *Orchis dubia*, *Orchis elegans* var. *dinsmorei*, *Orchis ensifolia*, *Orchis heroica*, *Orchis laxiflora*, *Orchis laxiflora* f. *heldreichii*, *Orchis laxiflora* f. *lengyelii*, *Orchis laxiflora* f. *longibracteata*, *Orchis laxiflora* f. *micrantha*, *Orchis laxiflora* f. *minor*, *Orchis laxiflora* f. *zimmermannii*, *Orchis laxiflora* subsp. *dielsiana*, *Orchis laxiflora* subsp. *dinsmorei*, *Orchis laxiflora* subsp. *ensifolia*, *Orchis laxiflora* var. *albiflora*, *Orchis laxiflora* var. *dinsmorei*, *Orchis laxiflora* var. *guadarramica*, *Orchis laxiflora* var. *javorkae*, *Orchis laxiflora* var. *longibracteata*, *Orchis laxiflora* var. *paludosa*, *Orchis laxiflora* var. *persica*, *Orchis laxiflora* var. *pocutica*, *Orchis laxiflora* var. *tabernaemontani*, *Orchis mediterranea*, *Orchis morio* var. *angustifolia*, *Orchis palustris* f. *micrantha*, *Orchis palustris* ssp. *laxiflora*, *Orchis palustris* subsp. *laxiflora*, *Orchis palustris* subsp. *pseudolaxiflora*, *Orchis papilionacea* subsp. *heroica*, *Orchis papilionacea* var. *heroica*, *Orchis pseudolaxiflora*, *Orchis tabernaemontani*, *Paludorchis dinsmorei*, *Paludorchis laxiflora*, *Paludorchis pseudolaxiflora*, *Vermeuleniana papilionacea* var. *heroica*

oblasti: Andalusie, Asie, Balkánský poloostrov, Evropa, Francie, Iberský poloostrov, Itálie, Izrael, J Evropa, J Španělsko, JZ Evropa, Katalánsko, Německo, Řecko, S Evropa, Střední Asie, Středozemí, SV Španělsko, Španělsko, Z Asie, Z Evropa

Pochází ze středozemí s přesahem až do Normandie. Dorůstá výšky (20 -) 30 - 60 (i 80)cm. Stonek v horní části nahnědlý. Listy jsou zelené, dlouze kopinaté až čárkovité, dlouhé (7 -) 15 - 20cm, široké do 3cm, na průřezu ve tvaru V, jsou 1/2objímavé, ztlustlé a lodyžní listy jsou užší. Květenství je řídké, dlouhé 10 - 25cm, vlastní květy jsou fialové až růžové, korunní lístky úzce vejčité, pysk má větší šířku než délku, je 3laločný, postranní laloky jsou delší než střední s uťatým vrcholem, ostruha je šikmo vzpřímená a dlouhá 1,1 - 1,4cm. Plodem je tobolka. Patří mezi chráněné druhy CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

-
subsp. *laxiflora*

-
subsp. *palustris*

Vyhovují mu vlhké louky, světlé lesy, okraje toků, atp. se zásaditým pH.

Anacamptis longicornu

synonyma: *Orchis longicornu*, *Orchis longicornu* var. *tlemecensis*, *Orchis morio* var. *tlemecensis*

oblasti: Afrika, Alžírsko, Baleáry, Evropa, Francie, Iberský poloostrov, Itálie, J Evropa, JZ Evropa, Katalánsko, Korsika, Malta, S Afrika, Sardínie, Sicílie, Střední středozemí, Středozeří, SV Španělsko, Španělsko, Tunisko, Z Evropa, Z Středozeří

Pochází ze západního a středního středozemí. Kvete bílofialovými květy.

Anacamptis morio (Vstavač kukačka)

synonyma: *A. morio* f. *alba*, *Helleborine athensis*, *Herorchis morio*, *Herorchis picta* var. *skorpili*, *Orchis albertii*, *Orchis athensis*, *Orchis crenulata*, *Orchis intermedia*, *Orchis moria*, *Orchis morio*, *Orchis morio* f. *bilobulata*, *Orchis morio* f. *nana*, *Orchis morio* f. *robustior*, *Orchis morio* f. *sublaxiflora*, *Orchis morio* f. *sublobatus*, *Orchis morio* f. *subpicta*, *Orchis morio* f. *unilobata*, *Orchis morio* f. *velutina*, *Orchis morio* subsp. *alba*, *Orchis morio* subsp. *athensis*, *Orchis morio* var. *albiflora*, *Orchis morio* var. *athensis*, *Orchis morio* var. *carnea*, *Orchis morio* var. *elatior*, *Orchis morio* var. *flava*, *Orchis morio* var. *gigas*, *Orchis morio* var. *irregularis*, *Orchis morio* var. *parviflora*, *Orchis morio* var. *rosea*, *Orchis morio* var. *skorpili*, *Orchis morio* var. *subpicta*, *Orchis morio* var. *valida*, *Orchis morio* var. *velutina*, *Orchis morio* var. *viridiflora*, *Orchis officinalis*, *Orchis skorpili*, *Serapias athensis*

oblasti: Afrika, Albánie, Alžírsko, Andalusie, Arménie, Asie, Ázerbájdžán, Baleáry, Balkánský poloostrov, Belgie, Bělorusko, Bílé Karpaty, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Čechy, Černá Hora, Česká republika, České středohoří, Český les, Dánsko, Estonsko, Evropa, Francie, Gruzie, Iberský poloostrov, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, J Evropa, J Španělsko, Jordánsko, Jugoslávie, JV Evropa, JZ Asie, JZ Evropa, Katalánsko, Korsika, Kosovo, Kréta, Krym, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, Morava, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Rumunsko, S Afrika, S Evropa, Sardínie, Sicílie, Skandinávie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Střední Evropa, Střední středozemí, Středozeří, SV Španělsko, Sýrie, SZ Afrika, SZ Čechy, SZ Evropa, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, V Evropa, V Morava, V Středozeří, Velká Británie, Z Asie, Z Čechy, Z Evropa, Z Středozeří

Pochází z Evropy a západní Asie (po Írán). Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky (7 -) 13 - 30 (i 40)cm. Pod zemí vytváří hlízu. Listy vytvářejí přízemní růžici, jsou kopinaté, občas eliptické, dlouhé do 14cm a vytvářejí přízemní růžici. Kvete růžovými až fialovými květy v 5 - 25ti četném hroznovitém klasu s délkou do 13cm, pysk je min. stejně široký jako dlouhý, 1 - 1,5cm, 3laločný, postranní laloky jsou mnohem větší, centrální je drobný až zcela chybějící a světlý, tmavě skvrnitý. Patří mezi chráněné druhy CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp.
champagneuxii

- subsp.
morio
(Vstavač kukačka pravý)

- subsp.
picta

Vyhovují mu vlhké nízké spíše sušší louky a půdy s pH 5,5 - 8,6 a bohaté na živiny.

Fotografie převzata z <http://www.vkolacek.cz/> .

Anacamptis palustris (Vstavač bahenní)

synonyma: *Herorchis palustris*, *Orchis elegans*, *Orchis festiva*, *Orchis germanorum*, *Orchis heuffeliana*, *Orchis laxiflora*, *Orchis laxiflora f. quadriloba*, *Orchis laxiflora ssp. palustris*, *Orchis laxiflora subsp. palustris*, *Orchis laxiflora var. mediterranea*, *Orchis laxiflora var. palustris*, *Orchis mediterranea*, *Orchis palustris*, *Orchis palustris subsp. mediterranea*, *Orchis palustris var. mediterranea*, *Orchis speciosa*, *Paludorchis palustris*, *Rauranita paludosa*

oblasti: Afrika, Andalusie, Asie, Česká republika, Evropa, Iberský poloostrov, Írán, Itálie, J Evropa, J Španělsko, JV Evropa, JZ Asie, JZ Evropa, Maroko, Polsko, S Evropa, Střední Asie, Střední Evropa, Středozeří, SZ Afrika, Španělsko, Z Asie, Z Evropa

Pochází z Evropy, středozeří, západní a střední Asie. Dorůstá výšky 30 - 50cm. Báze lodyhy i přízemních listů je bez teček. Kvete červenofialovými až růžovofialovými, listeny jsou 3 - 5tižilné, nejspodnější s příčnými žilkami, pysk je 3laločný, střední lalok je delší než postranní, uprostřed světlejší a tmavě tečkovaný. Patří mezi chráněné druhy C1. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *elegans*/*Orchis elegans*
(Vstavač bahenní nádherný) - jihovýchodní Evropa, západní a střední Asie; výška 0,6 - 0,8 (i 1)m; listy má čárkovité až kopinaté, dlouhé do 25cm a široké 2,5 - 3 (i 4)cm; kvete fialovorůžovými květy; patří mezi chráněné druhy CITES; vlhké louky, příkopy, atp.
- subsp. *palustris*
(Vstavač bahenní pravý) - západní a střední Evropa, středozeří, Írán
- subsp. *robusta*
- západní Maroko

Vyhovují mu slatiny a bažinaté louky.

Anacamptis papilionacea (Vstavač motýlovitý)

synonyma: *A. papilionacea subsp. alibertis*, *A. papilionacea subsp. expansa*, *A. papilionacea subsp. grandiflora*, *A. papilionacea subsp. messenica*, *A. papilionacea subsp. palaestina*, *A. papilionacea subsp. rubra*, *A. papilionacea subsp. schirwanica*, *A. papilionacea subsp. thaliae*, *A. papilionacea var. balcanica*, *A. papilionacea var. nivea*, *A. papilionacea var. parviflora*, *Herorchis papilionacea*, *Herorchis papilionacea subsp. expansa*, *Herorchis papilionacea subsp. messenica*, *Herorchis papilionacea subsp. palaestina*, *Herorchis papilionacea subsp. schirwanica*, *Orchis bruhnsiana*, *Orchis candida*, *Orchis caspia*, *Orchis decipiens*, *Orchis expansa*, *Orchis moriopapilionacea*, *Orchis papilionacea*, *Orchis papilionacea f. balcanica*, *Orchis papilionacea f. grandiflora*, *Orchis papilionacea f. morgetiana*, *Orchis papilionacea f. palaestina*, *Orchis papilionacea f. rosea*, *Orchis papilionacea f. rubra*, *Orchis papilionacea subsp. alibertis*, *Orchis papilionacea subsp. balcanica*, *Orchis papilionacea subsp. bruhnsiana*, *Orchis papilionacea subsp. expansa*, *Orchis papilionacea subsp. grandiflora*, *Orchis papilionacea subsp. messenica*, *Orchis papilionacea subsp. palaestina*, *Orchis papilionacea subsp. rubra*, *Orchis papilionacea subsp. schirwanica*, *Orchis papilionacea var. alibertis*, *Orchis papilionacea var. bruhnsiana*, *Orchis papilionacea var. decipiens*, *Orchis papilionacea var. expansa*, *Orchis papilionacea var. grandiflora*, *Orchis papilionacea var. major*, *Orchis papilionacea var. messenica*, *Orchis papilionacea var. minimus*, *Orchis papilionacea var. morgetiana*, *Orchis papilionacea var. parviflora*, *Orchis papilionacea var. rosea*, *Orchis papilionacea*

var. rubra, *Orchis papilionacea* var. *vexillifera*, *Orchis papilionacea* var. *bruhsia*, *Orchis rubra*, *Orchis rubra* var. *expansa*, *Orchis schirwanica*, *Vermeulenica caspia*, *Vermeulenica papilionacea*, *Vermeulenica papilionacea* f. *balcanica*, *Vermeulenica papilionacea* f. *morgetiana*, *Vermeulenica papilionacea* f. *palaestina*, *Vermeulenica papilionacea* f. *rubra*, *Vermeulenica papilionacea* var. *aegaea*, *Vermeulenica papilionacea* var. *alibertis*, *Vermeulenica papilionacea* var. *bruhsiana*, *Vermeulenica papilionacea* var. *expansa*, *Vermeulenica papilionacea* var. *grandiflora*, *Vermeulenica papilionacea* var. *heroica*, *Vermeulenica papilionacea* var. *messenica*, *Vermeulenica papilionacea* var. *vexillifera*

oblasti: Afrika, Andalusie, Asie, Evropa, Iberský poloostrov, Írán, Itálie, J Evropa, J Španělsko, JV Evropa, JZ Asie, JZ Evropa, Kavkaz, Libye, Malta, S Afrika, Střední střeozemí, Střeozemí, Španělsko

Roste ve střeozemí, jihovýchodní Evropě a Íránu jako trvalka. Dorůstá výšky (10 -) 15 - 45 (i 56)cm. Listy jsou přizemní, v počtu 3 - 10ks, úzce eliptické až kopinaté, dlouhé do 18cm a široké 1,5cm. Květenství bývá řídké, vlastní květy jsou červenofialové, přilba je tvořená vzpřímenými špičatými růžovými korunními lístky s červenými žilkami, pysk je plochý, vroubkovaný, víceméně vodorovný, bělavý až růžový s červenými tečkami až čárkami, ostruha je sehnutá k zemi a dlouhá 0,8 - 1,4cm. Plodem je tobolka. Patří mezi chráněné druhy CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

-

var. *cyrenaica*

- severovýchodní Libye

-

var. *papilionacea*

- střeozemí, Írán

Vyhovují mu louky, pastviny, okraje lesů, atp.

Anacamptis picta

Anacamptis pyramidalis (Rudohlávek jehlancovitý)

synonyma: *Aceras pyramidale*, *Aceras pyramidalis* var. *brachystachys*, *A. brachystachys*, *A. condensata*, *A. durandii*, *A. pyramidalis* f. *angistiloba*, *A. pyramidalis* f. *apiculata*, *A. pyramidalis* f. *condensata*, *A. pyramidalis* f. *fumeauxiana*, *A. pyramidalis* f. *longispica*, *A. pyramidalis* f. *nivea*, *A. pyramidalis* f. *sanguinea*, *A. pyramidalis* f. *serotina*, *A. pyramidalis* f. *tanayensis*, *A. pyramidalis* subsp. *algarbiensis*, *A. pyramidalis* subsp. *brachystachys*, *A. pyramidalis* subsp. *condensata*, *A. pyramidalis* subsp. *durandii*, *A. pyramidalis* subsp. *serotina*, *A. pyramidalis* subsp. *tanayensis*, *A. pyramidalis* subsp. *urvilleana*, *A. pyramidalis* var. *albiflora*, *A. pyramidalis* var. *brachystachys*, *A. pyramidalis* var. *cerigensis*, *A. pyramidalis* var. *condensata*, *A. pyramidalis* var. *nivea*, *A. pyramidalis* var. *sanguinea*, *A. pyramidalis* var. *tanayensis*, *A. pyramidalis* var. *urvilleana*, *A. urvilleana*, *Orchis appendiculata*, *Orchis bicornis*, *Orchis brachystachys*, *Orchis condensata*, *Orchis cylindrica*, *Orchis pyramidalis*, *Orchis pyramidalis* var. *sanguinea*

oblasti: Afrika, Andalusie, Asie, Bílé Karpaty, Čechy, Česká republika, Český kras, Evropa, Iberský poloostrov, Írán, Irsko, Itálie, Izrael, J Evropa, J Morava, J Španělsko, JZ Asie, JZ Evropa, Katalánsko, Malta, Morava, Německo, S Afrika, S Evropa, Slovensko, Střední Čechy, Střední Evropa, Střední střeozemí, Střeozemí, SV Španělsko, SZ Evropa, SZ Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, V Evropa, V Morava, Z Asie

Roste v severní Africe, západní Asii a teplejších částech Evropy jako trvalka. Dorůstá výšky 20 - 60

(i 70)cm. Přízemní listy jsou čárkovité až kopinaté, žlábkovité, dlouhé až 25cm, široké 0,7 - 1,4cm, lodyžní jsou úzce kopinaté, nejvyšší až listenovité, vyrůstají na podzim a odumírají při kvetení. Kvete v létě v hustém vzpřímeném, zprvu kuželovitém, později válcovitém klasu červenorůžovými až fialovými květy, přílba je malá, pysk je hluboce 3laločný, na bázi bleděružový až bělavý se 2ma hrbolky, dlouhý 6 - 9mm, ostruha je tenká, úzce válcovitá a zpravidla skloněná k zemi. Plodem je tobolka. Patří mezi kriticky ohrožené druhy C1 a je zapsaný v CITES. Existují vnitrodruhové taxony:

-
- var. alba
 - bílé květy
-
- subsp. sanguinea
-
- subsp. tanayensis
-
- subsp. urvilleana

Roste na loukách, skalách nebo dunách. Vyhovuje jí zásadité pH, křoviny, okraje lesů, pastviny, polostepi atp.

Fotografie převzata z <http://www.vkolacek.cz/> .

Anacamptis robusta

Anacamptis sancta

synonyma: Anteriorchis sancta, Herorchis sancta, Orchis coriophora subsp. sancta, Orchis coriophora var. sancta, Orchis sancta, Orchis sancta f. minor

oblasti: Středozeří, V Středozeří

Pochází z východního středozeří. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 15 - 45cm. Listy mají úzce kopinatý tvar. Kvete fialovozelenými květy. Plodem je tobolka. Je zapsán v seznamu CITES.

Vyhovují mu křovinaté stráně, okraje lesů s půdou na vápencovém základě.

Anacamptis syriaca

synonyma: A. morio ssp. syriaca, Orchis morio ssp. syriaca, Orchis morio var. syriaca, Orchis syriaca

oblasti: Asie, JZ Asie, Kypr, Libanon, Malá Asie (Anatolie), Středozeří, Turecko, V Středozeří, Z Asie

Roste na Kypru, jižním Turecku a Libanonu.

Anacamptis urvilleana (Rudohlávek maltský)

oblasti: Malta, Střední střeozemí, Střeozemí

Patří mezi endemity Malty. Kvete růžovými až bílými květy v terminálním kuželovitém hroznu.

Anacamptis x alata

synonyma: Heropaludorchis alata, Orchis laxiflora var. alata, Orchis x alata

Anacamptis x alatoides

synonyma: Orchis x alatoides

Anacamptis x albuferensis

oblasti: Baleáry, Mallorca, Střeozemí, Z Střeozemí

Pochází z Malorky. Jedná se o hybrid

A. fragrans

x

A. robusta

.

Anacamptis x bornemanniae

oblasti: Afrika, S Afrika, Sardínie, Střeozemí, Z Střeozemí

Pochází ze severní Afriky a Sardýnie. Jedná se o hybrid

A. longicornu

x

A. papilionacea

.

Anacamptis x caccabaria

synonyma: Orchis x caccabaria, Paludomeulenia caccabaria

Anacamptis x dafnii

synonyma: Orchis dulukae subsp. camparonensis, Orchis x dafnii, Vermeulenia x dafnii

Anacamptis x duquesnei

synonyma: Aceras x duquesnei, Anacampaludorchis duquesnei, Anacamptorchis duquesnei, Orchis x duquesnei

oblasti: Evropa, Francie, Z Evropa

Pochází z Francie. Jedná se o hybrid

A. palustris

x

A. pyramidalis

Anacamptis x eccarii

synonyma: Anterioherorchis eccarii

Anacamptis x feinbruniae

synonyma: Heromeulenia feinbruniae, Orchis x feinbruniae

Jedná se o hybrid

A. caspia

x

A. israelitica

Anacamptis x genevensis

synonyma: Heropaludorchis genevensis, Orchis x genevensis

Anacamptis x gennarii

synonyma: Heromeulenia gennarii, Orchis x gennarii

oblasti: Středozeří, Z Středozeří

Pochází ze západního středozeří. Jedná se o hybrid

A. morio

x

A. papilinocea

Anacamptis x gerakarionis

synonyma: Heropaludorchis gerakarionis, Orchis x gerakarionis

Anacamptis x klinge

oblasti: Evropa, Francie, Z Evropa

Pochází z Francie. Jedná se o hybrid

A. laxiflora

x

A. pyramidalis

Anacamptis x lanicca

synonyma: Anacamptorchis lanicca, Anacamptorchis lanicca

oblasti: Evropa, Francie, Střední Evropa, Švýcarsko, Z Evropa

Pochází ze Švýcarska a Francie. Jedná se o hybrid

A. morio

x

A. pyramidalis

Anacamptis x larzacensis

synonyma: Anacampaludorchis larzacensis, Anacamptorchis klingeii, Anacamptorchis larzacensis

Anacamptis x lasithica

synonyma: Heromeulenia lasithica, Orchis x lasithica

Anacamptis x lesbiensis

synonyma: Anacamptorchis lesbiensis, Anteriocamptis lesbiensis

oblasti: Egejské ostrovy, Středozeří

Pochází z východoegejských ostrovů. Jedná se o hybrid

A. pyramidalis

x

A. sancta

Anacamptis x lloydiana

synonyma: Orchis laxiflora var. intermedia, Orchis x intermedia, Orchis x lloydiana, Paludorchis x lloydiana

Anacamptis x menosii

synonyma: Anterimeulenia menosii, Orchis x menosii

Anacamptis x olida

synonyma: Anterioherorchis olida, Orchis cimicina, Orchis coriophora subsp. olida, Orchis x olida

Anacamptis x parvifolia

synonyma: Anteripaludorchis bicknellii, Anteripaludorchis parvifolia, Orchis x bicknellii, Orchis x parvifolia, Orchis x parvifolia subsp. bicknellii

Anacamptis x sciathia

synonyma: Herorchis x sciathia, Orchis x sciathia

Anacamptis x semisaccata

synonyma: Heromeulenia semisaccata, Orchis x semisaccata

Anacamptis x simarrensensis

oblasti: Balkánský poloostrov, Evropa, Francie, Itálie, J Evropa, Řecko, Z Evropa

Roste v Francii, Itálii a Řecku. Jedná se o hybrid

A. fragrans

x

A. pyramidalis

.

Anacamptis x simorrensensis

synonyma: Anacamptorchis simorrensensis, Anacamptorchis simorrensensis var. ticinensis, Anacamptorchis ticinensis, Anteriocamptis simorrensensis

Anacamptis x timbali

synonyma: Anteriopaldorchis timbali, Orchis x parvifolia subsp. timbali, Orchis x timbali, Paludomeulenia timbali

Anacamptis x van-lookenii

synonyma: Anacampteukenia van-lookenii, Anacamptorchis van-lookenii

oblasti: Evropa, Francie, Z Evropa

Pochází z Francie. Jedná se o hybrid

A. papilionacea

x

A. pyramidalis

.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/anacamptis-pyramidalis/>

<http://www.blackorchids.cz/2011/06/30/anacamptis-pyramidalis/>

<http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=639>

<http://www.naturabohemica.cz/anacamptis-pyramidalis/>

<http://www.rostliny.net/>