

Ceratocephala (Rohohlavec)

čeleď: Ranunculaceae

Ceratocephala caulifolia

Ceratocephala falcata (Rohohlavec srpovitý)

oblasti: Andalusie, Itálie, Izrael, Katalánsko, Kazachstán, Německo, Pákistán

Roste ve střední Asii jako jednoletka a u nás je neznámý. Dorůstá výšky 1 - 5 (i 8)cm. Povrch je hustě ochlupený. Listy jsou dlaniťe laločnaté na 2 - 3 čárkovité laloky s min. tak dlouhými řapíčky. Kvete samostatnými květy o průměru 5 - 7mm s 5ti kališními a 5ti korunními lístky. Plodenství je klasnaté a válcovité.

Ceratocephala pungens

Ceratocephala testiculata (Rohohlavec rovnírohý)

synonyma: C. falcata, C. orthoceras, Ranunculus testiculatus

oblasti: Arizona, Britská Kolumbie, Česká republika, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Kolorado, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New York, Nové Mexiko, Ohio, Ontario, Oregon, Pákistán, Saskatchewan, Severní Dakota, Ťan-šan, Utah, Washington, Wisconsin, Wyoming

Vyskytuje se v Euroasii. Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky 1 - 8cm. Povrch je ochlupený. Vytváří pouze 1 stonek. Listy jsou ochlupené, dlaniťe dělené na 2 - 3 laloky s řapíčky max. tak dlouhými. Kvete samostatnými žlutými květy o průměru 5 - 7mm, kališních i korunních lístků bývá zpravidla 5. Plodenstvím je válcovitý klas, vlastním plodem je nažka s dlouhým zobánkem. Je jedovatý. Aktuálně patří u nás mezi vyhynulé druhy A1.

Vyhovují mu suché traviny, úhory, atp.

<https://www.rostliny.net/>