

Axyris (Bříšť)

čeleď: Chenopodiaceae

Axyris amaranthoides (Bříšť sibiřský)

synonyma: *Atriplex amaranthoides*, *A. amaranthoides* f. *dentata*, *A. amaranthoides* var. *dentata*

oblasti: Alberta, Asie, Britská Kolumbie, Iowa, Kolorado, Maine, Manitoba, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Montana, New Hampshire, New York, Nový Brunšvik, Ontario, Quebec, Saskatchewan, Severní Dakota, Severozápadní Teritorium

Pochází z Asie. Listy mají vejčité kopinatý až úzce kopinatý tvar, spodní strana je hustě ochlupená. Samčí květy vykvétají v klubičkách a jsou seskupené do klasů, samičí vykvétají po 1 - 3ks v paždí listenů. Plodem je červenohnědá obvejčitá nažka délky 2,5 - 3,5mm.

Vyhovují mu rumiště.

Axyris caucasica

Axyris hybrida

synonyma: *A. amaranthoides* f. *nana*, *A. amaranthoides* var. *nana*, *A. hybrida* var. *eravinensis*

oblasti: Kašmír, Pákistán

Roste v severní a střední Asii jako jednoletka. Dorůstá výšky do 30cm. Stonek je vzpřímený a ochlupený. Větve jsou rozkladité až vystoupavé. Listy jsou vejčité, krátce řapíkaté, oboustranně řídce ochlupené a dlouhé 1 - 3cm. Květenství je klasnaté. Plody jsou kulaté až obvejčité, dlouhé 2 - 2,2mm a široké 1,5 - 1,75mm.

Axyris koreana

Axyris prostrata

synonyma: *A. amaranthoides* var. *humifusa*, *A. glacialis*, *A. pamirica*, *A. prostrata* f. *ovatifolia*, *A. prostrata* var. *pamirica*

oblasti: Kašmír, Kyrgyzstán, Ladak, Mongolsko, Pákistán, Sibiř, Tádžikistán

Roste na Sibiři, v Mongolsku, Tádžikistánu a Kašmíru. Stonky jsou ochlupené. Listy jsou řapíkaté, oboustranně ochlupené a vejčité. Plody jsou obvejčité až kulaté, tmavěšedé, dlouhé 1,4 - 1,75mm a široké 1 - 1,5mm.

Axyris sphaerosperma

<https://www.rostliny.net/>