

## Sempervivum marmoreum (Netřesk jižní)

synonyma: *Sempervivum assimile*, *Sempervivum assimile* var. *blandum*, *Sempervivum assimile* var. *glabrescens*, *Sempervivum balcanicum*, *Sempervivum ballsii*, *Sempervivum banaticum*, *Sempervivum blandum*, *Sempervivum blandum* var. *assimile*, *Sempervivum blandum* var. *blandum*, *Sempervivum brunneifolium*, *Sempervivum degenianum*, *Sempervivum erythraeum*, *S. f. rubicundum*, *S. subsp. ballsii*, *S. subsp. blandum*, *S. var. blandum*, *Sempervivum michaelis-borsii*, *Sempervivum reginae-amaliae*, *Sempervivum rubicundum*, *Sempervivum schlehanii*

čeleď: Crassulaceae

oblasti: Bulharsko

Roste v Bulharsku. Lodyha dorůstá výšky 5 - 12cm, je hustě ochlupená a žláznatě ochlupená. Vytváří růžice o průměru 1,5 - 2,5cm. Listy mají dlouze kopinatý tvar s pozvolným zašpičatěním. Délka dosahuje 0,7 - 1cm, šířky 3 - 5mm, obě strany jsou žláznatě ochlupené, zelené a u špičky načervenalé. Lodyžní lístky mají dlouhý čárkovitý tvar a místy jsou ochlupené. Květenství je málo větvené. Kvete světlefialovými květy. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. *ballsii*
- subsp. *marmoreum*
- subsp. *matricum* (Netřesk jižní matranský)
- subsp. *reginae-amaliae*
- 'Rubicundum'

<https://www.rostliny.net/>