Coccothrinax

čeleď: Arecaceae

Roste na Bahamách, Floridě, Mexiku a Kubě v podobě elegantní palmy. Kmínky mají pokryté vlákny listových pochev, často s jemnými krajkovými vzory. Listy jsou dlanitě dělené, úkrojky zpravidla rozeklané ve vrcholové části a spodní strana mívá stříbřité šupinky. Květenství bývá kratší listů, vlastní květy jsou oboupohlavné, drobné, stopkaté, bílé až světlebéžové, kalich je s korunou spojený a tyčinek má 9 - 12ks. Plody tmavěfialové až černé, malé a kulaté. Semena jsou většinou malá, klíčivost bývá velmi dobrá až vynikající a další růst semenáčků hodně pomalý. Nám nejbližší velká sbírka těchto palem je v botanické zahradě na kanárském ostrově Tenerife. Podobný rod Thrinas má rozštěpené listové báze a bílé plody.

Dobře snáší chudé i podmáčené půdy.

Množí se semeny.

Coccothrinax acuminata

Coccothrinax acunana

Coccothrinax alexandri

Coccothrinax alta

synonyma: C. eggersiana, C. eggersiana var. sanctae-crucis, C. latifrons, C. laxa, C. sanctae-thomae, Thrincoma alta, Thringis latifrons, Thringis laxa

oblasti: Portoriko, Tropická Afrika

Roste na Portoriku a ostrovech Svatého Tomáše v podobě palmy. Kmen dorůstá výšky do 10m při průměru 10cm. Listy jsou kulaté, dlanité, převislé, zelené, lesklé, dlouhé do 75cm, na spodní straně stříbřité a úkrojky jsou široké až 4cm. Kvete bílými květy. Plody jsou hnědočerné až černé a lesklé.

Coccothrinax argentata

synonyma: C. garberi, C. jucunda, C. jucunda var. macrosperma, C. jucunda var. marquesensis, Palma argentata, Thrinax altissima, Thrinax garberi

oblasti: Florida, Jamajka, Kolumbie, Kuba, Mexiko

Roste od Floridy a Mexika přes Karibik po Kolumbii v podobě palmy. Kmen má výšku 1 - 10m při průměru do 20cm. Listy jsou 1/2kulaté až kulaté, na spodní straně stříbřité, zlatohnědé až kovově zelené, dlanitě dělené na 39 - 54 lístků o délce 0,3 - 1m a pochvy jsou 2vrsté bez trnů. Květenství je krátké, převislé a má 2 - 9ks větví. Plody jsou kulaté, růžovofialovočerné a v průměru mají 0,5 - 1,3cm.

Coccothrinax argentea

synonyma: Acanthorrhiza argentea, C. jucunda, Thrinax argentea, Thrinax argentea var. garberi, Thrinax graminifolia, Thrinax longistyla, Thrinax multiflora

oblasti: Florida, Hispaniola, Jamajka, Kuba, Portoriko

Roste na Floridě a Karibiku v podobě i trsnaté palmy. Dorůstá výšky do 10m při průměru kmene 5 - 20cm. Listy jsou kulaté, dlouhé 75cm, báze srdčitá, zelené, lesklé, spodní strana stříbřitá, dlanitě zpeřené, má až 30 špičatých úkrojků o délce 35 - 60cm, řapíky štíhlé a pochva 2vrstvá bez trnů. Květenství je krátké, krátce stopkaté, převislé, má 2 - 10 větví, vlastní květy mají průměr 3mm a stopku délky 1 - 3mm. Plody jsou kulaté, růžovofialovočerné a v průměru mají 0,6 - 1,2cm.

Coccothrinax baileyana

Coccothrinax baracoensis

Coccothrinax barbadensis

synonyma: C. australis, C. boxii, C. discreta, C. dussiana, C. martinicaensis, C. sabana, C. sancti-thomae, Copernicia barbadensis, Thrinax barbadensis, Thrinax parviflora

oblasti: Portoriko, Venezuela

Roste na Malých Antilách a Venezuele v podobě palmy s kmenem o výšce 2,5 - 15m a průměru 5 - 18cm. Listy jsou dlanitě dělené na 35 - 60 úkrojků o délce 65 - 80cm, šířce až 5cm, spodní strana je stříbřitá, řapíky mají ostré okraje a pochvy jsou 2vrstvé. Květenství je krátké, převislé a má 3 - 10 větví. Plody jsou kulaté, růžovofialovočerné a v průměru mají 0,6 - 1,2cm

Vydrží až -3°C.

Coccothrinax bermudezii

oblasti: Karibik

Coccothrinax borhidiana

oblasti: Kuba

Roste na Kubě v podobě palmy. Dorůstá výšky 1 - 7m při průměru kmene 8 - 20cm. Listy jsou jen krátce řapíkaté, hustě nahloučené, pevné, kožovité, tvoří hodně kompaktní tmavě zelený chochol, čepel je 3/4kulatá, dlanitě tvořená 32 - 36 lístky o délce 60 - 65cm. Květenství je vzpřímené, umístěné pod listy, později převislé a má 4 - 5 větví. Plody jsou kulaté, růžovofialové a v průměru mají 7 - 9mm.

Patří k nejkrásnějším palmám světa. Je nejžádanější a také jeden z nejvzácnějších druhů rodu. Roste jen na nepatrném území severního pobřeží Kuby na vápencových půdách. V kultuře je mimořádně vzácný a ceněný.

Coccothrinax boschiana

Coccothrinax camagueyana

Coccothrinax clarensis
synonyma: C. clarensis subsp. perrigida, C. clarensis var. perrigida

Coccothrinax concolor

Coccothrinax crinita
synonyma: Antia crinita, Thrinax crinita

oblasti: Kuba

Roste na Kubě. Dorůstá výšky až 10m. Kmen je pokrytý hnědými vlákny. Listy jsou kulaté, dlouhé až 2m, čepel z toho do 70cm, je dlanitě dělená na až 56 leklých úkrojků. Květenství je vzpřímené až obloukovité, umístěné pod listy a má 4 - 5 větví. Plody jsou kulovité, černé až hnědé a v průměru mají 0,7 - 2cm.

Coccothrinax cupularis
synonyma: C. miraguama subsp. cupularis, C. miraguama var. cupularis

Coccothrinax ekmanii
synonyma: Beata ekmanii, Haitiella ekmanii

oblasti: Hispaniola, Kuba

Roste na Kubě a Hispaniole v podobě palmy. Kmen má výšku 3 - 15m a průměr 5 - 20cm. Listy jsou 1/3 - 1/2kulaté, na spodní straně stříbřité, dlanitě dělené na 16 - 25 lístků o délce 20 - 40cm, pochvy jsou 2vrstvé, tlustě vláknité a na vrcholu trnité. Květenství je převislé, umístěné pod listy a má 3 - 5 větví. Plody jsou prakticky kulaté, hnědé a v průměru mají 5 - 6mm.

Coccothrinax elegans

Coccothrinax fagildei

Coccothrinax fragrans

oblasti: Hispaniola, Kuba

Roste na Kubě i Hispaniole v podobě palmy. Kmen má výšku do 5m a je pokrytý řídkou pavučinou. Listy jsou namodralé, lesklé a dlanitě dělené.

Coccothrinax garciana

Coccothrinax gracilis

oblasti: Hispaniola

Roste na Hispaniole v podobě palmy. Kmen má výšku do 10m, průměr 15cm a může být kroucený. Listy jsou kulaté, na spodní straně stříbřité, dlanitě tvořené až 40ti lístky o délce do 65cm, pochvy jsou 2 - 3vrstvé a beztrnné. Květenství je malé, převislé, umístěné pod listy a má 5 - 6 větví. Plody jsou kulaté v průměru mají 6 - 8mm.

Coccothrinax guantanamensis

synonyma: C. argentea subsp. guantanamensis, C. argentea var. guantanamensis

Coccothrinax gundlachii

oblasti: Kuba

Roste na Kubě v podobě palmy. Dorůstá výšky 4 - 10m při průměru kmene 7 - 20cm. Listy jsou min. ze 3/4 kulaté, zelené, dlanitě dělené na 30 - 45 lístků o délce 0,6 - 1m, pochva 2vrstvá a postrádá trny. Květenství je umístěné nad listy, vzpřímené a má 4 - 10 větví. Plody jsou kulaté, růžovofialovočerné a v průměru mají 1 - 1,3cm.

Coccothrinax hiorami

oblasti: Kuba

Roste na Kubě v podobě palmy. Kmen má výšku 6 - 12m a průměr 7 - 15cm. Listy jsou min. ze 3/4 kulaté, na spodní straně stříbřité, dlanitě tvořené 40 - 64mi lístky o délce 50 - 80cm, pochva je 2vrstvá a postrádá trny. Květenství je dlouhé, tvořené 4 - 8mi větvemi. Plody jsou kulaté, černé a v průměru mají 0,9 - 1,1cm.

Coccothrinax hioramii

Coccothrinax inaguensis

oblasti: Kuba

Roste na Bahamách a Kubě v podobě palmy. Kmen má výšku 2 - 5m a průměr 6 - 8cm. Listy jsou zelené, dlanitě dělené na 39 - 47 úkrojků o délce 36 - 50cm. Květenství je malé, převislé a umístěné pod listy. Plody jsou kulaté, růžovofialové a v průměru mají 1,2 - 1,3cm.

Coccothrinax jamaicensis

oblasti: Jamajka

Coccothrinax leonis

Coccothrinax litoralis

Coccothrinax macroglossa
synonyma: C. miraguama subsp. macroglossa, C. miraguama var. macroglossa

Coccothrinax microphylla

Coccothrinax miraguama
synonyma: C. acuminata, C. miraguama, C. miraguama var. novogeronensis, Copernicia miraguama, Corypha miraguama, Thrinax acuminata, Thrinax miraguama, Thrinax stellata

oblasti: Hispaniola, Kuba

Roste na Kubě a Hispaniole v podobě palmy. Kmen má výšku 1 - 15m a průměr 4 - 12cm. Listy jsou min. z 1/3 kulaté, na spodní straně zelené až stříbřité, dlanitě dělené na 18 - 50 úkrojků o délce 22 - 65cm, pochva je 2 - 3vrstvá a postrádá trny. Květenství je umístěné pod listy, převislé a má 1 - 4 větve. Plody jsou růžovofialovočerné, kulaté a v průměru mají 0,5 - 1,2cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Macroglossa'
- 'Rosecarpa'

Coccothrinax moaensis
synonyma: C. yuraguana subsp. moaensis

Coccothrinax montana

Coccothrinax munizii
synonyma: Haitiella munizii

Coccothrinax muricata

Coccothrinax nipensis

Coccothrinax orientalis
synonyma: C. yuraguana subsp. orientalis, C. yuraguana var. orientalis

Coccothrinax pauciramosa
synonyma: C. muricata var. nipensis

oblasti: Kuba

Roste na Kubě v podobě palmy. Kmen má výšku do 15m a průměr 4 - 20cm. Listy jsou min. ze 3/4 kulaté, na spodní straně stříbřité (i zelené), dlanitě dělené na 16 - 32 lístků o délce do 23 - 52cm, pochvy jsou 2 - 3vrstvé a postrádají trny. Květenství je umístěné nad listy, vzpřímené a má 1 - 10 větví. Plody jsou kulaté, růžovofialovočerné a v průměru mají 0,7 - 1,2cm.

Coccothrinax proctorii

Coccothrinax pseudorigida
synonyma: C. pseudorigida var. acaulis

Coccothrinax pumila

Coccothrinax readii

Coccothrinax rigida
synonyma: Thrinax rigida

Coccothrinax salvatoris

oblasti: Kuba

Roste na Kubě v podobě palmy. Kmen má výšku 4 - 8m při průměru kmene 8 - 10cm. Listy jsou z 1/2 - 3/4 kulaté, dlanitě dělené na 38 - 42 lístků o délce 26 - 56cm, pochvy jsou 2vrstvé a na vrcholu mají trny. Květenství je umístěné pod listy, převislé a má 2 - 4 větve. Plody jsou kulovité, růžovofialovočerné a v průměru mají 5 - 8mm.

Coccothrinax savannarum
synonyma: C. muricata subsp. savannarum, C. muricata var. savannarum

Coccothrinax saxicola

Coccothrinax scoparia

Coccothrinax spissa
synonyma: Pithodes spissa

oblasti: Hispaniola

Roste na Hispaniole v podobě palmy. Kmen má výšku 3 - 8m, průměr do 30cm a horní 1/2 je ztlustlá. Listy jsou prakticky kulaté, na spodní straně světlešedé, dlanitě dělené na úkrojky o délce do 40cm, šířce 3cm, rozeklané a pochvy jsou 2vrstvé. Květenství je převislé a má 3 - 4 větve. Plody jsou kulaté, růžovofialovočerné a v průměru mají 1,1 - 1,2cm.

Coccothrinax torrida

Coccothrinax trinitensis

Coccothrinax victorini

Coccothrinax yunquensis

Coccothrinax yuraguana
synonyma: Thrinax yuraguana

Další informace:
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=857

https://www.rostliny.net/