

Ficus cumingii

synonyma: Ficus ampelas var. linearis, Ficus angustissima, Ficus celtoides, Ficus chaii, F. var. angustissima, F. var. auriculifera, F. var. linearicaudata, F. var. terminalifolia, F. var. worcesteri, Ficus euphlebia, Ficus fallax, Ficus kusanoi, Ficus linearipseudopalma, Ficus multiramea, Ficus producta, Ficus somae, Ficus somai, Ficus terminalifolia, Ficus worcesteri

čeleď: Moraceae

oblasti: Filipíny, Indonésie, Nová Guinea, Tchaj-wan

Roste na Filipínách, Tchaj-wanu, Indonésii a Nové Guineji v podobě stálezeleného keře nebo malého stromu. Větve jsou bílé, světležlutě či hnědě ochlupené. Palisty jsou 3úhle kopinaté, dlouhé 1 - 2cm. Listy jsou eliptické až obkopinaté, dlouhé 8 - 19cm, široké 5 - 8cm, papíroví, zašpičatělé až hrotité, báze tupá až zkosená, okraj zubatý a řapíky dlouhé 1,5 - 3cm. Plody jsou samostatné nebo párovité, oranžovožluté až světlečervené, žlutobíle tečkované, obvejčité až téměř kulovité s průměrem 1 - 1,5cm a stopky jsou krátké.

<https://www.rostliny.net/>