

Cupressus bakeri (Cypřiš Bakerův)

synonyma: *Callitropsis bakeri*, *C. subsp. mathewsii*, *Cupressus macnabiana* var. *bakeri*

čeleď: Cupressaceae

oblasti: Kalifornie, Oregon, Z USA

Roste v USA v podobě stromu se široce sloupovitou korunou. Dorůstá výšky do 15 (i 30)m. Borka je hnědočervená, v mládí hladká, později vrstvená a v tenkých deskách se odlupuje. Větve jsou krátké, husté, křížmostojné a mají průměru 0,5 - 1,3mm. Listy jsou zelené, mírně ojíněné, kýlnaté, na spodní straně žláznaté. Samčí šištice jsou dlouhé 2 - 3mm, široké 2 - 2,5mm, samičí šištice jsou kulovité, dlouhé 1 - 2cm, stříbřité, mají 3 - 4 páry šupin (zpravidla pryskyřičných), semena jsou dlouhá 3 - 4mm, žlutohnědá až hnědá. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Florence Rosk' - výška 4,5m, šířka 1,8m

- subsp. *mathewsii* - Oregon; výška až 30m; terminální větvičky delší, bledě šedozelené; šišky bledě šedohnědé, bradavičnaté, průměru 1,5 - 2 (i 2,5)cm

Potřebuje teplo.

<https://www.rostliny.net/>