

## Thymelaea hirsuta (Vrabečnice chlupatá)

synonyma: *Daphne hirsuta*, *Lachnaea hirsuta*, *Passerina hirsuta*, *Passerina hirsuta* var. *vestita*, *Passerina metkan*, *Passerina metnan*, *Passerina polygalaefolia*, *Piptochlamys hirsuta*, *Stellera hirsuta*, *Tartonia ovatifolia*, *T. var. angustifolia*, *T. var. polygalaefolia*, *T. var. rotundifolia*, *T. var. vulgaris*

čeleď: Thymelaeaceae

oblasti: Andalusie, Itálie, Izrael, J Portugalsko, JV Evropa, Katalánsko

Roste ve středozeří a Portugalsku. Patří mezi stálezelené bohatě větvené keře. Dorůstá výšky (0,4 -) 0,5 - 1 (i 1,5)m. Kořeny jsou bohatě větvené a sahají do hloubky až 3,5m. Povrch je šedozelený. Větve jsou v mládí ochlupené a bývají na konci převislé. Listy jsou střídavé, tmavězelené, zdužnatělé, lesklé, kožovité, šupinovitě překrývající se, 3úhlé až vejčité, dlouhé (2,5 -) 0,3 - 0,8 (i 1,1)cm a spodní strana je bíle ochlupená. Kvete ve 2 - 5 (i 10)ti četném květenství, vlastní květy jsou oboupohlavné i jednopohlavné, žluté, dlouhé 4 - 5mm a kališní lístky jsou dlouhé 1 - 1,5mm. Plodem je nažka délky 3 - 4mm.

Vyhovují ji písčité a kamenité oblasti, pouště, svahy, pobřeží, atp.

Množí se semeny nebo řízky.

<https://www.rostliny.net/>