

Aloe (Aloe)

čeleď: Liliaceae

Pochází z Afriky, Madagaskaru a Arabského poloostrova. Patří mezi stálezelené trvalky, keře nebo až stromy či dokonce šplhavé liány. Listy jsou sukulentní, obvykle dlouze 3úhlé, špičaté, dužnaté a trnité. Květenství je stopkaté, postranní nebo terminální, hroznovité nebo klasnaté, květní obal trubkovitý nebo válcovitý, tyčinek 6 a semeníky jsou podlouhlé nebo vejčité, přisedlé, 3pouzdré. Plodem je kožovitá vejčitá nebo podlouhlá tobolka s mnoha někdy i křídlatými semeny. Jednotlivé druhy bývají často zaměňovány s americkou Agave. A. má však dužnaté listy a dokáže kvést mnoho sezón po sobě. Slovo Aloe bylo odvozeno z hebrejštiny ze slova halal - hořký. A skutečně, pokud je A. poraněná, teče z ní hořká šťáva. Používá se pro léčebné účinky, zejména druh A. vera - uřízneme list a přiložíme ho na postižené místo. Necháme účinkovat pouze omezenou dobu a poté jej odstraníme. List ořezáváme postupně, aby jsme rostlinu brzy nezlikvidovali celou. Pozor, léčebné účinky se projevují pouze u alespoň 3 roky starých rostlin. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Pink Blush'

Není náročná na pěstování. Potřebuje jen občasnou zálivku, výborně snáší suchý vzduch, pohlcuje škodliviny z ovzduší. Dále má ráda lehkou propustnou půdu a hodně světla. Škodí ji nízké teploty a příliš hodně vody. Má ráda dobře osvětlené místo, ne však přímé sluneční paprsky. Zalévejte až v okamžiku, kdy je substrát proschlý. Ideální je teplota kolem 25°C. V zimě ji uchovávejte na chladnějším místě (15 - 18°C). Přesazujeme každé 2 - 3 roky a občas přihnojujeme nejlépe fosforečným hnojivem.

Množí se řízkem nebo semeny. Odříznutý list nechejte 2 dny zaschnout, můžete pro dezinfekci potřít dřevěným uhlím a poté zasadte do vyvážené směsi kompostu a písku.

Aloe aageodonta

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe abyssicola

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe abyssinica

Aloe aculeata

oblasti: Limpopo, Mosambik, Zimbabwe

Roste v Zimbabwe, Mosambiku a JAR. Listy jsou dlouhé 30 - 60cm. Kvete oranžovými až žlutými květy o délce 2,3 - 4cm.

Aloe acutissima

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe adigratana

synonyma: A. eru var. hookeri

Aloe affinis

synonyma: A. immaculata

oblasti: Gauteng, Limpopo, Mpumalanga

Roste v JAR. Vytváří 16 - 20 listů délky 20cm a šířky 5 - 10cm.

Aloe africana

synonyma: A. africana var. angustior, A. africana var. latifolia, A. angustifolia, A. bolusii, A. perfoliata var. africana, A. pseudoafricana, Pachidendron africanum, Pachidendron angustifolium

oblasti: Východní Kapsko

Roste v JAR. Dorůstá výšky až 4m. Stonek je nevětvený, je hustě pokrytý suchými listy. Listy jsou rozkladité, na vrcholu téměř vodorovné, matné, zelené, okraj zubatý, načervenalý a z horní strany ostnitý. Kvete ve věku 4 - 5 let v hroznu o délce 40 - 60cm, může mít až 4 větve, poupata jsou matná, červená, vlastní květy pak trubkovité a žlutooranžové.

Aloe ahmarenensis

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe albida

synonyma: A. kraussii var. minor, A. myriacantha var. minor, Leptaloe albida

oblasti: Mpumalanga, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku. Listy vytvářejí růžici, jsou voskovité a světle šedomodrozelené.

Aloe albiflora

synonyma: Guillauminia albiflora

oblasti: J Madagaskar

Roste na Madagaskaru v trsech z cca 10ti listů. Listy jsou úzce kopinaté, drobně zubaté, drobně zeleně bradavičnaté, bíle tečkované, dlouhé 15cm a široké do 1,5cm. Květenstvím je cca 18tikvětý hrozen na 30 - 35cm stonku, vlastní květy jsou zvonkovité, bílé, naoranžovělé nebo růžové, dlouhé 1cm, široké 1,4cm a mají dlouhé tyčinky. Často odnožuje.

Vyhovuje ji polostín. Zimuje při 12°C se zanedbatelnou zálivkou.

Množí se semeny nebo odnožemi.

Aloe albostriata

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe albovestita

oblasti: Džibútí, Somálsko

Roste od Džibútí po Somálsko.

Aloe aldabrensis

synonyma: Lomatophyllum aldabrense

Roste na ostrově Aldabra v Indickém oceánu v pobřežních křovinách. Listy jsou zelené s červenými nebo oranžovými tečkami. Květenství je bohatě větvené, hroznovité a vlastní květy jsou červenooranžové.

Aloe alexandrei

oblasti: V Afrika

Roste na Komorských ostrovech.

Aloe alfredii

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe allavena

Aloe alooides

synonyma: A. recurvifolia, Notosceptrum alooides, Urginea alooides

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR. Dorůstá výšky 1 - 1,8 (i 2)m. Stonek je nevětvený, z 1/2 pokrytý suchými listy a zakončený listovou růžicí. Listy jsou dlouhé, úzké, zakřivené k zemi, špičky se dotýkají kmene, zelené, na okraji načervenalé. Kvete v klasech či hroznech po 3 - 5ti v růžici, mají délku do 0,8 - 1 (i 1,2)m, jsou 2barevné, poupata zelená a vlastní květy pak žluté, žlutozelené a pohárkovité nebo trubkovité.

Aloe altimatsiatrae

Aloe ambigens

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe ambositrae

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe ambrensis

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe amicum

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe ammophilis

Aloe ampefyana

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe amudatensis

oblasti: Burundi, Keňa

Roste od Burundi po Keňu.

Aloe andongensis

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe andringitrensis

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe angelica

oblasti: Limpopo

Roste v jižní Africe. Dorůstá výšky 3 - 4m. Stonek bývá jednoduchý, obvykle na extrémních místech větvený, v horní 1/2 pokrytý suchými listy. Listy na vrcholu vyrůstají vodorovně, spodní jsou zakřivené k zemi, jsou zelené, načervenalé až nahnědlé, na okraji jsou silné červenavé hladké zuby bez ostnů. Květenstvím je hlávka z krátkých klasů, téměř kulovité, dlouhé i široké 8 - 10cm, dvoubarevné, poupata červená, vlastní květy žluté a trubkovité.

Aloe anivoranoensis

synonyma: A. zakamisyi, Lomatophyllum anivoranoense

oblasti: SV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe ankaranensis

oblasti: SZ Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe ankoberensis

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe antandroi

synonyma: *A. leptocaulon*, *Gasteria antandroi*

oblasti: J Madagaskar, JZ Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe antoetrana

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe antonii

Aloe antsingyensis

synonyma: *Lomatophyllum antsingyense*

oblasti: Z Madagaskar

Aloe arborescens (Aloe stromovitá)

synonyma: *A. arborea*, *A. arborescens* var. *frutescens*, *A. arborescens* var. *milleri*, *A. arborescens* var. *natalensis*, *A. arborescens* var. *pachystyrsa*, *A. arborescens* var. *viridifolia*, *A. frutescens*, *A. fruticosa*, *A. fulgens*, *A. natalensis*, *A. perfoliata* var. *arborescens*, *A. perfoliatum*, *A. principis*, *A. salm-dyckiana*, *A. salm-dyckiana* var. *fulgens*, *A. sigmoidea*, *Catevala arborescens*, *Pachidendron principis*

oblasti: Andalusie, Austrálie, J Korea, Japonsko, Jihoafrická Republika (JAR), Katalánsko, Makaronésie, Malawi, Marshallovy ostrovy, Mosambik, Portugalsko, Střední střeozemí, Tichý oceán, Zimbabwe

Roste od JAR po Malawi, Mosambik a Zimbabwe v podobě rozvětveného keře nebo malého stromu a zavlečená byla i jinde. Dorůstá výšky 0,6 - 3 (i 5)m. Stonek je dřevnatějící, od báze štíhle větvené a vytváří velké množství růžic. Listy vyrůstají v růžicích na koncích větví, jsou tuhé, křehké, krátce trnitě zubaté (i bělavé), zelené až modrozelené či šedozelené, dlouhé 50 - 60cm, na bázi široké 5cm. Květenství má 60 (i 90)cm výšku z kuželovitého hrozu, vlastní květy jsou červené až růžovooranžové, později žluté, velikosti 4 - 5cm. Má léčivé účinky, ne ale tak velké jako *A. vera*. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Compont'
- subsp. *mzimnyi*
- 'Pearson'
- 'Spineless' - namodralé listy s hladkým okrajem
- 'Variegata' - modrozelené zubaté listy s béžovými proužky

Potřebuje dostatek světla (ne přímé polední), teplo, čerstvý vzduch a suchý dobře propustný hlinitopísčitý substrát. Zimuje při teplotách 10 - 15°C. Zaléváme až po proschnutí substrátu, zato vydatně. Stačí i 1x měsíčně. Přesazuje se cca 1x za 3 roky. Kupodivu ji lze pěstovat i hydroponicky.

Množí se vrcholovými řízků nebo odnožemi.

Aloe archeri

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe arenicola

oblasti: Namaqualand, Západní Kapsko

Roste v jižní Africe. Kmínky mají výšky do 0,7 (i 1)m, jsou štíhlé, mohou být větvené, poléhavé až téměř vzpřímené. Listy jsou protažené, kopinaté, tmavě zelené, namodralé, bíle tečkované, bíle jemně pilovité, dlouhé do 18cm a široké do 6cm. Květenství je dlouhé do 50cm, tvoří jej někdy až 2 větve, květy jsou červené, dlouhé do 4cm a jícen je světlejší.

Aloe argenticauda

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Aloe argyrostachys

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe aristata

synonyma: A. aristata var. leiophylla, A. aristata var. parvifolia, A. ellenbergeri, A. longiaristata

oblasti: Free State, Kapsko, KwaZulu-Natal, Lesotho

Roste v JAR a Lesothu v trsech z až 12ti listových růžic o šířce do 15 (i 30)cm a výšce 10cm. Listy jsou úzce 3úhlé, tmavězelené, zubaté, bíle bradavičnaté, na bázi široké 2 - 3cm a na vrcholcích tvoří krátká vlákna. Květenstvím je 20 - 30tikvětý hrozen na 70cm stonku, vlastní květy jsou červenorůžové až červenooranžové, dlouze úzce trubkovité.

Množí se semeny nebo odnožemi.

Aloe armatissima

oblasti: Saudská Arábie

Pochází ze Saudské Arábie.

Aloe asperifolia

oblasti: Namibie

Pochází z nejsušších oblastí Namibie. Stonek je poléhavý. Šedozelené listy růžice jsou dlouhé 25cm a jsou tvořené z hrubých listů a hnědých trnů na krajích. U kořene jsou široké 4 - 7cm. Kvete na 50cm stonku červenooranžovými květy. Celkově je velmi dekorativní.

Roste na velmi suchých lokalitách.

Množí se semeny.

Aloe aufensis

oblasti: Saudská Arábie

Roste v Saudské Arábii.

Aloe aurelienii

oblasti: V Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe austroarabica

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově.

Aloe babatiensis

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii. Stonek je vzpřímený až poléhavý a dlouhý až 2m. Listy jsou zelené a pilovité. Květenství má až 4 větve, vlastní květy jsou trubkovité, červené až růžové a dlouhé 3,5 - 4cm.

Aloe bainesii

synonyma: A. barberae, A. barberiae

oblasti: Afrika

Pochází z Afriky. Roste v podobě stromu s okrouhlou korunou. Dorůstá výšky 10 - 18m a stává se tím největším druhem svého rodu. Větvě jsou vidličnaté. Borka je šedohnědá a drsná. Listy jsou

dlouhé do 90cm, široké do 9cm, obloukovité, matné, tmavězelené se světlejším okrajem s bílými hnědě zakončenými zuby. Květenství je vzpřímené, větvené, dlouhé 20 - 30cm, široké 0,8 - 10cm, vlastní květy jsou růžové až oranžové, dlouhé do 4cm a poupata mají zelené špičky.

Aloe bakeri

synonyma: *Guillauminia bakeri*

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru v hustých porostech. Dorůstá výšky 10 - 20cm a šířky 40cm. Listy jsou tmavě hnědozelené až červenohnědooranžové, zpravidla světle skvrnité, bíle zubaté a zahnuté k zemi a dlouhé 10cm. Květenstvím je 30cm dlouhý hrozen, vlastní květy jsou oranžové, trubkovité a dlouhé 2cm.

Přezimuje při min. 10°C.

Aloe ballii

oblasti: Mosambik, Zimbabwe

Roste v Mosambiku a Zimbabwe.

Aloe ballyi

oblasti: Keňa, Tanzánie

Roste v Keni a Tanzánii. Kmen má výšku 5 - 8m. Listy jsou šedozelené, zuby dlouhé 4 - 5mm v rozteči 1 - 1,5cm, dlouhé do 90cm, široké 14cm. Kvete oranžovočervenými 28 - 33cm dlouhými květy se zelenými špičkami v až 60cm dlouhých latách.

Aloe barberae

synonyma: *A. bainesii*, *A. bainesii* var. *barberae*, *A. zeyheri*

Aloe barberiae

Aloe bargalensis

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe beankaensis

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe belavenokensis

synonyma: Lomatophyllum belavenokense

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe bella

synonyma: A. pulchra

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe bellatula

synonyma: Guillauminia bellatula

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru v trsech z cca 16ti listů. Listy vytvářejí odnožující růžice, jsou tenké, mečovité až kopinaté, mírně zoubkované, bíle čárkovaně kropenaté, žlábkované, světlezelené, dlouhé (10 -) 13 - 15 (i 20)cm a na bázi max. 1cm. Květenství má výšku až 60cm, může být i větvené, vlastní květy jsou zvonkovité, červené až růžovočervené a dlouhé 1,2cm.

Přezimuje za teploty 10°C.

Množí se semeny.

Aloe benishangulana

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe berevoana

oblasti: Z Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe bernadettae

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe bernardii

Aloe bertemariae

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe betsileensis

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe bicomitum

synonyma: A. venusta

oblasti: Tanzánie, Zambie

Roste v Tanzánii a Zambii.

Aloe boiteau

synonyma: Lemeea boiteau

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe boscawenii

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe bosseri

oblasti: Z Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe bowiea

synonyma: A. bourea, Bowiea africana, Chamaealoe africana

oblasti: Kapsko

Roste v JAR. Svým vzhledem a kropenatostí připomíná druhy rodu *Haworthia*. Kvete po 2 - 3 letech. Na přímém slunci červenají. Květy jsou zelenavé a vyrůstají na pouze 25cm vysokém stvolu.

Zálivka by měla být po celý rok malá, v zimě téměř žádná. Zazimujte ji při teplotách 10 - 14°C.

Aloe boylei

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Aloe brachystachys

synonyma: *A. lastii*, *A. schliebenii*

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe branddraaiensis

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe brandhamii

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe brevifolia

synonyma: *A. brevifolia* var. *postgenita*, *A. brevioribus*, *A. perfoliata* var. *depressa*, *A. postgenita*, *A. prolifera*, *A. prolifera* var. *major*

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR. Dorůstá výšky 10cm. Vytváří listové růžice o průměru 8 (i 30)cm. Listy jsou modrozelené, našedlé, dužnaté, jemně bíle zubaté, 3úhlé a na spodní straně může být několik zubů. Květenství má 45 - 60cm stonek, vlastní květy jsou zvonkovité, červené (i žluté) a na bázi zelené. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *depressa* - růžice o průměru až 30cm; listy dlouhé 12cm a široké 6cm
- var. *postgenita* - růžice o průměru cca 15cm

Aloe breviscapa

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe broomii

oblasti: Free State, Lesotho, Severní Kapsko, Východní Kapsko

Roste v JAR a Lesothu. Růžice dosahuje v průměru velikosti 40 - 50cm. Listy mají odstíny zelené až červozelené, na okraji i spodní straně červeně ostnitě. Květenství má výšku do 1,5m, vlastní květy jsou žlutozelené a dlouhé 1,5cm.

Aloe brunneodentata

oblasti: Saudská Arábie

Roste v Saudské Arábii.

Aloe brunneostriata

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe bruynsii

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe buchananii

oblasti: Malawi

Roste na Malawi.

Aloe buchlohii

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe buettneri

synonyma: A. agavifolia, A. barteri, A. congolensis, A. paedogona, A. paludicola

oblasti: Čad, Malawi, Namibie, Nigérie, Senegal, Togo, Zambie

Roste od Čadu po Namibii. Listy vytvářejí růžici, jsou zubaté, dlouhé 40 - 80cm a široké 8 - 9cm. Květenstvím je lata, vlastní květy jsou trubkovité, světle žluté, na vrcholcích a cípech zelené.

Aloe buhrii

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR. Listy jsou jazykovité nebo 3úhlé, načervenalé a dlouhé až 40cm. Květenství tvoř svazky oranžových až červených zvonkovitých květů se zelenými špičkami. Plody jsou hnědé.

Aloe bukobana

oblasti: Burundi, Tanzánie, Uganda

Roste v Ugandě, Burundi a Tanzánii.

Aloe bulbicaulis

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii a tropické Africe.

Aloe bulbilifera

Aloe bulbillifera

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe bullockii

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe burgersfortensis

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe bussei

synonyma: A. morogoroensis

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe butiabana

oblasti: Uganda

Roste v Ugandě.

Aloe calcairophila

synonyma: Guillauminia calcairophila, Guillauminia calcairophylla

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru v kobercových porostech. Růžice bohatě odnožují. Stonek má délku 5cm a je pokrytý starými listy. Listy vyrůstají 2řadě po max. 10ti ks, jsou šedé až červenozelené, bíle zubaté a dlouhé do 8cm. Květenství je 10tikvěté, má výšku do 25cm a vlastní květy jsou bílé.

Vyhovuje ji vápencový substrát.

Aloe calidophila

oblasti: Etiopie, Keňa

Roste v Etiopii a Keni.

Aloe cameronii

oblasti: Malawi, Zimbabwe

Roste v Malawi a Zimbabwe.

Aloe camperi

synonyma: A. albopicta, A. eru, A. eru var. cornuta

oblasti: Eritrea, Etiopie

Roste v Etiopii a Eritrei. Kvete oranžovými květy.

Aloe canarina

oblasti: Jižní Súdán, Uganda

Roste od Jižním Súdánu po Ugandu.

Aloe canii

Aloe canis

oblasti: Malawi

Roste v Malawi.

Aloe cannellii

oblasti: Mosambik

Roste v Mosambiku.

Aloe capitata

synonyma: A. cernua

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Stonek je max. zakrslý. Listy jsou vystoupavé, modrozelené až hnědozelené, na slunci červenají, lesklé, červeně trnité, dlouhé až 50cm při 6cm šířce u kořene. Květenství je hlávkovité, výšky až 70cm, vlastní květy jsou žlutooranžové a rozkvétají shora dolů. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. gneissicola - listy menší, na okraji bílé; květy žluté
- var. quartziticola - listy šedomodré, červeně zubaté, dlouhé do 30cm, široké 10cm; květy žluté
- var. silvicola - listy úzké, krátce zubaté

Aloe capmanambatoensis

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe carnea

oblasti: Mosambik, Zimbabwe

Roste v Zimbabwe a Mosambiku.

Aloe carolineae

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe castanea

oblasti: Gauteng, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku ve stromovitém, obvykle od báze větveném habitu. Dorůstá výšky 3 - 4m. Listy jsou modrozelené, seskupené do husté růžice, dlouhé do 1m, na okraji načervenalé zubaté. Kvete v nevětvených klasech o délce až 1m seskupených až po 5ks v růžici, vlastní květy jsou pohárkovité až zvonkovité, červenohnědé, dlouhé do 2cm.

Aloe castellorum

synonyma: A. hijazensis

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově.

Aloe castilloniae

oblasti: J Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe cataractarum

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe catengiana

oblasti: Angola, Namibie

Roste v Angole a Namibii.

Aloe chabaudii

synonyma: A. chabaudii var. verekeri

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Tanzánie

Roste od Tanzánie po JAR.

Aloe challisii

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe charlotteae

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe cheranganiensis

oblasti: Keňa, Uganda

Roste od Ugandy po Keňu. Dorůstá výšky až 2m. Listy jsou dlouhé do 40cm, při bázi široké do 5cm, modrozelené a tečkované. Kvete oranžovými převislými 3cm květy se žlutým jícnem v bohatě větvených latách o délce až 60cm. Plody nejsou známy.

Aloe chlorantha

oblasti: Severní Kapsko

Roste v JAR.

Aloe chortolirioides

oblasti: Limpopo, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku.

Aloe christianii

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Tanzánie

Roste od Tanzánie po JAR.

Aloe chrysostachys

synonyma: A. meruana

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe ciliaris

synonyma: A. ciliaris var. flanaganii

oblasti: Východní Kapsko

Roste v JAR v podobě polodřevité liány, která může dosáhnout výšky až 4,5m s celkovou délkou až 6m. Stonek je od báze větvený. Listy jsou umístěné zejména na koncích stonků, jsou krátké, 3úhlé, na okrajích drobně zubaté, tmavězelené, řídce zoubkované a na pochvě bíle trnité. Květenstvím je hrozen, vlastní květy jsou červenooranžové až červené, úzce trubkovité se žlutým vrcholem.

Množí se řízký.

Aloe cipolinicola

synonyma: A. capitata var. cipolinicola

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe citrea

synonyma: Lomatophyllum citreum

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe citrina

oblasti: Etiopie, Keňa

Roste v Etiopii a Keni.

Aloe clarkei

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe classenii

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe claviflora

synonyma: A. decora, A. schlechteri

oblasti: Kapsko

Roste v JAR. Dorůstá šířky 1 - 2m. Listy vytvářejí až 30 - 40tičetnou růžici, jsou modrozelené, kopinaté a trnité. Dorůstá na až 45cm dlouhém stonku červenooranžovými trubkovitými květy.

Aloe collenetteae

oblasti: Omán

Roste v Ománu.

Aloe collina

oblasti: Zimbabwe

Roste v Zimbabwe.

Aloe commixta

Aloe comosa

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě stromu. Kmínky jsou nevětvené, dlouhé do 2 (i 3)m. Listy vyrůstají na koncích větvích v růžicích, jsou kopinatě mečovité, namodralé (někdy nahnědlé nebo narůžovělé), na okraji narůžovělé s červenohnědými zuby, dlouhé do 65cm a široké do 12cm. Květenství bývá nevětvené, dlouhé do 2,5m, poupata růžová až béžová a velká 2,5cm.

Aloe compressa

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Vytváří krátký kmínek. Listy vyrůstají ve 2 řadách, jsou modrozelené, zubaté a dlouhé 12 - 15cm. Květenství je až 60tikvěté, dlouhé až 70cm a vlastní květy jsou bílé. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. schistophila - listy dlouhé do 25cm a široké 2,5cm

Vyhovuje mu křemenitý substrát.

Aloe comptonii

synonyma: A. mitriformis subsp. comptonii

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Aloe concinna

Aloe confusa

oblasti: Keňa, Tanzánie

Roste od Keni po Tanzánii.

Aloe congdonii

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe congolensis

Aloe congorens

Aloe conifera

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe contigua

Aloe cooperi

synonyma: A. schmidtiana

oblasti: KwaZulu-Natal, Mosambik, Mpumalanga, Svazijsko

Roste v JAR, Mosambiku a Svazijsku.

Aloe corallina

oblasti: Angola, Namibie

Roste v Angole a Namibii.

Aloe craibii

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe crassipes

oblasti: Jižní Súdán

Roste v Jižním Súdánu.

Aloe cremnophila

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe cryptoflora

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe cryptopoda

synonyma: A. wickensii, A. wickensii var. lutea, A. wickensii var. wickensii

oblasti: Botswana, Tanzánie

Roste od Tanzánie po Botswanu. Vytváří listové růžice, vlastní listy jsou kopinaté, zubaté, narůžovělé a dlouhé 1m. Květenství tvoří červené trubkovité květy.

Aloe cyrillei

Aloe cyrtophylla

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe dabenorisana

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Aloe darainensis

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe davyana

Aloe dawei

synonyma: A. beniensis, A. pole-evansii

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Keňa

Roste v Demokratické Republice Kongo a Keni. Dorůstá výšky 1 - 4m. Listy jsou zelené, někdy načervenalé, dlouhé 40 - 60cm, obvykle bez teček, na okraji má 3 - 4mm zuby v rozteči 1 - 1,5cm. Kvete červenými nebo oranžovočervenými obvykle bíle tečkovanými 3 - 3,5cm květy v latách o délce 60 - 90cm. Plody mají délku 1,2cm a šířku 7mm.

Aloe debrana

synonyma: A. berhana

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe decaryi

oblasti: Madagaskar

Pochází z Madagaskaru. Úzké listy vyrůstají z centrálního kmínku, dorůstajícího výšky až 1m. Má červené květy vyrůstající na 35cm stvolu. Na krajích mají trnité výrůstky.

Aloe decorsei

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe decumbens

synonyma: A. gracilis var. decumbens

Aloe decurva

oblasti: Mosambik

Roste v Mosambiku.

Aloe deinacantha

oblasti: Z Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe delaetii

Aloe delphinensis

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe deltoideodonta

synonyma: A. rossii

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. brevifolia
- var. candicans
- var. intermedia
- var. ruffingiana

Aloe descoingsii

synonyma: Guillauminia descoingsii

oblasti: J Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Dorůstá průměru do 7,6cm. Listy jsou směrem dovnitř drobně zubaté, modrozelené, bíle klopenaté, dlouhé do 3cm a široké 1,5cm. Květenstvím je 10tikvětý hrozen výšky do 25cm, vlastní květy jsou červenooranžové, baňkovité a dlouhé 7 - 8mm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. augustina

Vyhovuje ji vápenitý substrát. Zimním minimem je 15°C.

Často odnožuje a tím se i jednoduše množí.

Aloe deserti

oblasti: Keňa, Tanzánie

Roste v Keni a Tanzánii.

Aloe dewetii

oblasti: KwaZulu-Natal, Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe dewinteri

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Aloe dhufarensis

oblasti: Jemen, Omán

Roste v Jemenu a Ománu.

Aloe dichotoma (Aloe rozsochatá)

synonyma: A. dichotoma var. montana, A. montana, A. ramosa, Rhipidodendrum dichotomum

oblasti: Kapsko, Namibie

Roste v Namibii a JAR v podobě stromu s půlkulatou korunou. Dorůstá výšky až 7 (i 10)m. Borka je hladká, bílostříbřitěšedá až nažloutlá a odlupuje se. Kmen je na bázi ztlustlý, široký až 1m. Na konci kmene se vidličnatě větví a na konci větví vyrůstají samotné růžice o šířce až 1m. Listy jsou úzce kopinaté, modrozelené nebo žlutozelené až nahnědlé s úzkým žlutohnědým okrajem, jemnými žlutohnědými zuby (později mizí), dlouhé do 35cm a široké do 5cm. Květenství je větvené, má až 60cm stopku, klasy jsou dlouhé 30cm a vlastní květy jsou žluté. Plodem je tobolka obsahující zploštělá hnědošedá semena. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. ramosissima/A. ramosissima

<div>V létě vyžaduje bohatou zálivku, která se na zimu výrazně omezí. Zimuje při teplotě min. 10°C.</div>

Aloe dinteri

Aloe diolii

oblasti: Jižní Súdán

Roste v Jižním Súdánu.

Aloe distans

synonyma: A. mitriformis subsp. distans

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR. Stonek je větvený, poléhavý a dorůstá výšky až 2m. Listy jsou modrozelené, na slunci červené a drobně bíle pilovité. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. mitriformis - od Nieuwoudtville po Montagu
 - subsp. comptonii - od Montagu po Uitenhage; více kompaktní, listy protáhlé, modrozelené
 - subsp. distans - okolí Saldanha; menší, rychleji rostoucí skvrnitě zelené listy
- <div>Vyhovují ji skalnatá místa.</div>

Aloe divaricata

synonyma: A. saundra, A. vahontsohy, A. vaotsohy

oblasti: J Madagaskar

Roste na Madagaskaru v podobě stromu až keře. Dosahuje výšky 2 (i 3)m. Na kmínku zůstávají staré zaschlé listy. Listy vytvářejí 30tičetnou růžici, jsou mečovité, matné, šedozelené až tmavězelené, načervenalé, na okraji červené až hnědočervené, s ostrými červenohnědými zuby délky 6mm, dlouhé do 60 (i 65)cm a na bázi široké 7cm. Květenství je bohatě větvené, dlouhé do 1m, vlastní květy jsou dlouhé 3cm a červené. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. rosea - květy růžové
- <div>Množí se semeny.</div>

Aloe djiboutiensis

oblasti: Džibútí, Eritrea

Roste od Eritrei po Džibútí.

Aloe doddsiorum

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe dolomitica

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe. Dorůstá výšky do 2,5m. Kmen je nevětvený, pokrytý suchými listy. Listy jsou zakřivené vzhůru až dovnitř, tlusté, tmavězelené s červenohnědým okrajem. Kvete po několika ks v klasech v růžici, vlastní květy jsou pohárkovité, žluté nebo žlutozelené.

Aloe dominella

oblasti: KwaZulu-Natal, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku.

Aloe dorotheae

synonyma: A. harmsii

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii. Listy jsou zelené, konce při stresu červené, špičaté a pilovité.

Aloe downsiana

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe droseroides

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe duckeri

oblasti: Tanzánie, Zambie

Roste v Tanzánii a Zambii.

Aloe dyeri

oblasti: Mpumalanga, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku.

Aloe ecklonis

synonyma: A. agrophila, A. boylei, A. boylei subsp. major, A. hlangapies, A. kraussii

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe.

Aloe edouardii

synonyma: A. fianarantsoae

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe elata

oblasti: Keňa, Tanzánie

Roste v od Keni po Tanzánii. Dorůstá výšky 5 - 10m. Listy jsou dlouhé 50 - 80cm, modrozelené, netečkové, na okraji má 4mm zuby v rozteči 1 - 1,2cm. Květenstvím je až 60cm dlouhá lata, vlastní květy jsou lesklé oranžovočervené, později až žluté, dlouhé 3,5cm. Plody jsou lesklé, černé a dlouhé 3cm.

Aloe elegans

synonyma: A. abyssinica var. peacockii, A. aethiopica, A. peacockii, A. vera var. aethiopica

oblasti: Eritrea, Etiopie, Súdán

Roste v Súdánu, Eritrei a Etiopii.

Aloe elegantissima

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe elgonica (Aloe elgonská)

oblasti: Keňa

Roste na úpatí sopky Mt. Elgon v Keni.

Aloe elkerriana

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe ellenbeckii

synonyma: A. dumetorum

oblasti: Etiopie, Keňa

Roste od Etiopie po Keňu.

Aloe eminens

Aloe eremophila

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe erensii

oblasti: Jižní Súdán, Keňa

Roste v Jižním Súdánu a Keni.

Aloe ericahenriettae

oblasti: Džibútí

Roste v Džibútí.

Aloe ericetorum

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe erinacea (Aloe ježatá)

synonyma: A. melanacantha var. erinacea

oblasti: Namibie

Roste v Namibii. Zdužnatělé zelené listy jsou dlouhé 15 - 20cm, po stranách jsou pokryty 2mi řadami barevných trnů, které však jsou měkké a nepíchají. Kvete na 1m vysokém stvolu červenými květy.

V zimě mírně zaléváme.

Roste na skalnatých místech v poušti Namib.

Aloe erythrophylla

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Listy jsou v mládí zelené, později zejména na slunci červené až hnědočervené, na okrajích drobně červeně zubaté, dlouhé 10 - 17cm a široké 2 - 4cm. Květenství může být na bázi větvené, 20tkvěté, dlouhé do 20cm, vlastní květy jsou tmavě červené s bílozeleným pruhem.

Vyhovuje ji křemenitý dobře propustný substrát a nízkou zálivku.

Aloe esculenta

oblasti: Namibie, Zambie

Roste od Zambie po Namibii.

Aloe estevei

Aloe eumassawana

oblasti: Džibútí, Eritrea

Roste od Eritrei po Džibútí.

Aloe excelsa

oblasti: Limpopo, Malawi, Mosambik, Zambie, Zimbabwe

Roste v JAR, Zimbabwe, Malawi, Mosambiku a Zambii v podobě stromu. Dorůstá výšky 5 - 6 (i 9)m. Kmeny jsou nevětvené, pokryté starými listy. Listy jsou v růžici, v mládí trnité, tmavězelené, zuby jsou červenohnědé, dlouhé do 0,8 (i 1)m, široké do 15cm, ve středu tlusté až 3cm a na spodní straně bývají hrbolaté. Květenství je bohatě větvené, má až 1m stopku, vlastní květy jsou trubkovité, oranžové až červené, dlouhé do 3cm.

Aloe excelsia

Aloe eximia

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe falcata

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Aloe ferox

synonyma: A. candelabrum, A. ferox var. galpinii, A. ferox var. incurva, A. ferox var. subferox, A. galpinii, A. horrida, A. muricata, A. pallancae, A. perfoliata var. ferox, A. pseudoferox, A. subferox, A. supralaevis, A. supralaevis var. erythrocarpa, Busipho ferox, Pachidendron ferox, Pachidendron pseudoferox, Pachidendron supralaeve

oblasti: Kapsko, Katalánsko, KwaZulu-Natal, Lesotho

Roste v JAR a Lesothu. Dorůstá výšky 2 - 3,5 (i 5)m díky nevětvenému kmeni pokrytému na vrcholu odumřelými listy. Listy jsou v růžici, šedozelené až namodralé, dlouhé až 1m, široké do 15cm, v mládí a s tmavými trny (v dospělosti jsou pouze na okraji). Kvete v až 12ti vzpřímených jednobarevných klasech o délce 0,5 - 0,8 (i 1)m, vlastní květy jsou červené až oranžovočervené (vzácně i bílé či narůžovělé), na špičce hnědé nebo bílé. Plodem je tobolka se 3mi semeny.

Teplota by neměla klesnout pod 5°C. Doba klíčení semen se pohybuje mezi 3 - 4 týdny.

Aloe fianarantsoae

Aloe fibrosa

oblasti: Keňa, Tanzánie

Roste v Keni až Tanzánii. Dorůstá výšky až 2,5m. Listy jsou zelené nebo nahnědlé, někdy na horní straně tečkované, obvykle na spodní, dlouhé 30cm, široké 4 - 5cm, na okraji jsou 3 - 4mm zuby v rozteči 1,5 - 1,7cm. Kvete oranžovočervenými 3,3cm dlouhými květy se žlutým okrajem v hroznech.

Aloe fievetii

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe fimbrialis

oblasti: Zambie

Roste v Zambii.

Aloe fleurentinorum

synonyma: A. edentata

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově.

Aloe fleuretteana

oblasti: J Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe flexilifolia

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii v podobě keře. Dorůstá výšky do 1 (i 2)m. Stonek je od báze větvený. Listy jsou kopinaté, špičaté, opatřené zuby délky 1 - 2mm, dlouhé 50cm a široké 7cm. Kvete trubkovitými hnědočervenými (i žlutými) květy na 1,2 - 1,8cm stopce, mají délku do 3,5mm a šířku 8mm.

Aloe florenceae

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe forbesii

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře.

Aloe fosteri

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe fouriei

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe fragilis

oblasti: SV Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Listy vytvářejí růžici o průměru do 10cm, jsou úzce 3úhlé, tmavězelené, bíle tečkované, zubaté, dlouhé 3 - 5cm a široké 2cm. Květenství má výšku 10 - 15cm, vzácně se větví, vlastní květy jsou červené, na vrcholu prakticky bílé a dlouhé 2cm.

Vyhovuje ji žulový substrát.

Aloe francombei

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe friisii

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe fulleri

synonyma: A. rigens var. mortimeri

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe gariepensis

synonyma: A. gariusana

oblasti: Kapsko, Namibie

Roste v JAR a Namibii. Listy jsou zubaté, s věkem červenající, dlouhé 30 - 40cm a u báze široké 5 - 8cm. Při dostatku přímého intenzivního světla a malé zálivce se listy barví do hnědočervena. Mladé rostliny mají bílé tečkování. Květenstvím je hustý hrozen na 1,2m stonku, vlastní květy jsou žluté a trubkovité.

Aloe gautieri

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe gerstneri

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR.

Aloe ghibensis

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe gilbertii

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe gillettii

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe glabrescens

synonyma: A. rigens var. glabrescens

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe glauca

synonyma: A. glauca var. elatior, A. glauca var. humilior, A. glauca var. major, A. glauca var. minor, A. glauca var. muricata, A. glauca var. spinosior, A. perfoliata var. glauca, A. rhodacantha

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR na krátkém kmínku. Listy vytvářejí růžici, jsou šedomodré, s červenohnědými zuby, s podélnou žilnatinou a délkou do 40cm. Květenství bývá nevětvené, hrozny kuželovité a vlastní květy jsou růžové až světle oranžové.

Potřebuje dobře propustnou půdu.

Aloe globuligemma

oblasti: Botswana, Mpumalanga, Zimbabwe

Roste v Botswaně, JAR a Zimbabwe. Dorůstá výšky do 50cm. Listy vyrůstají v cca 20tičetné růžici, mají světlehnědé zuby délky 2mm v intervalu 1cm, jsou dlouhé 45 - 50cm a široké 8 - 9cm.

Aloe gneissicola

synonyma: *A. capitata* var. *gneissicola*

oblasti: Z Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe gossweileri

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe gracilicaulis

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe graciliflora

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe gracilis

synonyma: *A. laxiflora*

Aloe grandidentata

oblasti: Botswana, Free State, Severní Kapsko

Roste v JAR a Botswaně bez kmínku v trsech. Listy vytvářejí růžici, jsou 3úhlé a oboustranně v prouzcích bíle skvrnitě. Květenství tvoří kyjovité červené květy.

Množí se odnožemi.

Aloe grata

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe greatheadii

synonyma: *A. pallidiflora*, *A. termetophyla*

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair), Jihoafrická Republika (JAR)

Roste od Demokratické Republiky Kongo po JAR.

Aloe greenii

oblasti: KwaZulu-Natal, Mosambik

Roste od JAR po Mosambik.

Aloe grisea

oblasti: Džíbútí, Somálsko

Roste od Džíbútí po Somálsko.

Aloe guerrae

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe guillaumetii

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe haemanthifolia

oblasti: Afrika

Aloe haggeherensis

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře.

Aloe hahnii

oblasti: Limpopo

Roste v JAR.

Aloe hardyi

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe harlana

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii v trsech. Dorůstá šířky až 60cm. Listy jsou sivozelené, dlouhé až 20cm a na bázi téměř tak i široké. Květenství má až 1m stonek a vlastní květy jsou tmavěčervené (i žluté).

Aloe haworthioides

synonyma: Aloinella haworthioides, Lemeea haworthioides

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru v trsech. Jak už název napovídá, vypadá velmi podobně jako příslušníci rodu Haworthia. Listy vytvářejí růžici, jsou kopinaté, slabé, měkce bíle zubaté a dlouhé do 4cm. Květenstvím je hrozen na až 30cm stvolu, vlastní květy jsou trubkovité a bílé až narůžovělé. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. aurantiaca - květy červenooranžové, tyčinky žluté
- var. descoingsii
- var. haworthioides

Vyhovují ji skalní pukliny a polostín. Zimuje při teplotách do 5°C.

Vytváří veliké množství odnoží, ale množit je možné i semeny.

Aloe hazeliana

oblasti: Zimbabwe

Roste v Zimbabwe.

Aloe helenae

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe heliderana

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe hemmingii

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe hendrickxii

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair)

Roste v Demokratické Republice Kongo.

Aloe hereroensis

synonyma: *A. hereroensis* var. *lutea*, *A. hereroensis* var. *orpeniae*, *A. orpeniae*

oblasti: Angola, Free State, Namibie, Severní Kapsko

Roste v Angole, Namibii a JAR. Listy jsou šedozelené, podélně čárkovité, červenohnědě ostře zubaté, špičky zahnuté dovnitř, dlouhé 25 - 30 (i 50)cm, u kořene široké 5 - 8cm a na spodní straně bíle skvrnitě. Květenství je vysoké 1m, tvoří jej 10 - 20 hroznů, které jsou spíše širší než vyšší, vlastní květy jsou trubkovité, červenooranžové a dlouhé 3cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *lutea* - Namibie; květy žluté

<div>Vyhovuje ji dobře propustná půda s mírně zásaditým pH.</div>

Aloe hexapetala

synonyma: *A. chloroleuca*, *A. drepanophylla*, *A. platylepis*, *A. speciosa*, *Lomatophyllum jacquini*, *Phylloma jacquini*

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Aloe heybensis

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe hildebrandtii

synonyma: *A. gloveri*

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe hlangapies

oblasti: KwaZulu-Natal, Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe hoffmannii

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe humbertii

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe humilis

synonyma: *A. acuminata*, *A. acuminata* var. *major*, *A. echinata*, *A. humilis* var. *acuminata*, *A. humilis* var. *candollei*, *A. humilis* var. *echinata*, *A. humilis* var. *incurva*, *A. humilis* var. *incurvata*, *A. humilis* var. *macilenta*, *A. humilis* var. *suberecta*, *A. humilis* var. *subtuberculata*, *A. incurva*, *A. macilenta*, *A. perfoliata* var. *humilis*, *A. perfoliata* var. *suberecta*, *A. suberecta*, *A. subtuberculata*, *A. tuberculata*, *A. verrucosospinosa*, *A. virens*, *A. virens* var. *macilenta*, *Catevala humilis*, *Haworthia fasciata* var. *armata*, *Haworthia ferox*

oblasti: Kapsko

Roste v JAR v trsech až o 10ti hlavách o celkovém průměru 50cm. Listy jsou 3úhlé, křehké, bíle zubaté, oboustranně bíle bradavičnaté, dlouhé 6 - 10cm a široké (1 -) 1,2 - 1,8 (i 2)cm. Květenstvím je řídký 20tikvětý hrozen výšky až 35 (i 40)cm, vlastní květy jsou červené až oranžové (i žluté), okraje zelené, dlouhé 2 - 4cm a na bázi zúžené.

Vyhovuje ji suchý substrát s výbornou propustností a plné slunce. Je odolná na sucho. Při dobrém zacházení odolávají i mírnému mrazu. Ideální teplota zimování je do 10°C doprovázena s výrazným omezením zálivky.

Množí se semeny nebo odnožemi.

Aloe ibitiensis

synonyma: *A. cremersii*, *A. cyriliei*, *A. itremensis*, *A. saronarae*

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe ifanadianae

oblasti: V Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe imalotensis

synonyma: A. contigua, A. deltoideodonta f. latifolia, A. deltoideodonta f. longifolia, A. deltoideodonta var. contigua, A. makayana

oblasti: J Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Listy jsou modrozelené, na slunci až hnědočervené, vzpřímené, drobně světle zubaté, dlouhé do 30cm a široké 12 - 15cm. Květenství je větvené, bohaté, dlouhé až 65cm a okvěť je červené.

Aloe immaculata

oblasti: Limpopo

Roste v JAR.

Aloe inamara

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe inconspicua

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR.

Aloe inermis

oblasti: Jemen, Omán

Roste v Jemenu a Ománu.

Aloe inexpectata

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe integra

oblasti: Mpumalanga, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku.

Aloe inyangensis

oblasti: Zimbabwe

Roste v Zimbabwe. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Listy jsou dlouhé 18 - 28cm. Kvete na 30cm stonku červenými květy se žlutými cípy a vrcholem.

Aloe irafensis

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe isaloensis

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Listy jsou ze spodní strany půlkulaté, stočené vzhůru. Na krajích jsou vroubky. Množí se semeny nebo odnožemi.

Aloe itremensis

Aloe ivakoanyensis

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe jacksonii

oblasti: Etiopie, Somálsko

Roste od Etiopie po Somálsko.

Aloe jawiyon

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře. Listy jsou žlutozelené, zašpičatělé, zubaté a dlouhé 20 - 30cm. Květenství je nevětvené, má délku do 20cm a podpůrné listeny jsou delší stopek květů.

Vyhovuje ji suchý i kamenitý vápenitý substrát.

Aloe jibisana

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe johannis

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe johannis-bernardii

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe johannis-philippeii

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe jucunda

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku v trsech. Dorůstá výšky do 35cm. Listy vytváří růžici, jsou 3úhlé, tuhé, tmavězelené, lesklé, otře zubaté, zpravidla světle skvrnitě, na špičce ohnuté k zemi, dlouhé do 4cm a široké 2 - 5cm. Květenství je přvislé, vysoké 35cm, vlastní květy jsou světlerůžové až červenorůžové, dlouhé 2 - 3cm a na bázi zelené.

Vyhovují ji půdy s pH 5,5 - 6,5. Přezimuje při min. 10°C.

Množí se odnožemi.

Aloe juddii

Aloe juvenna

oblasti: Keňa

Roste v Keni v trsech. Dorůstá výšky do 10cm. Díky tvoření velkého množství odnoží a navrstvení na sebe dokáží vytvořit i vyšší a větší souvislé plochy. Listy jsou svěže zelené, tmavě skvrnitě, zubaté, dlouhé 4cm, na bázi široké 2cm, bývá jich 35ks na 10cm délky stonku, zuby jsou tvrdé, dlouhé 2 - 4mm a v rozteči 4 - 6mm. Květenství má výšku 25 (i 35)cm a vlastní květy jsou růžvooranžové s nažloutlým nebo nazelenalým proužkem.

Množí se odnožemi.

Aloe kahinii

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe kamnelii

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR.

Aloe kaokoensis

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Aloe karasbergensis

synonyma: *A. striata* subsp. *karasbergensis*

oblasti: Namibie, Západní Kapsko

Roste v Namibii a JAR. Existují vnitrodruhové taxony:

<div>

- subsp. *karasbergensis*

- subsp. *hunsbergensis*

</div>

Aloe kedongensis

synonyma: *A. nyeriensis* subsp. *kedongensis*

oblasti: Keňa

Roste v Keni. Dorůstá výšky 1 - 2 (i 4)m. Listy jsou zelené nebo i nažloutlé, dlouhé do 30cm, široké do 3,5cm, zuby jsou dlouhé 2 - 5mm v rozteči 0,8 - 1cm. Kvete červenými 3 - 3,5 (i 4)cm dlouhými květy v latách na 2 - 3cm stopce. Plody mají délku 2,2cm a šířku 9mm.

Aloe kefaensis

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe ketabrowniorum

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe khamiesensis

oblasti: Namaqualand

Roste v JAR. Dorůstá výšky až 3m. Kmen je nevětvený nebo v 1/2 rozdvojený, pokrytý starými listy. Listy jsou prohnuté vzhůru, seskupené v růžici, matné, zelené, dlouhé 40cm, široké 8cm, na okraji červenohnědé, ostře zubaté. Květenství jsou vzpřímená, větvená, tvořená 4 - 8mi klasy, vlastní květy jsou oranžovočervené a špičky žlutozelené.

Aloe kilifiensis

oblasti: Keňa, Tanzánie

Roste od Keni po Tanzánii. Listy jsou široké až 9cm. Květenství je větvené.

Aloe knersvlakensis

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR.

Aloe kniphofioides

synonyma: A. marshallii

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Aloe koenenii

synonyma: A. porphyrostachys subsp. koenenii

oblasti: Jordánsko, Saudská Arábie

Roste v Jordánsku a Saudské Arábii.

Aloe komaggasensis

synonyma: A. striata subsp. komaggasensis

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR.

Aloe kouebokkeveldensis

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR.

Aloe krapohlina

synonyma: A. krapohlina var. dumoulinii

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR. Vytváří růžici o průměru do 20cm. Zpravidla neodnožuje. Listy jsou šedozelené s šedohnědými proužky, bílými zoubky, dlouhé 20cm a na bázi široké 6cm. Květenství je max. 2x větvené, hrozny jsou dlouhé do 15cm, vlastní květy jsou červené a na vrcholu žlutozelené.

Vyžaduje dobře propustný substrát.

Aloe kraussii

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR.

Aloe kulalensis

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe kwasimbana

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe labworana

synonyma: A. schweinfurthii var. labworana

oblasti: Jižní Súdán, Uganda

Roste od Jižního Súdánu po Ugandu.

Aloe laeta

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Vytváří růžice o průměru do 30cm. Listy bývají vzpřímené, modrozelené, dlouhé do 20cm, široké 8cm a červeně zubaté. Květenství má výšku až 60cm, bývá jednoduché, vlastní květy jsou červené nebo nažloutlé.

Aloe lanata

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe latens

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe lateritia

synonyma: *A. amanensis*, *A. boehmii*, *A. campylosiphon*

oblasti: Keňa, Malawi, Tanzánie

Roste v Etiopii, Tanzánii, Keni a Malawi. Stonek může dosáhnout délky až 50cm. Listy vytvářejí 16 - 20tičetnou růžici, jsou světlezelené, na slunci hnědozelené, bíle asymetricky tečkované, hnědě ostnitě s ostny délky 3 - 4mm, dlouhé 25 - 50cm a široké 5 - 10cm. Květenstvím je hrozen délky 4 - 12cm na 1m dlouhé stonku, vlastní květy jsou červenooranžové (i žluté), trubkovité, mají 2 - 2,5 (i 3)cm stopku a korunní lístky jsou dlouhé 1 - 1,3cm. Plodem je nahnědlá tobolka délky do 3cm obsahující mnoho semen délky 3 - 5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. *lateritia* - Tanzánie, Keňa, Malawi
- var. *graminicola* - Keňa

Aloe lavranosii

synonyma: *A. doei*, *A. doei* var. *lavranosii*, *A. splendens*

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe leachii

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe leandrii

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe leedalii

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe lensayuensis

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe lepida

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe leptosiphon

synonyma: A. greenwayi

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe lettyae

oblasti: Limpopo

Roste v JAR.

Aloe lindenii

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe linearifolia

oblasti: Mpumalanga, Východní Kapsko

Roste v JAR.

Aloe lineata

synonyma: A. dorsalis, A. lineata var. glaucescens, A. lineata var. viridis, A. perfoliata var. lineata

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Aloe littoralis

synonyma: A. angolensis, A. rubrolutea, A. schinzii

oblasti: Angola, Botswana, Kapsko, Mosambik, Namibie, Zambie, Zimbabwe

Dostala se do znaku hlavního města Namibie - Windhoek. Roste v jižní Africe. Stonek dorůstá výšky až 3 (i 4)m a je hustě pokrytý starými listy. Na jeho konci vyrůstají zvlněné šedozelené oboustranně bíle skvrnitě listy s 5mm hnědými až červenohnědými (ve spodní části bělavými) ostny, délkou 60cm a šířkou 9 - 11 (i 13)cm na bázi. Květenství má 8 - 10 větví, délku do 1,5m, vlastní květy jsou růžové až červené, dlouhé do 3,5cm, v jícnu nažloutlé a ožíněné.

Aloe lolwensis

oblasti: Keňa, Uganda

Roste od Ugandy po Keňu.

Aloe lomatophylloides

synonyma: Lomatophyllum lomatophylloides

Roste na ostrově Rodrigueus v Indickém oceánu. Listy vytvářejí růžici, jsou kopinaté, špičaté, drobně trnitě, dlouhé 50 - 75cm a široké 8cm. Květenstvím je válcovitý hrozen, má délku 15 - 30cm, 10 - 12cm stopku, vlastní květy jsou trubkovité a červenooranžové. Plody jsou dlouhé 1,5 - 2cm a obsahují tmavou tekutinu.

Aloe longibracteata

oblasti: Limpopo, Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe longistyla

oblasti: Východní Kapsko, Západní Kapsko

Roste v JAR bez kmínku a občas odnožuje. Listy vytvářejí růžici o průměru do 35cm, jsou dlouhé až 15cm, na bázi široké do 3cm a na okraji, horní i spodní straně s bílými až 4mm dlouhými trny. Kvete na nevětveném stvolu v až 50tikvětém květenství, vlastní květy jsou růžovočervené, dlouhé 6cm a široké 1cm.

Množí se semeny nebo dělením trsů.

Aloe luapulana

oblasti: Zambie

Roste v Zambii.

Aloe lucile-allorgeae

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe luntii

oblasti: Jemen, Omán, Somálsko

Roste v Somálsku, Jemenu a Ománu.

Aloe lutescens

oblasti: Limpopo, Zimbabwe

Roste v JAR a Zimbabwe.

Aloe macleayi

oblasti: Jižní Súdán, Uganda

Roste od Jižního Súdánu po Ugandu.

Aloe macra

synonyma: Lomatophyllum macrum, Phylloma macrum

Roste na Réunionu v Indickém oceánu.

Aloe macrocarpa

synonyma: *A. borziana*, *A. edulis*, *A. macrocarpa* var. *major*

oblasti: Džibútí, Mali

Roste od Mali pod Džibútí.

Aloe macroclada

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Vytváří až 50tičetné růžice o průměru až 1,5m. Listy jsou zelené až červenozelené, dlouhé do 80cm, na bázi široké 20cm, zuby 3úhlé a dlouhé 3mm. Kvete na až 2,5m stvolu, z toho květenství má délku až 1,5m a vlastní květy jsou žlutočervené.

Potřebuje plné slunce a teplo.

Aloe macrosiphon

synonyma: *A. compacta*, *A. mwanzana*

oblasti: Rwanda

Roste ve Rwandě a východě tropické Afriky.

Aloe maculata

synonyma: *A. commutata*, *A. commutata* var. *bicolor*, *A. disticha*, *A. gasterioides*, *A. grahamii*, *A. latifolia*, *A. leptophylla*, *A. leptophylla* var. *stenophylla*, *A. macracantha*, *A. maculosa*, *A. obscura*, *A. perfoliata* var. *obscura*, *A. perfoliata* var. *saponaria*, *A. picta*, *A. picta* var. *major*, *A. saponaria*, *A. saponaria* var. *ficksburgensis*, *A. saponaria* var. *latifolia*, *A. saponaria* var. *obscura*, *A. spuria*, *A. trichotoma*, *A. tricolor*, *A. umbellata*, *A. umfoloziensis*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Katalánsko, Zimbabwe

Pochází z JAR a Zimbabwe.

Nesnáší pokles teploty pod 0°C.

Aloe madecassa

Aloe mahraensis

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe makayana

Aloe manandonae

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe mandotoensis

synonyma: A. fontainei

oblasti: Z Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe mandrarensis

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe maningoryensis

Aloe marlothii

synonyma: A. spectabilis

oblasti: Botswana, KwaZulu-Natal, Malawi, Mosambik, Transvaal, V Afrika, Zimbabwe

Druhové jméno bylo vybráno na počest Rudolfa Marlotha, proslulém botaniku a znalci jihoafrické flóry. Patří mezi jedny z největších A. Je rozšířena od Johannesburgu přes Botswanu, Zimbabwe až k Mosambiku. Dorůstá do výšky 2 - 4 (i 6)m a vrchol bývá pokrytý uschlými listy. Listy jsou tlusté, kopinaté, šedozelené, dlouhé do 1,5m, široké do 25cm, zejména na spodní straně s červenohnědými trny a okrajové zuby jsou červenohnědé. Květenství tvoří 30 - 50 hroznů, hrozny jsou válcovité, dlouhé do 80cm, vlastní květy jsou žluté až žlutooranžové a později červené.

U nás pěstujeme v propustném substrátu. Zimujeme při 10°C, bez zálivky!

Aloe martialii

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe massawana

oblasti: Mosambik, S Madagaskar

Roste v Mosambiku a na Madagaskaru. Existuje vnitrodruhový taxon:

- subsp. sakoankenke

Aloe mawii

oblasti: Malawi, Mosambik, Tanzánie

Roste v Tanzánii, Malawi a Mosambiku. Dorůstá výšky do 2m. Stonek může být větvený. Listy jsou modrozelené, na slunci načervenalé a široké do 10cm. Kvete červenooranžovými trubkovitými květy na 1 - 2mm stopce.

Aloe mayottensis

oblasti: V Afrika

Roste na Komorských ostrovech. Stonky jsou dlouhé až 50cm. Listy jsou zelené, na okraji hnědožluté a zubaté. Květenstvím je hrozen.

Aloe mccoysi

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe mcloughlinii

oblasti: Džibútí, Etiopie

Roste od Etiopie pod Džibútí.

Aloe medishiana

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe megalacantha

synonyma: A. magnidentata

oblasti: Etiopie, Somálsko

Roste od Etiopie po Somálsko.

Aloe megalocarpa

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe melanacantha

oblasti: Namaqualand

Roste v JAR v trsech. Dorůstá šířky 20 - 30cm. V dospělosti vytváří malý dřevnatějící kmínek. Listy jsou 3úhelné, na řezu oválné, kýlnaté, dlouhé do 20cm, na bázi široké 4cm, na hranách zubaté do hloubky 1,5cm, v mládí bílé ostnitě v délce 1cm, ve stáří černající. Kvete na 1m stvolu na jehož vrcholu se nacházejí červené, později žluté trubkovité květy. Plodem je tobolka. Existuje několik vnitrodruhových taxonů lišících se barvou.

V domovině odolává i ranním mrazíkům, ale teplota by neměla dlouhodobě klesat pod 15°C.

Aloe mendesii

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe menyharthii

oblasti: Malawi, Mosambik

Roste od Malawi po Mosambik.

Aloe metallica

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe meyeri

synonyma: A. richtersveldensis

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR.

Aloe micracantha

oblasti: KwaZulu-Natal, Východní Kapsko

Roste v JAR.

Aloe microdonta

synonyma: *A. defalcata*

oblasti: Keňa, Somálsko

Roste od Somálska po Keňu.

Aloe microstigma

synonyma: *A. arabica*, *A. brunnthaleri*, *A. juttae*

oblasti: Východní Kapsko, Západní Kapsko

Roste v JAR na až 50cm kmínku. Listy jsou červenozelené, dlouhé do 30cm, na bázi široké 6cm, na okraji hnědočerveně ostře 3úhle zubaté a oboustranně bíle tečkované. Květenství má výšku 1m, z 1 růžice jich vyrůstá po 1 - 3ks a vlastní květy jsou zprvu červené a později přecházejí do žluté.

Aloe millotii

oblasti: J Madagaskar

Roste na Madagaskaru v podobě keře. Stonky ve stáří dřevnatí a mají délku do 25cm. Listy jsou modrozelené, dlouhé do 10cm, na bázi široké 1,5cm, na hranách řídce zubaté a zahnuté dovnitř. Květenstvím je hrozen, vlastní květy jsou trubkovité, červené, na vrcholu zelené a dlouhé do 2,5cm.

Vyhovuje ji vápenitý substrát. Dobře snáší sucho. Zimuje při teplotách 10°C.

Množí se řízký nebo semeny.

Aloe milne-redheadii

oblasti: Angola, Zambie

Roste od Angoly po Zambii.

Aloe minima

synonyma: *A. minima* var. *blyderivierensis*, *A. parviflora*, *Leptaloe blyderivierensis*, *Leptaloe minima*, *Leptaloe parviflora*

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Aloe miskatana

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe mitsioana

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe modesta

oblasti: KwaZulu-Natal, Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe molederana

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe monotropa

oblasti: Limpopo

Roste v JAR.

Aloe monticola

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe morijensis

oblasti: Keňa, Tanzánie

Roste od Keni po Tanzánii.

Aloe mossurilensis

oblasti: Mosambik

Roste v Mosambiku.

Aloe mottramiana

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe mubendiensis

oblasti: Uganda

Roste v Ugandě.

Aloe mudenensis

oblasti: KwaZulu-Natal, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku. Kvete žlutými květy.

Aloe multicolor

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe munchii

oblasti: Zimbabwe

Roste v Zimbabwe.

Aloe murina

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe musapana

oblasti: Zimbabwe

Roste v Zimbabwe.

Aloe mutabilis

oblasti: Limpopo

Roste v JAR.

Aloe myriacantha

synonyma: A. caricina, A. graminifolia, A. johnstonii, Bowiea myriacantha, Leptaloe caricina, Leptaloe graminifolia, Leptaloe johnstonii, Leptaloe myriacantha, Leptaloe schliebenii

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Uganda

Roste od Ugandy po JAR.

Aloe mzimbana

oblasti: Tanzánie, Zambie

Roste od Tanzánie po Zambii.

Aloe namibensis

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Aloe namorokaensis

synonyma: Lomatophyllum namorokaense

oblasti: Z Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe neilcrouchii

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR.

Aloe neoqaharensis

oblasti: Katar, Saudská Arábie

Roste v Saudské Arábii a Kataru.

Aloe neosteudneri

oblasti: Eritrea

Roste v Eritrei.

Aloe newtonii

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe ngobitensis

oblasti: Keňa, Tanzánie

Roste v Keni a Tanzánii. Podobá se *A. nyeriensis*, je ale menší, tenčí a listy jsou tečkované. Kvete oranžovočervenými květy.

Aloe ngongensis

oblasti: Keňa, Tanzánie

Roste v Keni a Tanzánii.

Aloe nicholsii

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR.

Aloe niebuhriana

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe nordaliae

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe nubigena

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe nuttii

synonyma: A. brunneopunctata, A. corbisieri, A. mketiensis

oblasti: Angola, Tanzánie

Roste od Tanzánie po Angolu. Listy jsou trávovité a dlouhé 50cm. Květenstvím je klas délky do 75cm, vlastní květy jsou trubkovité, červenooranžové až růžové.

Aloe nyeriensis

synonyma: A. ngobitensis

oblasti: Keňa

Roste v Keni. Dorůstá výšky 0,5 - 0,8 (i 3)m. Listy jsou dlouhé 50 - 60cm, široké 7cm, barva šedozelená, netečkovaná, na okraji jsou 3 - 4mm zuby v rozteči 0,8 - 1,2cm. Kvete červenými 3 - 4cm květy v až 60cm dlouhých latách. Plody mají délku 1,6cm a šířku 8mm.

Aloe occidentalis

synonyma: Lomatophyllum occidentale

oblasti: Z Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe officinalis

synonyma: A. vera var. officinalis

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově.

Aloe oligophylla

synonyma: Lomatophyllum oligophyllum

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe omavandae

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Aloe omoana

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe orientalis

synonyma: Lomatophyllum orientale

oblasti: V Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe orlandi

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe ortholopha

oblasti: Zimbabwe

Roste v Zimbabwe.

Aloe otallensis

synonyma: A. boranensis

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe pachydactylos

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe pachygaster

oblasti: Namibie

Roste v Namibii.

Aloe paedogona

oblasti: Angola, Namibie

Roste v Angole a Namibii.

Aloe palmiformis

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe parallelifolia

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe parvibracteata

synonyma: A. burgersfortensis, A. decurvidens, A. keithii, A. lusitanica, A. parvibracteata var. zuluensis, A. pongolensis, A. pongolensis var. zuluensis

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Mosambik

Roste od JAR po Mosambik.

Aloe parvicapsula

oblasti: Saudská Arábie

Roste v Saudské Arábii.

Aloe parvidens

oblasti: Etiopie, Tanzánie

Roste od Etiopie po Tanzánii.

Aloe parviflora

synonyma: Leptaloe parviflora

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR.

Aloe parvula

synonyma: A. sempervivoides, Lemeea parvula

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru osamoceně nebo v malých skupinách. Listy jsou mečovité, šedozelené až modrofialové, dlouhé 6 (i 10)cm, široké 8mm a mají až 2mm zuby. Květenství (i rozvětvené) má výšku do 35cm a vlastní květy jsou červené.

Zimuje při teplotách s min. 15°C.

Aloe patersonii

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair)

Roste v Demokratické Republice Kongo.

Aloe pavelkae

oblasti: Namibie

Druhové jméno bylo vybráno na počest objevitele Petra Pavelky. Roste v Namibii v trsech s až 25ti hlavami na převislém 1,5 - 3m dlouhém stonku s uschlými listy. Listy vytvářejí růžici o průměru do 35cm, jsou tmavězelené, jemně čárkované, v mládí dvouřadé, dlouhé 18 - 28cm a široké 10 - 15cm. Květenství (i větvené) tvoří červené květy.

Roste v převislém stavu.

Aloe pearsonii

oblasti: Namibie, Západní Kapsko

Roste v Namibii a JAR. Dorůstá výšky až 2m. Stonek je vzpřímený.

Aloe peckii

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe peglerae

oblasti: Kapsko, Namibie

Pochází v JAR a Namibii, zpravidla samostatně (i ve skupině). Dorůstá šířky i výšky 30 - 40cm, Listy obloukem míří vzhůru, jsou dlouhé 25cm, na konci při dostatku přímého slunce červenají, na spodní straně uprostřed a po krajích jsou ostnité. Květenstvím je hrozen, vlastní květy jsou trubkovité a červené.

Aloe pembana

synonyma: *Lomatophyllum pемbanum*

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe pendens

synonyma: *A. arabica*, *A. dependens*

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe penduliflora

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe percrassa

synonyma: *A. abyssinica* var. *percrassa*, *A. bakeri*, *A. oligospila*, *A. schimperi*

oblasti: Eritrea, Etiopie

Roste v Eritrei a Etiopii.

Aloe perdita

oblasti: Zimbabwe

Roste v Zimbabwe.

Aloe perfoliata

synonyma: *A. albispinga*, *A. brevifolia*, *A. commelyni*, *A. comptonii*, *A. depressa*, *A. distans*, *A. flavispina*, *A. mitriformis*, *A. mitriformis* subsp. *comptonii*, *A. mitriformis* subsp. *distans*, *A. mitriformis* var. *albispinga*, *A. mitriformis* var. *angustior*, *A. mitriformis* var. *commelyni*, *A. mitriformis* var. *elatior*, *A. mitriformis* var. *flavispina*, *A. mitriformis* var. *humilior*, *A. mitriformis* var. *pachyphylla*, *A. mitriformis* var. *spinosior*, *A. mitriformis* var. *spinulosa*, *A. mitriformis* var. *xanthacantha*, *A. nobilis*, *A. parvispinga*, *A. perfoliata* var. *brevifolia*, *A. perfoliata* var. *mitriformis*, *A. reflexa*, *A. spinulosa*, *A. xanthacantha*

oblasti: Kapsko, Katalánsko

Roste v JAR. Dorůstá výšky až 2m. Velice dobře odnožuje a tímto vytváří trsy. Listy jsou 3hrané zubaté listy v růžici. Květenství tvoří červené květy. Má léčivé účinky a v současné době je k nám distribuována z holandských pěstíren jako léčivka.

Aloe perrieri

synonyma: A. parvula

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe perryi

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře ve větších skupinách. Listy jsou tmavězelené, zašpičatělé, zubaté a dlouhé 20 - 45cm. Květenství je větvené, dlouhé až 1,5m a podpůrné listy má malé, kratší stopek květů.

Vyhovuje ji suchý i kamenitý vápenitý substrát.

Aloe petricola

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR zpravidla ve skupinách. Listy vytvářejí 20 - 30tičetnou růžici, jsou namodralé, kopinaté, zubaté a dlouhé do 60cm. Květy trubkovitými oranžovými květy délky do 3,5cm.

Aloe petrophila

oblasti: Limpopo

Roste v JAR.

Aloe peyrierasii

synonyma: Lomatophyllum peyrierasii

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe philippeii

Aloe pictifolia

oblasti: Východní Kapsko

Roste v JAR.

Aloe pianaarii

oblasti: Mosambik

Roste v Mosambiku.

Aloe pillansii

synonyma: *A. dichotoma* subsp. *pillansii*

oblasti: Namibie, Severní Kapsko

Roste v Namibii a JAR ve stromovém habitu. Dorůstá výšky až 10 (i 15)m při průměru nepravého kmene až 1 (i 2)m na bázi a následně se zužuje až na 20cm. Kmen je tlustý, jednoduchý nebo od 1/2 vidličnatě větvený. Borka je světlá, žlutohnědá a hladká. Listy vytvářejí v růžicích, jsou kopinaté, šedozelené až zelené, načervenalé (i hnědozelené), na okraji bílé, zubaté v délce 1 - 2mm (zuby zahnuté), dlouhé 50 - 60cm, široké 10 - 12cm. Květenství je hroznovité až hlávkovité, válcovité, větvené, dlouhé až 50cm, vlastní květy jsou žluté a dlouhé 3,5cm.

Aloe pirottae

oblasti: Etiopie, Keňa, Somálsko

Pochází z oblastí Keni, Etiopie a Somálska. Roste zejména do šířky. Mečovité listy jsou prohnuté směrem dolů, mají bílé skvrny a mohou být dlouhé až 50cm. Na krajích vytváří směrem vzhůru zahnuté trny. Základní barva listů je zelená, při dostatečném přísunu slunečních paprsků přechází do bronzova. Květy vyrůstají na metrových stoncích. Mají barvu růžovou až šarlatovou.

Aloe plicatilis

synonyma: *A. disticha* var. *plicatilis*, *A. flabelliformis*, *A. lingua*, *A. linguiformis*, *A. tripetala*, Kumara *disticha*, *Rhipidodendrum distichum*, *Rhipidodendrum plicatile*

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě bohatě větveného keře nebo malého stromu s větveným kmenem. Dorůstá výšky až 1,5 (i 5)m. Borka je šedá nebo tmavěšedá. Listy jsou uspořádané do vějíře, jsou dužnaté, páskovité, zelené až namodralé či šedozelené, dlouhé do 30cm, široké 4cm. Květenstvím je válcovitý 30tikvětý hrozen délky do 30 (i 50)cm, vlastní květy červené, na špičce zelené, trubkovité a dlouhé do 5cm.

Potřebuje rozptýlené světlo. V mírně vlhkém substrátu vydrží i teploty blížíící se k 0°C, ideálním minimem je ale 12°C.

Množí se semeny.

Aloe plowesii

oblasti: Zimbabwe

Roste v Zimbabwe.

Aloe pluridens

synonyma: A. atherstonei, A. pluridens var. beckeri

oblasti: Kapsko, KwaZulu-Natal

Roste v JAR. Kmen je nevětvený. Dorůstá výšky 1,8 - 3 (i 6)m. Listy vyrůstají ve spirále, jsou prohnuté, světlezelené až žlutozelené, zubaté, mírně lodičkovité, dlouhé 60 - 70cm, široké 5 - 6cm, na okraji bělavé, zuby narůžovělé. Z jedné růžice vytváří až 3 květenství výšky do 1m po 4 hroznech, vlastní květy jsou narůžověle oranžové.

Aloe polyphylla

oblasti: Lesotho

Pocházející z Lesotha z Dračích hor a je cizosprašná. Vytváří přisedlé prakticky kulaté až 150tičetné růžice o průměru až 1m z listů ve spirále v 5ti řadách (tvoří se až ve 3. roce), vlastní listy jsou 3boké, klínové, které jsou uspořádány do šroubovice. Období kvetení trvá několik měsíců a opylení zajišťují populace medosavek a strdimilů, vlastní květy vyrůstají na 0,6 - 1m dlouhé latě, jsou trubkovité a červené až oranžové. Je zařazena do kategorie ohrožených druhů, do skupiny I. CITES a u nás poměrně vzácná. Domorodé obyvatelstvo ji používá k léčení dobytka.

Jedná se o horskou rostlinu (3000m n.m.), která zde úspěšně snáší sníh i mráz. U nás pěstujeme v propustném substrátu, zaléváme nárazově, až po zavadnutí lístků. Zimujeme chladně.

Množí se semeny, která jsou uložena v tobolce. Odnože téměř nevytváří

Aloe porphyrostachys

oblasti: Saudská Arábie

Roste v Saudské Arábii.

Aloe powysiorum

oblasti: Keňa

Roste v Keni v podobě keře. Dorůstá výšky až 1,8m. Listy jsou umístěné na vrcholcích větví, jsou dlouhé do 55cm, široké 9cm, světlezelené, zuby dlouhé 1mm v rozteči 3 - 8mm. Kvete červenými 3,2 - 3,6cm květy v téměř vodorovných květenstvích o délce do 50cm.

Aloe praetermissa

oblasti: Omán

Roste v Ománu.

Aloe pratensis

oblasti: KwaZulu-Natal, Východní Kapsko

Roste v JAR. Listy jsou široce kopinaté, modrozelené, na okraji nažloutlé a zuby jsou načervenalé, dlouhé 6mm. Květenstvím je krátký kulovitý hrozen, vlastní květy jsou světleoranžové, na špičkách zelené a trubkovité.

Aloe pretoriensis

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR), Svazijsko, Zimbabwe

Roste v JAR, Svazijsku a Zimbabwe. Listy jsou sivozelené a špičky načervenalé.

Aloe prinslooii

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR.

Aloe procera

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe pronkii

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe propagulifera

synonyma: Lomatophyllum propaguliferum

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe prostrata

synonyma: A. zombitsiensis, Lomatophyllum prostratum

oblasti: Z Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Listy jsou tmavězelené, dlouhé 1,5 -2cm a široké 1,5 - 2mm.

Aloe pruinosa

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR.

Aloe pseudoparvula

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe pseudorubroviolacea

oblasti: Saudská Arábie

Roste v Saudské Arábii.

Aloe pubescens

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe pulcherrima

oblasti: Etiopie

Pochází z Etiopie.

Vyhovují ji čedičové skály a svahy.

Aloe purpurea

synonyma: A. marginalis, A. marginata, A. rufocincta, Dracaena dentata, Dracaena foetida, Dracaena marginata, Drakaina marginata, Lomatophyllum aloiflorum, Lomatophyllum borbonicum, Lomatophyllum marginatum, Lomatophyllum purpureum, Lomatophyllum rufocinctum, Phylloma aloiflorum, Phylloma borbonicum, Phylloma rufocinctum

Roste na Mauriciu. Stonek má výšku až 3m a průměr 7 - 10cm. Listovou růžici tvoří až 20 listů, jsou tmavězelené, na okraji načervenalé, měkce zubaté, dlouhé až 1m a na bázi široké 12cm. Květenstvím je hrozen na 20 - 30cm stopce, vlastní květy jsou oranžové nebo růžové.

Aloe pustuligemma

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe rabaiensis

oblasti: Somálsko, Tanzánie

Roste od Somálska po Tanzánii. Dorůstá výšky 1 - 1,5m. Listy jsou šedozelené, obvykle bez teček, dlouhé do 45cm, široké 8cm, zuby dlouhé 4mm a mají rozteč 0,5 - 1,5cm. Kvete červenými 2,8 - 3,2cm květy v bohatě větvených latách.

Aloe rakotonasoloi

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe ramosissima

synonyma: *A. dichotoma* subsp. *ramosissima*, *A. dichotoma* var. *ramosissima*

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě keře. Dorůstá výšky 2 - 3m. Kmínky jsou větvené již od báze. Listy jsou dlouhé do 20cm, široké 7cm, na okraji světležluté, zuby jsou někdy hnědé. Květenství má délku do 20cm, vlastní květy jsou žluté, někdy nazelenalé a dlouhé do 3,5cm.

Aloe rapanarivoi

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe rauhii

synonyma: *Guillauminia rauhii*

oblasti: JZ Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Dorůstá výšky do 15cm. Listy vytvářejí 20tičetnou růžici, jsou tmavězelené, na slunci načervenalé, světle skvrnitě, na hranách bíle trnitě (trny délky 0,5mm), dlouhé do 10cm, široké 2cm a bázi obepínají celý střed růžice. Kvete na 30cm stonku, květenství je 15tičetné a vlastní květy jsou červené.

Vyhovují ji pískovcové skály.

Množí se odnožemi.

Aloe rebmannii

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe reitzii

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Roste v JAR.

Aloe rendilliorum

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe retrospiciens

synonyma: A. ruspoliana var. dracaeniformis

oblasti: Etiopie, Somálsko

Roste v Etiopii a Somálsku.

Aloe reynoldsii

oblasti: Východní Kapsko

Roste v JAR. Květenství tvoří žluté trubkovité květy.

Aloe rhodesiana

synonyma: A. eylesii

oblasti: Zimbabwe

Roste v Zimbabwe.

Aloe richardsiae

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii. Tloušťka kmene dosahuje až 4cm a výška 25cm.

Aloe richaudii

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe rigens

oblasti: Džibútí, Somálsko

Roste od Džibútí po Somálsko.

Aloe rivaie

oblasti: Etiopie, Keňa

Roste od Etiopie po Keňu.

Aloe rivierei

synonyma: A. parvicoma

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově.

Aloe rodolphei

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe roeoeslii

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe rosea

synonyma: Lomatophyllum roseum

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe rubrodonta

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe rubroviolacea

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově.

Aloe ruffingiana

Aloe rugosifolia

synonyma: A. otallensis var. elongata

oblasti: Etiopie, Keňa

Roste v Etiopii a Keni.

Aloe rugosquamosa

synonyma: A. compressa var. rugosquamosa

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe rupestris

synonyma: A. nitens

oblasti: KwaZulu-Natal, Mosambik

Roste v JAR a Mosambiku. Dorůstá výšky až 7 (i 8)m. Listy vytvářejí růžice, jsou vzpřímené, matné, tmavězelené, na okraji načervenalé až narůžovělé, zuby jsou malé, červenohnědé, dlouhé do 70 (i 75)cm, široké 7 - 10cm a zuby jsou červenohnědé. Květenství tvoří až 18 hroznů o délce 20 - 25cm, šířce 7cm, poupata jsou žlutooranžová a vlastní květy žluté nebo hnědooranžové.

Aloe rupicola

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe ruspoliana

synonyma: A. jex-blakeae, A. stefaninii

oblasti: Etiopie, Keňa

Roste v Etiopii a Keni.

Aloe ruvuensis

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe sabaea

synonyma: A. gillilandii

Aloe sakarahensis

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe sandersoniae

oblasti: Jihoafrická Republika (JAR)

Pochází z jižní Afriky.

Aloe saponaria

oblasti: J Afrika, Střední střeozemí

Pochází z jižní Afriky. Vytváří přizemní růžice, listy jsou tmavězelené, zpravidla bíle skvrnité, široké, krátce zubaté, špička záhy odumírá a kroutí se. Kvete oranžovými úzce trubkovitými dlouze stopkatými květy se 6ti cípy v téměř hlávkovitém hrozu na vrcholu na 60cm stonku. Tekutina v listech ve vodě pění a může se používat jako náhražka mýdla.

Aloe saudiarabica

oblasti: Saudská Arábie

Roste v Saudské Arábii.

Aloe saundersiae

synonyma: Leptalo

saundersiae

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR. Občas vytvoří odnož. Dorůstá výšky 20cm. Listy vytvářejí růžici o průměru do 15cm, jsou žlábkovité, tmavězelené, hustě bíle vztyčeně 3úhle trnité, dlouhé do 10cm a široké 3mm. Květenstvím je řídký hrozen na dlouhém stonku, vlastní květy jsou narůžovělé, pohárkovité a dlouhé do 1,2cm.

Krátkodobě snese -2°C.

Množí se odnožemi.

Aloe scabrifolia

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe schelpei

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe schilliana

synonyma: Lomatophyllum viviparum

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe schoelleri

oblasti: Eritrea

Roste v Eritrei.

Aloe schomeri

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe schweinfurthii

synonyma: A. barteri var. lutea, A. trivialis

oblasti: Jižní Súdán, Mali

Roste od Mali po Jižní Súdán.

Aloe scobinifolia

oblasti: Somálsko

Roste v Somálsku.

Aloe scorpioides

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe secundiflora

synonyma: A. engleri, A. floramaculata, A. marsabitensis

oblasti: Etiopie, Keňa, Rwanda, Súdán, Tanzánie

Roste od Etiopii, Súdánu, Keni, Rwandě a Tanzánii. Dorůstá výšky do 1m na až 30cm kmínku. Listy vytvářejí růžici o průměru až 1m, jsou vzpřímené, mohou být na okraji zkroucené, zelené (i s nádechem do bronzova), v mládí řídce tečkované a dlouhé do 75cm. Květenství má výšku 1 - 2m, má až 20 větví, hrozny jsou válcovité a vlastní květy červené až růžovočervené. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. sobolifera - Tanzánie; listy tmavězelené, dlouhé do 20cm

- var. tweedieae

Aloe seibanica

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe seretii

oblasti: Demokratická Republika Kongo (Zair)

Roste v Demokratické Republice Kongo.

Aloe serriyensis

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe shadensis

oblasti: Saudská Arábie

Roste v Saudské Arábii.

Aloe sharoniae

synonyma: A. cooperi subsp. pulchra

oblasti: KwaZulu-Natal, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku.

Aloe sheilae

synonyma: A. cephalophora

oblasti: Saudská Arábie

Roste v Saudské Arábii.

Aloe silicicola

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe simii

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe sinana

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe sinkatana

oblasti: Súdán

Roste v Súdánu.

Aloe sladeniana

synonyma: A. carowii

Aloe sobolifera

synonyma: A. secundiflora var. sobolifera

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe socialis

synonyma: Lomatophyllum sociale

oblasti: Z Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe somaliensis

synonyma: A. somaliensis var. marmorata

oblasti: Džibútí, Somálsko

Roste od Džibútí po Somálsko. Listy vytvářejí růžici, jsou zelené, světle čárkované, ostnité a konce na slunci červenají.

Aloe soutpansbergensis

oblasti: Limpopo

Roste v JAR.

Aloe speciosa

oblasti: Východní Kapsko, Západní Kapsko

Roste v JAR v podobě keře až stromu. Dorůstá výšky až 6m. Kmínky bývají nevětvené a pokryté uschlými listy. Listy jsou namodralé nebo modročervené, na okraji tmavěružové až světlečervené, dlouhé do 75 - 90cm, široké 8cm a zuby červené. Květenstvím je krátký hrozen na až 50cm stonku, vlastní květy zelenobílé, dlouhé do 3,5cm a poupata jsou červená.

Aloe spectabilis

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR. Vytváří kmen o výšce 1,8 - 3,5m. Listy jsou modrozelené, načervenalého odlesku a trnité. Květenství tvoří červené květy.

Aloe spicata

synonyma: A. sessiliflora

oblasti: KwaZulu-Natal, Transvaal, Zimbabwe

Roste v JAR a Zimbabwe. Dorůstá výšky 1 - 1,5 (i 2)m. Kmen je nevětvený, pokrytý starými listy. Listy vytvářejí růžici, jsou zelené až načervenalé, na okraji s načervenalými zuby. Z jedné růžice vytváří až 5 klasovitých květenství o délce 30 - 40 (i 75)cm, vlastní květy jsou pohárkovité a

žlutooranžové až červené.

Aloe spinitriaggregata

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe splendens

synonyma: A. doei, A. doei var. lavranosii

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově. Listy jsou zelené, zpravidla s načervenalým odleskem a 3úhlé. Květenství tvoří červené trubkovité květy. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Spuria' - listy načervenalé, dlouhé 30 - 45cm; květy světlečervené

Aloe springatei-neumannii

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe squarrosa

synonyma: A. concinna, A. zanzibarica

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře. Listy jsou žlábkovité, špičaté, zelené, světle skvrnitě a ostnitě.

Vyhovuje ji suchý i kamenitý vápenitý substrát a ideálně ve svahu.

Aloe steffaniana

Aloe steudneri

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe striata

synonyma: A. albocincta, A. hanburiana, A. paniculata, A. rhodocincta, A. striata var. rhodocincta

oblasti: Namaqualand, Namibie, Východní Kapsko, Západní Kapsko

Roste v JAR a Namibii. Může vytvořit nízký kmen. Listy jsou šedozelené až modrozelené, narůžovělé, na okraji načervenalé, drobně bíle zubaté, mohou prohnuté, dlouhé až 50cm a u kořene mohou být široké až 20cm. Květenství má až 1m stonek, může se větvit max. na 3 stvoly, je hroznovité, vlastní květy jsou trubkovité, převislé červené až růžové, lesklé a voskovité. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. karasbergensis - Namibie; okraje listů bělavé
- var. komaggasensis - Namaqualand
- var. striata - listy podélně prohnuté

Aloe striatula

synonyma: A. aurantiaca, A. cascadiensis, A. macowanii, A. subinermis

oblasti: J Afrika

Roste v jižní Africe v podobě bohatě větveného keře. Dorůstá výšky až 1,8m. Listy jsou lesklé, zeleně pruhované, zuby drobné a stočené k zemi, dlouhé do 25cm a široké do 2,5cm. Květenstvím je hrozen délky do 25 (i 40)cm, vlastní květy žluté, oranžové až červenooranžové a dlouhé do 4,5cm.

Aloe suarezensis

oblasti: S Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe succotrina

synonyma: A. perfoliata var. purpurascens, A. perfoliata var. succotrina, A. purpurascens, A. sinuata, A. soccotorina, A. soccotrina, A. succotrina var. purpurascens, A. succotrina var. saxigena, A. vera

oblasti: Západní Kapsko

Roste v JAR. Dorůstá výšky 1 - 2m. Listy vytvářejí hustou růžici. Květenstvím je hrozen.

Aloe suffulta

oblasti: KwaZulu-Natal, Malawi

Roste v JAR a Malawi.

Aloe suprafoliata

oblasti: KwaZulu-Natal, Mpumalanga, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku. Listy vyrůstají ve 2 řadách, vytvářejí přízemní stočenou růžici, jsou modrozelené a trnité. Kvete v 1 - 3 hroznech, listeny jsou zakulacené, vlastní květy jsou válcovité, růžovočervené se zelenou špičkou a dlouhé 4cm.

Zimuje při teplotách 5 - 10°C.

Množí se semeny.

Aloe suzannae

oblasti: J Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Jedna z neobvyklých aloí, která má úzké až metr dlouhé, na konci tupě zakončené listy. Časem tvoří kmínek, někdy rozvětvený, a může být až 4m vysoká. Růst do výšky je extrémně pomalý, jen 2,5 a 3 cm ročně. Klasnaté květenství ze žlutých kvítků bývá až 3m dlouhé. Kvete v noci a předpokládá se, že jako jediná aloe je opylována netopýry.

Pochází z tropických, za sucha opadavých lesů na jihovýchodě Madagaskaru. V důsledku těžby dříví na výrobu dřevěného uhlí tam došlo k devastaci vegetace a omezení populace této endemické aloe. Od roku 2000 je proto zahrnuta mezi druhy kriticky ohrožené úplným vymřením ve volné přírodě.

Aloe swynnertonii

synonyma: A. chimanimaniensis, A. melsetterensis, A. petrophila, A. vogtsii

oblasti: Mosambik, Zimbabwe

Roste v Zimbabwe a Mosambiku.

Aloe tartarensis

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe tauri

oblasti: Zimbabwe

Roste v Zimbabwe.

Aloe tegetiformis

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe teissieri

synonyma: A. andohahelensis

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe tenuifolia

synonyma: A. agavifolia, A. barteri, A. buettneri, A. congolensis, A. paedogona

Aloe tenuior

synonyma: A. tenuior var. decidua, A. tenuior var. densiflora, A. tenuior var. glaucescens, A. tenuior var. rubriflora, A. tenuior var. viridifolia

Aloe tewoldei

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe thompsoniae

oblasti: Limpopo

Roste v JAR.

Aloe thorncroftii

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe thraskii

oblasti: KwaZulu-Natal, Východní Kapsko

Roste v JAR. Dorůstá výšky až 4m. Listy jsou prohnuté směrem k zemi, žlutošedozelené, dlouhé 1 - 1,6m, široké 22cm, na okraji načervenalé zuby. Z jedné růžice vytváří až 4 hlávky z 15 - 27mi klasů, poupata jsou zelenooranžová, květy žluté s oranžovými nebo zelenavými špičkami.

Aloe tidmarshii

Aloe tomentosa

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe tongaensis

Aloe tormentorii

synonyma: Lomatophyllum tormentorii

Roste na Mauriciu. Dorůstá výšky 0,9 - 1,2m. Listy vytvářejí hustou růžici, jsou kopinaté, tlusté, zelené, na slunci načervenalé, dlouhé 60cm a široké 15cm. Květenství mívá 3 - 7 větví s délkou 30 - 60cm a hrozny tvoří světležluté květy.

Aloe tororoana

oblasti: Uganda

Roste v Ugandě.

Aloe torrei

oblasti: Mosambik

Roste v Mosambiku.

Aloe trachyticola

synonyma: A. capitata var. trachyticola

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe trichosantha

synonyma: A. percrassa var. albopicta

oblasti: Eritrea, Somálsko

Roste od Eritrei po Somálsko.

Aloe trigonantha

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe trothae

oblasti: Tanzánie

Roste v Tanzánii.

Aloe tulearensis

Aloe turkanensis

oblasti: Keňa, Uganda

Roste od Ugandy po Keňu.

Aloe ukambensis

oblasti: Keňa

Roste v Keni.

Aloe umfoloziensis

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR. Listy jsou dlouhé, úzké, hnědozelené s bílými podlouhlými skvrnami a zubatým okrajem. Květenstvím je hrozen na 1,5m stonku a vlastní květy jsou červené.

Aloe vacillans

synonyma: A. audhalica, A. dhalensis

oblasti: Arabský poloostrov

Roste na Arabském poloostrově.

Aloe vallis

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe vanbalenii

oblasti: KwaZulu-Natal, Svazijsko

Roste v JAR a Svazijsku.

Aloe vanrooyenii

oblasti: KwaZulu-Natal

Roste v JAR.

Aloe vaombe

oblasti: JZ Madagaskar

Roste na Madagaskaru. Vytváří si vysoký kmínek (od věku 7 - 10let), který může dosáhnout výšky 2 - 3 (i 6)m výšky při šířce 20 (i 25)cm. Na vrcholu se nachází růžice ze sytě zelených listů, jsou zahnuté, hrubě pilovité, sivozelené, na slunci načervenalé a dlouhé 0,6 - 1m. Květenství má výšku až 1m, vlastní květy jsou trubkovité, červené, mírně ohnuté a dlouhé 3cm. Plodem je dřevnatější tobolka a obsahující mnoho černých semen.

Zimuje při teplotách do 15°C.

Množí se semeny.

Aloe vaotsanda

oblasti: J Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe variegata (Sokolí pero)

synonyma: A. ausana, A. punctata, A. variegata var. haworthii

oblasti: Namibie, Východní Kapsko

Roste v Namibii a JAR. Dorůstá výšky 25 - 30cm. Stonky jsou zakryté listy. Listy vyrůstají ve vějíři nebo spirále, jsou žlábkovité, drobně pilovité, zelené až hnědozelené, bílé čárkované, na okraji bílé, dlouhé 10 - 15cm a široké 4 - 6cm. Květenství tvoří i několik řídkých hroznů na až 30cm lodyze, vlastní květy jsou trubkovité, růžově oranžové (i žluté), zahnuté a dlouhé 3,5 - 5cm. Plodem je 3pouzdrá tobolka šířky až 5cm a obsahuje semena s obalem šířky 0,8 - 1,5cm.

Snáší teploty až -8°C, ale zimovat by měla při 10 - 15°C. V době léta by se neměla zalévat.

Množí se semeny nebo často vytvářenými odnožemi.

Aloe vatovavensis

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe venenosa

oblasti: Angola

Roste v Angole.

Aloe vera (Aloe pravá)

synonyma: A. barbadensis, A. barbadensis var. chinensis, A. chinensis, A. elongata, A. flava, A. indica, A. lanzae, A. maculata, A. perfoliata var. barbadensis, A. perfoliata var. vera, A. rubescens, A. variegata, A. vera var. chinensis, A. vera var. lanzae, A. vera var. littoralis, A. vulgaris

oblasti: Andalusie, Arabský poloostrov, Florida, Havajské ostrovy, Indie, Makaronésie, Mexiko, Nepál, Pákistán, Peru, Portoriko, Portugalsko, Střední střeozemí, Texas, Turecko, Venezuela, Yunnan

Pochází z Kanárských ostrovů. Patří mezi cizosprašné rostliny a tudíž pro získání semen je třeba dvou kvetoucích, nepříbuzných rostlin. Dorůstá výšky 0,6 - 0,9 (i 1)m a průměru až 1m. Vytváří krátký stonek s velkým množstvím dužnatých špičatých zelených až šedozených listů s nenápadnými bílými skvrnami, trnitými okraji (v rozteči 1cm, mohou také zcela chybět), mají délku 15 - 35cm a šířku 4 - 8cm. Kvetou na 0,6 - 1,2cm dlouhé lodyze žlutými zvonkovitými květy o délce 2,5 - 3cm a poupata jsou červenooranžová. Plodem je tobolka délky 1,5cm.

Pěstují se jako jiné A. při dostatku světla, tepla a s malou závlivkou. Přezimuje při teplotách 15 - 18°C. Má léčivé účinky a do 3 let se zvětšují. Dužina z listů se používá v léčitelství.

Aloe verecunda

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe versicolor

oblasti: JV Madagaskar

Roste v Madagaskaru.

Aloe veseyi

synonyma: A. enotata

oblasti: Tanzánie, Zambie

Roste od Tanzánie po Zambii.

Aloe viguieri

oblasti: J Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe virginieae

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe viridiflora

oblasti: Namibie

Roste v Namibii. Listy vytváří 50 - 60tičetnou růžici, listy mají růžovočervenohnědé ostrny s délkou 2mm, roztečí 2 - 5mm, jsou dlouhé do 10cm a široké 2cm. Květenství je až 6tívětvé, dlouhé 1,5m, hrozny jsou dlouhé 25cm, široké 20cm, 50 - 60tikvěté, vlastní květy jsou žluté, mají 2cm stopku a délku 3,3cm.

Aloe vituensis

oblasti: Jižní Súdán, Keňa

Roste v Jižním Súdánu a Keni.

Aloe vogtsii

oblasti: Limpopo

Roste v JAR.

Aloe volkensii

synonyma: A. stuhlmannii

oblasti: Keňa, Rwanda, Tanzánie, Uganda

Roste v Ugandě, Keni, Tanzánii a Rwandě v podobě keře odnožemi na bázi. Dorůstá výšky 2,5 - 4 (i 9)m na kmínku pokrytém suchými listy. Listy vytvářejí růžici, jsou tmavě sivozelené (i nažloutlé), za sucha načervenalé, bez teček (kromě mladých listů), vztyčené, později zkroucené, dlouhé do 60cm, široké 10cm a zuby jsou široké 2 - 4mm. Kvete v bohatě větvených latách, je válcovitě kuželovité, dlouhé 50 - 60cm, vlastní květy mají 1 - 1,5cm stopku, jsou červené, nažloutle tečkované, v jícnu žluté a dlouhé 1,2 - 1,7cm. Plodem je vejčitá tobolka délky 3cm a šířky 1,5cm.

Aloe vossii

oblasti: Limpopo

Roste v JAR.

Aloe vryheidensis

synonyma: A. dolomitica

oblasti: KwaZulu-Natal, Limpopo

Roste v JAR.

Aloe wanalensis

oblasti: Uganda

Roste v Ugandě.

Aloe welmelensis

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe weloensis

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe wernerii

oblasti: JV Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe whitcombei

oblasti: Omán

Roste v Ománu.

Aloe wickensii

oblasti: Mpumalanga

Roste v JAR.

Aloe wildii

synonyma: A. torrei var. wildii

oblasti: Zimbabwe

Roste v Zimbabwe.

Aloe wilsonii

oblasti: Keňa, Uganda

Roste od Ugandy po Keňu.

Aloe wollastonii

synonyma: A. angiensis, A. angiensis var. kitaliensis, A. bequaertii, A. lanuriensis, A. lateritia var. kitaliensis, A. macrocarpa subsp. wollastonii

oblasti: Afrika

Roste na východě tropické Afriky.

Aloe woodii

synonyma: A. parvicapsula

oblasti: Jemen, Saudská Arábie

Roste v Jemenu a Saudské Arábii.

Aloe wrefordii

oblasti: Jižní Súdán, Keňa

Roste v Jižním Súdánu a Keni.

Aloe x anosyana

oblasti: Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe x buzairiensis

oblasti: Sokotra

Roste na Sokotře.

Aloe x caesia

oblasti: Kapsko

Roste v JAR.

Aloe x imerinensis

oblasti: Střední Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe x keayi

oblasti: Ghana

Roste v Ghaně.

Aloe x L.C.

Aloe x menachensis

synonyma: A. percrassa var. menachensis, A. trichosantha var. menachensis

oblasti: Jemen

Roste v Jemenu.

Aloe x philippeii

oblasti: J Madagaskar

Roste na Madagaskaru.

Aloe x puberula

synonyma: A. vera var. puberula

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe x schoenlandii

oblasti: Kalifornie

Aloe x spinosissima

Vytváří růžice listů o šířce i výšce 1m, vlastní listy mají krátké neostrné trny.

Aloe x todarii

Aloe yavellana

oblasti: Etiopie

Roste v Etiopii.

Aloe yemenica

oblasti: Jemen

Roste na Arabském poloostrově.

Aloe zebrina

synonyma: A. ammophila, A. angustifolia, A. bamangwatensis, A. baumii, A. constricta, A. komatiensis, A. laxissima, A. lettyae, A. lugardiana, A. platyphylla, A. transvaalensis, A. vandermerwei

oblasti: Limpopo, Namibie

Roste v JAR a Namibii.

Další informace:

<http://database.dendrologie.cz/index.php?menu=4&id=96>

<http://www.aloes.wz.cz/index2.htm>

<http://www.celysvet.cz/aloe-vera.php>

<http://www.chovatelka.cz/chovatelka/clanek/869--jak-pestovat-aloe-vera.html>

<http://www.fiftyfifty.cz/spolecensky-magazin/5032622/Aloe-vera---cela-lekarna-v-jedne-rostline.php>

<http://www.panna.cz/panna/clanek/93--aloe---dar-prirody.html>

<https://www.rostliny.net/>