

Aremonia (Řepíček)

čeleď: Rosaceae

Aremonia agrimonoides (Řepíček řepíkovitý)

synonyma: Agrimonia agrimonoides, Agrimonoides stenantha, Potentilla stenantha

oblasti: Česká republika, Írán, Itálie, Maďarsko, Malá Asie (Anatolie), Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Středozeří, Švýcarsko, Velká Británie

Roste v horách středozeří od Itálie po Turecko, dále v Rakousku, Maďarsku, Rumunsku, Slovensku, ale i ve Velké Británii a Švýcarsku. U nás pouze vzácně na východní Moravě. Patří mezi trvalky. Lodyhy vyrůstají po 1 - 5 ks do výšky 20 - 30 cm. Jsou vystoupavé a ochlupené. Přetřhovaně lichozpeřené listy tvoří 2 - 3 páry lístků, přičemž koncové 3 jsou větší. Lístky mají obvejčitý tvar a okraje jsou tupě pilovité. Snadno jdou zaměnit s jahodníkem. Řepík je ochlupený. Kvete v 3 - 5ti květech žlutém květenství s 5ti okvětními lístky. Nápadné jsou tyčinky, které jsou zhruba stejně dlouhé jako okvětní lístky. Plodem je češule délky 5 - 6 mm. Patří mezi chráněné druhy C2.

Vyhovují mu světlé listnaté lesy, křoviny, lesní cesty, paseky, atp.

Aremonia pouzarii

Další informace:

<http://botanika.wendys.cz/kvetena/kvetena.php?dil=2&page=513>

<http://botany.cz/cs/aremonia-agrimonoides/>

<http://www.atlasbotani.eu/index.php?detail&cislo=3340>

<https://www.rostliny.net/>