

## Abies guatemalensis (Jedle guatemalská)

synonyma: *A. subsp. ixtepejiensis*, *A. subsp. longibracteata*, *A. subsp. rushforthii*, *A. subsp. tamaulipasensis*, *A. subsp. zapotekensis*, *A. var. ixtepejiensis*, *A. var. longibracteata*, *A. var. rushforthii*, *A. var. tacanensis*, *A. var. tamaulipasensis*, *Abies tacanensis*, *Abies zapotekensis*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Guatemala, Mexiko

Pochází z Guatemaly a Mexika. Roste v podobě kuželovitého stromu. Dorůstá výšky 20 - 35 (i 45)m při průměru kmene 1m nebo i více. Větve jsou vodorovné. Borka je černohnědá nebo šedohnědá, větve jsou červenohnědé až tmavě černočervené, ochlupené, pupeny kulovitě vejčité, pryskyřičnaté, dlouhé do 5mm. Jehlice jsou mírně hřebenité, na horní straně lesklé, tmavězelené, spodní je nasivělá až stříbřitá, centrální žebro vystouplé, délku mají 1,5 - 5,5cm, šířku 1,2 - 2mm, na horní straně průduchy obvykle chybí, na spodní jsou v 8 - 10ti řadách, mají 2 okrajové pryskyřičné kanálky, konec tupý, bývá vykrojený. Samičí šištice dlouze válcovité, na konci špičaté až zploštělé, žlutohnědé, fialově ožiněné, dlouhé 8 - 11,5cm, široké 4 - 4,5cm, šupiny podlouhlé, širší než dlouhé, listeny schované 1/2 délky šupin, klínovitě obvejčité nebo obkopinaté. Šupiny jsou široce klínovitě obvejčité nebo příčně podlouhlé, dlouhé 2,7 - 3cm, široké 1,5 - 2,2cm. Semena jsou bleděhnědá, klínovitě obvejčítá, dlouhé 9mm a křídlo je dlouhé do 1,5cm.

<https://www.rostliny.net/>