

Abies fargesii (Jedle Fargesova)

synonyma: *A. subsp. hupehensis*, *A. var. hupehensis*, *A. var. tieghemii*

čeleď: Pinaceae

oblasti: Gansu, Sichuan

Pochází z Číny. Roste v podobě stromu s úzce pyramidální nebo kuželovitou korunou. Dorůstá výšky do 40 (i 65)m při průměru kmene 1,5 - 2m. Borka je tmavěšedá nebo tmavě šedohnědá, hladká až drsná, nepravidelně se odlupuje a praská. Hlavní větve jsou mohutné, ostatní červenohnědé, šedohnědé nebo bleděhnědé, holé či ochlupené, zimní pupeny vejčité nebo téměř kulovité, pryskyřičnaté, dlouhé 6 - 8mm, široké 4 - 5mm a barva je růžovofialová. Jehlice jsou na horní straně větví vystoupavé, na spodní hřebenitě 2řadě uspořádané, horní strana tmavězelená, tvar obkopinatě čárkovitý, zploštělý, délka 1 - 3cm, šířka 1,5 - 4mm, na spodní straně jsou stomatální řady ve 2 bílých pruzích, má 2 okrajové nebo středové pryskyřičné kanálky, konec vykrojený (i tupý nebo špičatý). Samčí šištice žluté s červenými skvrnami, válcovité, dlouhé 1,3cm, široké 5mm. Samičí šištice modrorůžovofialové až tmavě růžovofialové nebo červenohnědé, válcovité, dlouhé 3 - 10cm, široké 3 - 4cm, semenné šupiny ve středu šištice ledvinité nebo vějířovitě ledvinité, dlouhé 0,8 - 1,5cm, široké 1,3 - 2cm, listeny obvejčitě klínovité, okraj může být vykousávaně zoubkovaný. Semena jsou o3úhle vejčitá nebo podlouhlá, dlouhá 5 - 6mm, široké 3 - 4mm, křídlo je černé a dlouhé až 1,5cm. Existuje vnitrodruhový taxon:

- *var. fargesii*/*var. hupehensis*/*var. sutchuenensis*/*var. tieghemii*/*A. kansouensis*/*A. sutchuenensis* - větve červenohnědé, někdy pouze narůžovofialovělé, holé nebo ochlupené
- *var. faxoniana*/*A. faxoniana*/*A. delavayi* *var. faxoniana*/*subsp. minensis*/*var. minensis*/*A. minensis* - Gansu, Sichuan; větve bleděhnědé nebo šedohnědé, hlavní větve bývají holé, ostatní hustě rezavohnědě ochlupené
- 'Headfort'/'Hereford' - zakrslý habitus; pomalý růst
- 'Sutchuenensis'

Je dobře mrazuvzdorná.

Množí se semeny nebo řízkováním.

<https://www.rostliny.net/>