

Barringtonia racemosa

synonyma: *Barringtonia caffra*, *Barringtonia celebensis*, *Barringtonia ceramensis*, *Barringtonia ceylanica*, *Barringtonia elongata*, *Barringtonia excelsa*, *Barringtonia lageniformis*, *Barringtonia longiracemosa*, *Barringtonia obtusangula*, *Barringtonia pallida*, *B. var. elongata*, *B. var. minor*, *B. var. procera*, *B. var. subcuneata*, *Barringtonia rosaria*, *Barringtonia rosata*, *Barringtonia rumphiana*, *Barringtonia salomonensis*, *Barringtonia stravadium*, *Barringtonia terrestris*, *Barringtonia timorensis*, *Butonica apiculata*, *Butonica caffra*, *Butonica ceylanica*, *Butonica inclyta*, *Butonica racemosa*, *Butonica rosata*, *Butonica rumphiana*, *Butonica terrestris*, *Caryophyllus racemosus*, *Eugenia racemosa*, *Huttum racemosum*, *Megadendron ambiguum*, *Megadendron pallidum*, *Menichea rosata*, *Michelia apiculata*, *Michelia ceylanica*, *Michelia racemosa*, *Michelia rosata*, *Michelia timorensis*, *Stravadium obtusangulum*, *Stravadium racemosum*

čeleď: *Lecythidaceae*

oblasti: Austrálie, Indie, J Čína, Jihoafrická Republika (JAR), Laos, Malajsie, Mosambik, Srí Lanka, Střední Asie, Thajsko, Tichý oceán

Roste v pobřežních bažinatých pralesích Indického Oceánu od Jihoafrické Republiky, přes Mosambik, Madagaskar, Indii, Srí Lanku, Malajsi, Thajsko, Laos, jižní Čínu po Austrálii, Ryukyu a Polynésii v podobě stormu. Dorůstá výšky 3 - 12 (i 27)m. Borka je hladká nebo rozpukaná, našedlá, nažloutlá nebo nahnědlá. Listy jsou tmavězelené, tuhé, lesklé, kožovité, dlouze obvejčitého až obkopynatého tvaru se zašpičatěním. Spodní strana je světlejší. Řapíky jsou fialové, mají délku 2,5 - 15cm. Délka dosahuje 8 - 35 (i 42)cm a šířka 4 - 14 (i 16)cm. Kvete bílými nebo narůžovělými 2,5 - 5cm květy ve vzhledu jehelníčku. Plody jsou eliptické, dlouhé 3 - 7cm a široké 2 - 4cm. Semena mají délku 2 - 4cm a šířku 1 - 2,5cm.

<https://www.rostliny.net/>