

Colobanthus

čeleď: Caryophyllaceae

Roste na jižní polokouli.

Colobanthus acicularis

oblasti: S Nový Zéland

Pochází ze severního ostrova Nového Zélandu. Roste v polštářích. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Větve mohou mít tloušťku až 1cm. Listy jsou střechovitě vyskládané, jsou lesklé, šídlovité s dlouhou špičkou, dlouhé 5 - 7mm. Květy mají v průměru 7mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, suchá propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus affinis

synonyma: Spergula affinis

oblasti: Austrálie, Nový Zéland

Roste v Austrálii a na Novém Zélandu v trsech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy mají trávovitý tvar, délku 1,5 - 3cm. Kvete zelinkavými květy.

Vyhovují mu středně úrodné a mírně vlhké propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus apetalus

synonyma: C. alpinus, Spergula apetala

oblasti: Tasmánie

Roste v jihovýchodní Austrálii a Tasmánii v kobercových porostech. Dorůstá výšky 3 - 8cm. Listy jsou čárkovité, dlouhé 1 - 2cm a bývají zakřivené.

Vyhovují mu středně úrodné a vlhké propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus bolivianus

Colobanthus brevisepalus

oblasti: J Nový Zéland

Roste na jižním ostrově Nového Zélandu v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 3cm. Listy jsou střechovitě poskládané, mají šídlovitý tvar s dlouhou špičkou a délku 2 - 3mm. Květy mají v průměru 3mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus buchananii

oblasti: J Nový Zéland

Roste na jižním ostrově Nového Zélandu v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy mají čárkovitě šídlový tvar s dlouhou špičkou a délku 0,5 - 1cm. Květy mají v průměru 5 - 8mm.

Vyhovují mu sklaní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus caespitosus

Colobanthus canaliculatus

oblasti: J Nový Zéland

Roste na jižním ostrově Nového Zélandu v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou tuhé, šídlovité s rýhovaním a dlouhou špičkou a dorůstají délky 3 - 4mm. Květy mají v průměru 2 - 3mm.

Vyhovují mu středně vlhké propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus curtisiae

Colobanthus diffusus

Colobanthus hookeri

oblasti: Nový Zéland

Roste na Novém Zélandu v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 3cm. Listy jsou střechovitě vyskládané, tuhé, lesklé, šídlovité s dlouhou špičkou a délkou 4 - 5mm. Květy mají v průměru 3 - 4mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus kerguelensis

Roste na subarktických ostrovech: Kergueleny, Crozetovy ostrovy a Heardův ostrov a McDonaldovy ostrovy. Patří mezi trvalky. Vytváří trsy o průměru až 6,5cm. Listy jsou podlouhlé, dlouhé 0,5 - 1cm a široké 2 - 3,5mm.

Vyhovuje mu dobře propustná písčité půda do výšky 30m nad hladinu moře, kde bývá ještě zasažen kapičkami z mořského příboje.

Colobanthus lycopodioides

synonyma: *C. lechleri*, *C. polycnemoides*, *Drudea lycopodioides*

oblasti: Argentina, Čile

Roste na jihu Jižní Ameriky v Čile a Argentíně v polštářových porostech. Dorůstá výšky 3 - 5cm. Listy jsou drobné, vejčité kopinaté se špičkou. Květy jsou 5ti čtelné.

Vyhovují mu mírně úrodné a vlhké propustné půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus masonae

oblasti: J Nový Zéland

Roste na jižním ostrově Nového Zélandu v polštářových porostech. Pod povrchem vytváří kulový kořen. Dorůstá výšky 1 - 3cm. Listy jsou podlouhlé. Květy mají v průměru 5mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus meigeni

oblasti: Čile

Roste v Čile v polštářových porostech. Dorůstá výšky 3 - 5cm. Báze dřevnatí. Listy mají 3rohý tvar se špičkou a délku 3mm. Kvete 5tičetnými květy.

Vyhovují mu středně úrodné propustné vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus monticola

oblasti: J Nový Zéland

Roste na jižním ostrově Nového Zélandu v polštářových porostech. Dorůstá výšky 2 - 4cm. Listy mají čárkovitě šídlový tvar s krátkou špičkou a délku 5mm.

Vyhovují mu skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus muelleri

synonyma: *C. billardieri* var. *brachypoda*

Colobanthus muscoides

oblasti: J Nový Zéland, S Nový Zéland

Roste pouze na ostrovech jihozápadního Tichého oceánu v subarktické oblasti. Patří mezi trvalky. Roste v polštářových porostech majících v průměru i několik metrů. Dorůstá výšky 3 - 5cm. Listy jsou podlouhlé, 3roze čárkovité se špičkou, dlouhé 3 - 5mm a široké 0,8 - 1mm.

Roste při pobřeží v dosahu roztržiku mořského příboje v mírně úrodné propustné půda na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus nivicola

oblasti: JV Austrálie

Roste na jihovýchodě Austrálie v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy mají délku 3 - 5cm.

Vyhovují vlhké půdy bohaté na živiny, polostín a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus pulvinatus

oblasti: Tasmánie

Roste v jihovýchodní Austrálii a Tasmánii v kobercových porostech. Dorůstá výšky 3 - 5cm. Listy jsou úzké, 3rohé až kopinaté s plastickým žilkováním, délky do 6mm.

Vyhovují mu středně úrodné a vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus quitensis

synonyma: *C. alatus*, *C. aretioides*, *C. billardieri*, *C. cherlerioides*, *C. crassifolius*, *C. crassifolius* var. *aretioides*, *C. maclovianus*, *C. meingeni*, *C. quitensis* var. *alatus*, *C. saginoides*, *Sagina crassifolia*, *Sagina quitensis*

oblasti: Andy, Bolívie, Čile, Ekvádor, Falklandy, Jižní Orkneje, Mexiko, Patagonie, Peru

Roste v Antarktidě, Jižních orknejích a Jižních Shetlandech a Jižních Orknejích při mořském pobřeží. Vyskytuje se ale i na jihu Jižní Ameriky v Andách Čile a Argentíny, ale také v Bolívii, Peru a Ekvádoru a velmi vzácně i v Mexiku. Roste v kobercových porostech z menších trsů. Dorůstá výšky 0,5 - 2 (i 5)cm. Kvete žlutými květy.

Vyhovují mu štěrby skal, sutě, atp. s přístupem k vodě.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus repens

Colobanthus squarrosus

Colobanthus strictus

synonyma: *C. muelleri* var. *strictus*

oblasti: S Nový Zéland

Pochází ze severního ostrova Nového Zélandu. Roste v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy mají žlutozelenou barvu, úzký tvar s jehlicovitým koncem a délku 1 - 2cm. Kvete 5tičetnými květy.

Vyhovují mu sklaní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus subulatus

synonyma: *C. benthamianus*, *C. benthanianus*, *C. darwinii*, *C. subulatus* var. *darwinii*, *Sagina subulata*, *Sagina subulatus*

oblasti: Argentina, Čile

Roste na jihu Jižní Ameriky v Čile a Argentíně v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou 3rohé se špičkou, tuhé a kožvité, bílé na okraji.

Vyhovují mu chudé písčité půdy na plném slunci.

Množí se semeny nebo řízky.

Colobanthus wallii

synonyma: *C. mollis*

oblasti: J Nový Zéland

Roste na jižním ostrově Nového Zélandu v polštářových porostech. Dorůstá výšky 2 - 3cm. Listy jsou na sobě střechovitě naskládané, mají čárkovitý tvar a délku 0,5 - 1cm.

Vyhovují mu sklaní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny nebo řízky.

Další informace:

<http://botany.cz/cs/colobanthus-quitensis/>

<http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Colobanthus.htm>

<https://www.rostliny.net/>