

Quercus lobata

synonyma: *Quercus hindsiana*, *Quercus hindsii*, *Q. f. argillora*, *Q. f. insperata*, *Q. subsp. turbinata*, *Q. subsp. walteri*, *Q. var. argillora*, *Q. var. hindsii*, *Q. var. insperata*, *Q. var. rarita*, *Q. var. turbinata*, *Q. var. walteri*, *Quercus longiglanda*, *Quercus lyrata*

čeleď: Fagaceae

oblasti: Kalifornie

Pochází z Kalifornie. Roste v podobě opadavého stromu se širokou korunou. Dorůstá výšky až 35m. Mladé větve jsou šedé až žlutošedé, krátce ochlupené, ve 2. roce holé. Listy jsou široce obvejčité nebo podlouhlé až eliptické, středně až hluboce laločnaté díky 3 - 5ti lalokům z každé strany, laloky jsou vejčité až lopatkovité, tupé nebo zaoblené, báze je zaobleně protažená nebo uťatá, vzácně až srdčitá, horní strana tmavězelená nebo našedlá, lesklá nebo šupinkatá, spodní bělavá nebo světlezelená, hustě až řídce ochlupená, řapíky jsou dlouhé 0,5 - 1,2cm, celková délka je 5 - 12cm a šířka 2,5 - 8cm. Plodí po 1 - 2ks. Číšky jsou hluboce pohárkovité, polokulovité nebo obkuželovité, dlouhé 1 - 3cm, široké 1,4 - 3cm. Žaludy jsou světlehnědé, podlouhlé, kuželovité nebo vřetenovité, dlouhé 3 - 6cm a široké 1,2 - 2,5cm a v číšce je schovaná z 1/4.

<https://www.rostliny.net/>