

Quercus cerris (Dub cer)

synonyma: *Cerris australis*, *Cerris austriaca*, *Cerris crinita*, *Cerris paliphleas*, *Quercus aegilops*, *Quercus asplenifolia*, *Quercus austriaca*, *Quercus cana*, *Q. f. balatae*, *Q. f. basi-cuneata*, *Q. f. cycloloba*, *Q. f. laciniatolrata*, *Q. f. lancifolia*, *Q. f. leviterlobata*, *Q. f. macrophylla*, *Q. f. pendula*, *Q. f. roborilobata*, *Q. f. sinuatolobata*, *Q. f. verae-csapodyae*, *Q. subsp. austriaca*, *Q. subsp. tournefortii*, *Q. var. austriaca*, *Q. var. bipinnatifida*, *Q. var. bithynica*, *Q. var. caramanica*, *Q. var. haliphlaeos*, *Q. var. longimucronata*, *Q. var. pendula*, *Q. var. pseudocerris*, *Q. var. sinuata*, *Q. var. tournefortii*, *Quercus crinita*, *Quercus crispa*, *Quercus frondosa*, *Quercus haliphlaeos*, *Quercus heterophylla*, *Quercus incisa*, *Quercus lanuginosa*, *Quercus nicotrae*, *Quercus pseudocerris*, *Quercus ragnal*, *Quercus raynal*, *Quercus recurvisquamosa*, *Quercus secundatii*, *Quercus thracica*, *Quercus tournefortii*, *Quercus tukhtensis*, *Quercus variegata*, *Quercus x ambrozyana*

čeleď: Fagaceae

oblasti: Apeniny, Arménie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Černá Hora, Česká republika, Francie, J Itálie, JZ Asie, Kosovo, Libanon, Maďarsko, Makedonie, Malá Asie (Anatolie), Massachusetts, Německo, Polsko, Řecko, Rumunsko, S Itálie, Sicílie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Střední Itálie, Sýrie, Švýcarsko

Pochází z jihozápadní Asie. Dorůstá výšky 35 (i 40)m a šířky 25m v rozložitém téměř vejčitém nebo tupě jehlancovitém habitu. Patří mezi opadavé rostliny. Borka má šedohnědou barvu, hluboce brázditou. Mladé výhony jsou mírně hranaté, ochlupené, zakončené listovými ochlupenými pupeny. Palisty jsou nitkovité, neopadavé. Střídavé listy mají proměnlivý tvar délky až 6 - 12 (i 14)cm. Okraj může být pilovitý nebo hluboce 4 - 9x laločnatý. Laloky jsou 3úhlé, špičaté nebo lalůčkovité. Mají lesklý tmavězelený povrch, spodní strana je modrozelená a může být i ochlupená. Samčím květenstvím je až 6cm visící jehněda v barvě žlutozelené. Samičí jehnědy jsou nenápadné. Plodenství je 1 - 4 (i 7)mičetné. Plodem je žalud délky 2,5 - 4cm dozrávající 2. rokem. Patří mezi chráněné druhy C2. Existují vnitrodruhové taxony:

- 'Afyon Lace' - pomalu rostoucí, hluboce rozeklané listy
- 'Argenteovariegata'/f. argenteo-variegata/f. variegata - výška až 22m; podlouhlé mělce laločnaté tmavězelené listy s nerovnoměrně širokým bílo béžovým okrajem listů sahajícím místy až ke středu, někdy zbývá v centru pouze úzký zelený pruh
- 'Aureovariegata'/f. aureo-variegata - středně velké stromy; podlouhlé mělce laločnaté tmavězelené listy s nerovnoměrně širokým žlutým okrajem listů sahajícím místy až ke středu, někdy zbývá v centru pouze úzký zelený pruh
- var. *austriaca*/Q. *austriaca* - Tyroly, Sicílie, Balkán, Malá Asie; vejčité na obou stranách špičaté nerovnoměrně laločnaté listy, laloky 3úhlé, krátké, početné, méně kožovité, spodní strana silněji ochlupená, řapíky délky 1 - 1,5cm
- var. *cerris* - laloky listů dále lalůčkovité, výrkojky hrubé
- 'Curly Head'
- var. *haliphloeos*/Q. *haliphloeos* - Francie; větší listy, v horní 1/2 2x širší než ve spodní, lyrovitě laločnaté, dlouhé 10 - 14cm, široké 3,5 - 5cm, řapíky délky 5 - 6mm
- 'Laciniata'/f. *asplenifolia*/f. *dissecta*/f. *laciniata* - nižší, rozložitější, nerovnoměrný; výška 10m; listy s hlubokými zářezy, peřenolaločné až peřenoklané, laloky opět peřenolaločné, na spodní části světlejší, řídce hvědicovitě ochlupené, dlouhé 10 - 17cm a široké 3 - 9cm
- 'Marmorata' - pomalejší růst, hustší; listy nepravidelně laločnaté, bledě zelené, nerovnoměrně žlutě skvrnitě nebo lemované, dlouhé 10 - 14cm, široké 3 - 5cm
- 'Pendula' - široce rozložitý, koruna polokulovitá; výška 10m; základní větve normální, sekundární polopřevísle a to třeba až k zemi; listy úzké, hluboce laločnaté
- var. *pseudocerris* - Řecko, Libanon, Sýrie; výška až 22m, listy variabilní, hluboce peřenosečné, laloky čárkovité, celokrajné nebo jemně laločnaté, horní strana řídce ochlupená, spodní hustě bíle

plstnatá

- var. *tournefortii*/var. *ciliata* - Arménie, Sicílie, Libanon; výška do 12m; listy lyrovitě peřenolaločné, v centru se širokým obloukovitým výkrojkem, na každé straně 3 - 5 obvykle celokrajných laloků, horní strana mírně žlutozelená, spodní nažloutle bíle zelená, krátce plstnatá
- 'Variegata' - lesklé tmavězelené bíle skvrnité listy
- 'Wodan' - rychle rostoucí; listy hluboce rozeklané; dokáže růst i ve vápenitých půdách

Vyhovují mu teplomilné doubravy. Je odolný na sucho.

<https://www.rostliny.net/>