

Quercus acuta

synonyma: *Cyclobalanopsis acuta*, *Cyclobalanopsis acuta* f. *albivena*, *Cyclobalanopsis acuta* f. *megaphylla*, *Cyclobalanopsis acuta* f. *rosivena*, *Cyclobalanopsis acuta* var. *acutiformis*, *Cyclobalanopsis acuta* var. *megaphylla*, *Cyclobalanopsis acuta* var. *yanagidae*, *Cyclobalanopsis acutiformis*, *Cyclobalanopsis acutiformis* f. *yanagidae*, *Cyclobalanopsis buergeri*, *Cyclobalanopsis laevigata*, *Cyclobalanopsis marginata*, *Q. f. acutiformis*, *Q. f. lanceolata*, *Q. var. acutiformis*, *Q. var. yanagidae*, *Quercus buergeri*, *Quercus carpostachys*, *Quercus kasaimok*, *Quercus kusaiensis*, *Quercus laevigata*, *Quercus marginata*, *Quercus pseudoglauca*, *Quercus quelpaertensis*

čeleď: Fagaceae

oblasti: Čína, Japonsko, S Korea

Pochází z Japonska, severní Koreje a Číny. Roste v podobě stálezeleného stromu, u nás obvykle pouze keř. Dorůstá výšky 9 - 25m. Větve i listy v mládí jsou hnědě plstnaté, brzy olysávají. Listy jsou leliptické, kopinatě podlouhlé nebo vzácně vejčité, na konci náhle špičaté, báze je kulatá až široce klínovitá, okraj celokrajný, vzácně zvlňžený, řapíky jsou dlouhé až 2,5 (i 4)cm, horní strana je lesklá tmavězelená, spodní matná nažloutlá, žilnatinu tvoří 8 - 13 párů žilek, celková délka je 6 - 20cm. Žaludy vyrůstají ve svazečcích, mají délku kolem 2cm, tavr je eliptický, do 1/3 jsou schované v čísce. Existuje vnitrodruhový taxon:

- var. *acutaeformis* - Kjúšů; širší tlustší listy

<https://www.rostliny.net/>