Paronychia (Stříbřenka)

synonyma: Anychia, Plotzia, Siphonychia

čeleď: Caryophyllaceae

Roste v Evropě, Asii, severní Africe a Severní i Jižní Americe. Kvete v klubkách s palisty.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia adalia

Paronychia ahartii

oblasti: Kalifornie

Paronychia albanica

oblasti: Albánie

Paronychia amani

oblasti: Libanon, Malá Asie (Anatolie), Sýrie

Roste v Libanonu, Sýrii a Turecku v kobercových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy mají úzce eliptický tvar, délku 2 - 3mm, vytváří palisty a listeny o délce 6 - 7cm.

Vyhovují ji sklaní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Paronychia americana

synonyma: Herniaria americana, Siphonychia americana, Siphonychia pauciflora

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína

Paronychia anatolica

Paronychia andina

Paronychia angorensis

Paronychia arabica
synonyma: P. desertorum

oblasti: Írán, Itálie, Izrael, Palestina

Patří mezi jednoletky, občas i trvalky. Vytváří mnoho rozkladitých protáhlých stonků. Listy jsou mírně obkopinaté, dlouhé 0,3 - 1,1cm, široké 1 - 2mm a na bázi klínovité. Květy mají kalich velikosti 1,5 - 2mm a má obvejčité roztřepené na bázi ochlupené laloky. Semena mají velikost 0,5mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. breviseta - trvalka
- subsp. cossoniana
- subsp. longiseta - jednoletka

Paronychia arbuscula

oblasti: Čile

Pochází z Čile. Roste v podobě keře. Dorůstá výšky 20 - 30cm. Mladé výhony jsou ochlupené. Listy mají úzce čárkovitý tvar a délku společnou s palisty.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, dělením nebo řízky.

Paronychia aretioides

oblasti: Andalusie, Katalánsko

Pochází ze Španělska. Roste v polštářových porostech. Dorůstá výšky (1 -) 3 - 10cm. Povrch je ochlupený. Listy jsou přisedlé, střechovitě se překrývají a mají délku 1 - 3mm. Kvete v klubkách o průměru 3 - 5mm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia argentea (Stříbřenka stříbrná)
synonyma: Chaetonychia paronychia, Ferriera mediterranea, Illecebrum paronychia, P. mauritanica, Plottzia paronychia

oblasti: Alžírsko, Andalusie, Baleáry, Egypt, Francie, Itálie, Izrael, Jordánsko, JV Evropa, JZ Asie, Katalánsko, Korsika, Kréta, Kypr, Libanon, Libye, Makaronésie, Palestina, Portugalsko, Řecko,

Sardínie, Sicílie, Sinajský poloostrov, Sýrie, Tunisko, Turecko

Roste ve středozemí, jižní Evropě, severní Africe včetně Kanárských ostrovů a jihozápadní Asii. Patří mezi trvalky (i jednoletky). Vytváři kobercové porosty. Pod zemí vytváří ztlustlý dřevnatějící oddenek. Lodyhy jsou rozkladité, bohatě větvené, dlouhé 5 - 30 (i 50)cm a dokáží znovu zakořenit. Palisty jsou vejčité, bělavé až stříbřité. Listy jsou vstřícné, dlouze eliptické, obvejčité nebo vejčitěkopinaté, špičaté, drsné, sivozelené, dlouhé 0,5 - 2cm a široké 1 - 5mm. Květenstvím je husté klubíčko o průměru 1,2 - 1,5cm, vlastní květy jsou nažloutlé, 5tičetné oboupohlavné, se stříbřitěbílými 5mm listeny na koncích výhonů, kalich má 1,5 (i 2)mm roztřepené laloky. Plodem je nepukavá tobolka obsahující 1 hnědé semeno velikosti 1 - 1,5mm.

Vyhovují ji křoviny, písčiny, pole, okraje cest, skalní pukliny, atp. v suchu na plném slunci se suchým zimním režimem.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia argyrocoma

synonyma: Anychia argyrocoma, P. argyrocoma ssp. albimontana, P. argyrocoma subsp. albimontana, P. argyrocoma var. albimontana

oblasti: Georgia, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Západní Virginie

Roste na jihovýchodě a severovýchodě USA v kobercových porostech. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou čárkovité, stříbřitě ochlupené a dlouhé 1 - 3cm. Kvete v klubkách.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia argyroloba

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v trsech nebo kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy mají obkopinatý až podlouhlý tvar a délku do 4mm. Vytváří i palisty. Kvete v klubkách o průměru 1 - 1,2cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia baldwinii

synonyma: P. baldwinii subsp. riparia, P. baldwinii var. ciliata, P. riparia, Plagidia riparia

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína, Severní Karolína, Virginie

Paronychia beauverdii

Paronychia boissieri
synonyma: P. imbricata

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v polštářových porostech. Dorůstá výšky 5 - 10cm. Listy jsou ztlustlé, protažené, střechovitě čtyřřadě poskládané. Vytváří i palisty. Kvete v 5mm klubkách s listeny.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia bornmuelleri

Paronychia brasiliana

Paronychia bungei

oblasti: Írán

Roste v Íránu v kobercových porostech. Dorůstá výšky 3 - 5cm. Stonek je plstnatý a od báze dřevnatí. Listy mají kopisťovitý tvar. Kvete v klubíčkách s listeny.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia cabrerae

Paronychia caespitosa

oblasti: Írán

Paronychia camphorosmoides

Paronychia canadensis
synonyma: Anychia canadensis, Anychia dichotoma, P. dichotoma

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Vermont, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Paronychia canariensis
synonyma: Illecebrum canariensis, P. smithii

oblasti: Makaronésie

Patří mezi endemity Kanárských ostrovů. Dorůstá výšky 10 - 60cm. Roste v podobě poléhavého nebo převislého polokeře. Povrch je přitiskle ochlupený. Vstřícné listy jsou přisedlé, mají kopinatý tvar a jsou také ochlupené. Kvete v klubíčkách oboupohlavnými zelenobílými květy. Plodem je nažka.

Vyhovují ji skalní pukliny nebo tenká vrstva substrátu.

Paronychia capella

Paronychia capitata
synonyma: Anychia herniariae, Ferriera nivea, Illecebrum capitatum, Illecebrum niveum, P. atlantica, P. nivea

oblasti: Andalusie, Itálie, Izrael, JV Evropa, Katalánsko, Palestina, S Afrika

Roste v jihovýchodní a jihozápadní Evropě, severní Africe a západní Asii v kobercových porostech a jako trvalka. Dorůstá výšky (1 -) 4 - 15cm. Listy mají kopinatý tvar, délku 0,3 - 1,3cm a šířku 1,2 - 2,5mm. Květenství má v průměru více než 1cm, vlastní květy jsou bílé, velikosti 3 - 5,5mm a kalich má velikost 2 - 3mm. Semena mají velikost do 1mm.

Vyhovuje ji písčitá suchá půda a plné slunce.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia carica

Paronychia cataonica

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v trsech nebo kobercích. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou ztlustlé, ochlupené, kopinaté, dlouhé 3 - 4mm. Kvete v klubíčkách o průměru 0,7 - 1cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá dobře propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia cephalotes

synonyma: Illecebrum cephalotes, P. cephalotes subsp. bulgarica, P. cephalotes subsp. thracica, P. taurica

oblasti: Balkánský poloostrov, JV Evropa, Krym, Střední Evropa, Ukrajina, Z Asie

Roste kromě jiného třeba na Krymu a na severu Balkánského poloostrova v kobercových porostech. Patří mezi trvalky. Kmínky mají délku 5 - 15cm, na konci mohou být řídce ochlupené. Vstřícené kopinaté podlouhlé eliptické listy se špičkou mají délku 2,5 - 4mm a šířku 1mm. Spodní strana může být ochlupená. Vytváří i palisty stříbřité barvy. Kvete v hustých hlávkách o průměru 1 - 2cm. Plody mají vejčitý tvar.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia chabloziana

Paronychia chartacea

synonyma: Nyachia pulvinata

oblasti: Florida

Paronychia chilensis

Paronychia chionaea

Paronychia chlorothyrsa

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 3 - 12cm.

Paronychia communis

Paronychia condensata

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou dlouhé 2 - 3mm a nahuštěné, zakryté úzce vejčitými palisty. Kvete v klubkách o průměru 5 - 7mm.

Vyhovují ji dobře propustné hluboké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia congesta

oblasti: Texas

Paronychia cymosa

oblasti: Katalánsko

Paronychia davisii

Paronychia depressa
synonyma: P. brevicuspis, P. depressa var. brevicuspis, P. depressa var. diffusa, P. diffusa, P. jamesii var. depressa, P. sessiliflora var. brevicuspis

oblasti: Jižní Dakota, Kansas, Kolorado, Nebraska, Nové Mexiko, Wyoming

Roste v USA v kobercově rostoucích polokeřích. Dorůstá výšky 8 - 15cm. Lodyhy jsou drsné. Kožovité čárkovité listy se špičkou mají délku 0,8 - 1,5cm. Kvete v klubkách o průměru 0,7 - 2,5cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia drummondii
synonyma: P. drummondii subsp. parviflora

oblasti: Louisiana, Oklahoma, Texas

Paronychia dudleyi

Paronychia echinulata
synonyma: Chaetonychia echinata

oblasti: Andalusie, Itálie, Kalifornie, Katalánsko, Palestina

Patří mezi jednoletky. Dorůstá výšky (2 -) 6 - 10 (i 15)cm. Stonek je vzpřímený nebo vystoupavý a může být na bázi větvený. Listy jsou obkopinaté až obvejčité, načervenalé a na okraji roztřepené. Květenství má průměr 3 - 8mm a vlastní kalich má velikost 2 - 2,5mm. Semena nejsou známá.

Paronychia ellenbergii

Paronychia erecta
synonyma: Odontonychia corymbosa, Odontonychia erecta, P. erecta var. corymbosa, Siphonychia corymbosa, Siphonychia erecta

oblasti: Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi

Paronychia euphratica

Paronychia fasciculata

Paronychia fastigiata

oblasti: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Ontario, Pennsylvania, Quebec, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Wisconsin, Západní Virginie

Paronychia franciscana

oblasti: Kalifornie

Paronychia fusciflora

Paronychia galatica

Paronychia haggariensis

Paronychia herniarioides

synonyma: Gastronychia herniarioides

oblasti: Alabama, Florida, Georgia, Jižní Karolína

Paronychia hieronymi

Paronychia jamesii
synonyma: P. jamesii var. hirsuta, P. jamesii var. parviflora, P. jamesii var. praelongifolia, P. wardii

oblasti: Arizona, Kansas, Kolorado, Mexiko, Nebraska, Nové Mexiko, Oklahoma, Texas, Wyoming

Roste od severozápadu USA po jih USA a Mexiko v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 35cm. Lodyhy jsou drsné, větvené a ochlupené. Kožovité listy mají čárkovitý tvar délky 0,7 - 2,5cm a jsou také ochlupené. Kvete v klubkách o průměru 1 - 2cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá dobře propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia jonesii

oblasti: Texas

Paronychia jordanica

oblasti: Jordánsko

Paronychia kapela (Stříbřenka klubíčkatá)
synonyma: Illecebrum capitatum, Illecebrum kapela, P. capitata, P. pseudoaretioides, P. serpyllifolia

oblasti: Andalusie, Francie, Itálie, Jugoslávie, Katalánsko, Rumunsko, S Afrika

Roste v jižní Evropě v pohořích Španělska, Francie, Itálie, Jugoslávie a Rumunska. Dorůstá výšky (3 -) 5 - 10 (i 25)cm. Roste v polštářových porostech. Lodyhy jsou plazivé, v mládí ochlupené. Vystávří kopinaté palisty. Vstřícné tuhé lesklé listy mají eliptický až obvejčitý tvar délky 2 - 5mm, šířky 1 - 2,5mm. Kvete v kulovitém 0,8 - 1,5 (i 2)cm květenství na koncích výhonů zelenobílými květy. Plodem je tobolka. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. baetica
- subsp. kapela
- subsp. serpylifolia

Vyhovují ji sutě, skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia kayseriana

Paronychia kemaliya

Paronychia kotschyana

Paronychia kurdica (Stříbřenka kurdistánská)
synonyma: Illecebrum cephalotes, P. haussknechtii, P. montis-munzur, P. nivea, P. splendens

oblasti: Arménie, Írán, Kavkaz, Malá Asie (Anatolie)

Roste na Kavkaze, Malé Asii, Arménii, Kurdistánu a Íránu v kobercových porostech. Patří mezi trvalky. Dorůstá výšky 3 - 5cm. Kmínky dorůstají délky 2 - 10cm, dřevnatí, jsou vystoupavé a řídce ohclupené. Listy mají dlouze čárkovitý až obkopinatý tvar se špičkou, délku 5 - 7mm, šířku 1mm a jsou mírně ochlupené. Vytváří i palisty. Kvete v hustých ochlupených svazečcích o průměru 0,5 - 1cm.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia libertadiana

Paronychia limaei

Paronychia lindheimeri
synonyma: P. chorizanthoides, P. lindheimeri var. longibracteata

oblasti: Nové Mexiko, Texas

Paronychia longiseta

Paronychia lundelliorum

oblasti: Texas

Paronychia lycica

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy mají obvejčitý tvar, drsný povrch a délku 3 - 4mm. Vytváří 2 - 3mm palisty. Kvete v klubkách.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia macbridei

Paronychia maccartii

oblasti: Texas

Paronychia macedonica

oblasti: Jugoslávie, Makedonie

Paronychia macrosepala
synonyma: P. capitata subsp. macrosepala, P. euboea, P. insularum

oblasti: Izrael, Jordánsko, JV Evropa, Kréta, Kypr, Libanon, Malá Asie (Anatolie), Palestina, Řecko, Sicílie, Sýrie

Roste ve východním středozemí, Řecku, Turecku, Kypru, Sicílii, Maltě a Izraeli. Vytváří kobercové porosty. Dorůstá výšky 2 - 10cm. Lodyhy jsou poléhavé a větvené, červeně obarvené. Vstřícné dužnaté listy mají eliptický až obkopinatý tvar délky 3 - 5mm a šířky 1,5 - 2,3mm. Vytváří i palisty bělavé barvy. Kvete v klubíčkách o průměru více než 1cm na koncích výhonů žlutozelenými květy velikosti 4 - 5mm s bílými lesklými až 6mm listeny a kalichem velikosti 2 - 3mm s ochlupenými okraji. Plodem je tobolka obsahující semena velikosti do 1mm. Existují vnitrodruhové taxony:

- var. cretica
- var. insularum
- var. macrosepala

Vyhovují ji pobřežní písčiny a duny, štěrky, skalní pukliny, atp. v chudé dobře propustné půdě na plným slunci se suchým zimním režimem.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia mandoniana

Paronychia maroccana
synonyma: P. kapela var. hirta

oblasti: Maroko

Paronychia mesopotamica

Paronychia mexicana

Paronychia microphylla
synonyma: P. arequepensis

oblasti: Bolívie, Čile, Peru

Roste v Bolívii, Čile a Peru v podobě polokeře. Dorůstá výšky 10 - 15cm. Listy jsou eliptické, hrotité a ochlupené. Dosahují délky 5mm. Vytváří i 5mm také ochlupené palisty.

Vyhovuje ji písčitá chudá propustná půda, plné slunce a sucho.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia montana
synonyma: Anychiastrum montanum, P. fastigiata var. pumila

oblasti: Alabama, Georgia, Jižní Karolína, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Virginie, Západní Virginie

Paronychia monticola
synonyma: P. nudata

oblasti: Texas

Paronychia mughlaei

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste v Turecku v trsech nebo kobercích. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Povrch je hustě ochlupený. Listy mají obvejčitý tupě zakončený tvar a délku 4 - 6mm. Vytváří i kopinaté palisty. Kvete v klubkách s 5 - 7mm listeny.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, plné slunce, chudá propustná půda a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia muschleri

synonyma: P. rigida

Paronychia palaestina

oblasti: Palestina

Roste jako trvalka. V průměru dosahuje 10 - 20cm. Stonky jsou poléhavé až vystoupavé. Listy jsou kopinaté až eliptické, ochlupené, dlouhé 3 - 8mm a široké 1 - 2mm. Květenství má v průměru 5mm a vlastní květy mají kalich velikosti 2 - 3mm. Semena jsou hnědá a velká 1mm.

Paronychia paphlagonica

Paronychia patula
synonyma: Siphonychia diffusa

oblasti: Alabama, Florida, Georgia

Paronychia peruviana

Paronychia polygonifolia
synonyma: Chaetonychia polygonifolia, Ferriera polygonifolia, Illecebrum polygonifolium, Plottzia polygonifolia

oblasti: Andalusie, Itálie, JV Evropa, Katalánsko, S Afrika, Z Asie

Roste v jižní Evropě, severní Africe a západní Asii v kobercových porostech. Dorůstá výšky (1 -) 3 - 15cm. Listy mají obkopinatý až podlouhlý tvar se špičkou, mírně pilový okraj a jsou seskupené do svazečků. Vytváří i menší palisty. Kvete v klubkách.

Vyhovují ji středně úrodné a vlhké půdy na plném slunci.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia pontica
synonyma: P. cephalotes subsp. pontica

Paronychia pulvinata
synonyma: P. pulvinata var. longiaristata, P. sessiliflora subsp. pulvinata

oblasti: Kolorado, Nové Mexiko, Utah, Wyoming

Roste ve vysokých polohách od severozápadu po jih USA v polštářových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Lodyha dřevnatí. Listy mají eliptický tvar s tupou špičkou.

Vyhovují ji skalní pukliny, dostatek vody, chudá propustná půda a polostín.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia rechingeri

Paronychia revoluta

Paronychia rouyana
synonyma: P. echinulata subsp. rouyana

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 5 - 10cm.

Paronychia rugelii
synonyma: Odontonychia interior, P. rugelii var. interior, Siphonychia interior, Siphonychia rugelii

oblasti: Florida, Georgia

Paronychia saxatilis

oblasti: Malá Asie (Anatolie)

Roste ve vysokých polohách Turecka v kobercových porostech. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy mají obvejčitý až podlouhlý tvar. Kvete v klubíčkách s výraznými listeny.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia serpyllifolia

Paronychia sessiliflora

oblasti: Alberta, Arizona, Jižní Dakota, Kolorado, Montana, Nebraska, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Saskatchewan, Severní Dakota, Texas, Utah, Wyoming

Roste od západní Kanady po jihozápad USA ve vyšších polohách v kobercově rostoucích polokeřích. Dorůstá výšky 1 - 5cm. Listy jsou čárkovité, špičaté, žlutozelené barvy a délky 4 - 6mm. Kvete samostatnými nebo párovými květy.

Vyhovují ji skalní pukliny, nízká zálivka, chudá propustná půda, plné slunce a suchý zimní režim.

Množí se semeny, řízky nebo dělením.

Paronychia setacea
synonyma: P. lundellorum, P. setacea var. longibracteata

oblasti: Texas

Paronychia setigera
synonyma: Herniaria setigera, P. andina, P. chilensis var. andina

Paronychia sinaica
synonyma: P. moabitica

oblasti: Izrael, Palestina

Patří mezi trvalky. Dorůstá délky 5 - 12cm. Stonky jsou vystoupavé a větvené již od dřevnaté báze. Listy jsou kopinaté až čárkovité, špičaté, dlouhé 0,4 - 1cm a široké 1 - 2mm. Květenství má v průměru 0,5 - 1cm a vlastní květy mají kalich velikosti 2 - 3mm. Semena jsou bleděhnědá a velká 1,5 - 2mm.

Paronychia sintenisii

Paronychia splendens

oblasti: Írán

Paronychia suffruticosa
synonyma: Herniaria polygonoides, Herniaria suffruticosa, Illecebrum suffruticosum

oblasti: Andalusie

Dorůstá výšky 10 - 35cm. Existují vnitrodruhové taxony:

- subsp. suffruticosa
- subsp. hirsuta

Paronychia taurica

Paronychia tunisiana

oblasti: Tunisko

Paronychia turcica

Paronychia velata

Paronychia virginica
synonyma: P. parksii, P. scoparia, P. virginica var. parksii, P. virginica var. scoparia

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Maryland, Missouri, Oklahoma, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie, Západní Virginie

Paronychia weberbaueri
synonyma: P. polygonoides

Paronychia wilkinsonii

oblasti: Texas

Další informace:
http://botany.cz/cs/paronychia-canariensis/
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=41930
http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=41931
http://www.kadel.cz/skalnicky/t/kvResult.asp-Rod=Paronychia.htm
http://www.pulsatilla.bluefile.cz/?p=73

https://www.rostliny.net/