

Salix lasiandra (Vrba chloupkatotyčinková)

synonyma: *Pleiarina lasiandra*, *Salix arguta*, *Salix arguta* var. *erythrocoma*, *Salix arguta* var. *lasiandra*, *Salix arguta-lasiandra*, *Salix fendleriana*, *Salix lancifolia*, *S. var. abramsii*, *S. var. fendleriana*, *S. var. lancifolia*, *S. var. lyallii*, *S. var. macrophylla*, *S. var. recomponens*, *Salix lucida* f. *lasiandra*, *Salix lucida* subsp. *lasiandra*, *Salix lucida* var. *lasiandra*, *Salix lucida* var. *macrophylla*, *Salix lyallii*, *Salix speciosa*

čeleď: Salicaceae

oblasti: Alberta, Aljaška, Britská Kolumbie, Idaho, Kolorado, Montana, Nevada, Nové Mexiko, Oregon, Saskatchewan, Utah, Washington, Yukon

Roste na západě Severní Ameriky v podobě keře až stromu se široce mírně nepravidelně kulovitou řidší korunou. Dorůstá výšky až 15m. Větve do stran odstávají, jsou široce vystoupavé, v mládí ochlupené nebo plstnaté. Listy jsou kopinaté až úzce vejčitékopinaté, dlouhé 5 - 18cm, široké 1 - 5cm, zašpičatělé, jemně žláznatě zubaté, horní strana tmavězelená, lesklá, centrální žebro obvykle žluté, na spodní straně namodralé, v mládí ochlupené, řapíky s řídkými žlázami, dlouhé 0,3 - 1,5cm, Samčí jehnědy dlouhé 2 - 6cm, široké 1 - 1,5cm, 3 - 8 tyčinek, samičí jehnědy v dospělosti dlouhé 5 - 12cm, semeníky téměř přisedlé.

<https://www.rostliny.net/>