

Quercus x bushii (Dub Bushův)

čeleď: Fagaceae

oblasti: Alabama, Arkansas, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Nebraska, New Jersey, New York, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Virginie

Kříženec *Q. marilandica* a *Q. velutina*. Pochází z USA. Roste v podobě stromu s méně rozložitým řídkým habitem s nepravidelným okrajem. Dorůstá výšky do 10m. Mladé větve jsou hustě plstnaté. Listy bývají obvejčité, 3 - 5laločné s hlubokými okrouhlými laloky, tuhé, centrální nerv je silný, báze kulatá, vzácně zúžená, na horní strana tmavězelené, lesklé, spodní strana je žlutozelená, holá, pouze svazečkovitě ochlupená v paždí žilek, řapíky jsou dlouhé 3cm a celková délka je 10 - 13cm. Žaludy jsou vejčité, v číšce schované z 1/2. Existuje vnitrodruhový taxon:

- 'Seattle Trident' - velké široce obvejčité leklé tmavězelené listy s výrazně 3laločnatým koncem, délka 20cm

<https://www.rostliny.net/>